

الدكتور أسعد الجنابي

المنطق الرمزي المعاصر


نظري وتمارين محلولة



المنطق الرمزي المعاصر

نظري وتمارين محلولة

أسعد الجنابي



الجنابي، أسعد نادر
منطق الرمزي المعاصر: نظري وتمازين محلولة / أسعد
نادر الجنابي. - عمان: دار الشروق، 2007.
(352) ص
ر. إ. : 2007/2/486
الواصفات: المنطق//علم الفلسفة/

• تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

(ردمك) ISBN 978 - 9957 - 00 - 306-7

(رقم الإجازة المتسلسل) 2006/12/4141

- المنطق الرمزي المعاصر: نظري وتمازين محلولة .
- تأليف: الدكتور أسعد نادر الجنابي .
- الطبعة العربية الأولى: الإصدار الأول 2007 .
- جميع الحقوق محفوظة © .



دار الشروق للنشر والتوزيع

هاتف: 4618190 / 4618191 / 4624321 فاكس: 4610065

ص.ب: 926463 الرمز البريدي: 11118 عمان - الأردن

دار الشروق للنشر والتوزيع

رام الله: شارع المستشفى رام الله - مقابل دائرة الطابو

هاتف 2975632 - 2991614 - 2975633 فاكس 02/2965319

جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات إلا بقا
أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.


■ الاخراج الداخلي وفرز الألوان و الأفلام :

دائرة الإنتاج / دار الشروق للنشر والتوزيع

هاتف 4618190/1 فاكس 4610065 / ص.ب. 926463 عمان (11110) الأردن

Email: shorokjo@nol.com.jo

شبكة كتب الشيعة



shiabooks.net

mktba.net

الفهرس

5	الفهرس
11	المقدمة
الفصل الأول : لغة حساب القضايا	
13	1.1 موضوع المنطق واللغة الرمزية
20	1.2 القضايا والعمليات على القضايا
21	1.2.1 دالة النفي
22	2.2.1 دالة الوصل
24	3.2.1 دالة الفصل
27	4.2.1 دالة الاستلزام (الشرطية)
31	5.2.1 دالة الاستلزام الثنائي
33	6.2.1 دالة الشطب (نفي الوصل)
35	7.2.1 دالة النفي المشترك (نفي الفصل)
36	1.3 اللغة الرمزية لحساب القضايا
37	1.4 تركيب (نحو) لغة حساب القضايا (قواعد بناء الصيغ)
40	1.5 شجرة الصيغة
41	1.6 تمارين

الفصل الثاني: الاستنتاج الطبيعي لحساب القضايا

2. 1 أنواع الصيغ 45
2. 2 العلاقة (بنتج) والعلاقة (يكافئ) 49
2. 3 صورة الحجة وبرهان صحتها 51
2. 4 برهان خطأ صورة حجة 54
2. 5 قواعد الاشتقاق 58
2. 6 المجموعات الكافية للروابط 73
2. 7 البراهين الصورية 80
2. 8 أنواع البراهين الصورية 84
2. 8. 1 البرهان المباشر 84
2. 8. 2 البرهان الشرطي (ب.ش) 84
2. 8. 3 البرهان الغير مباشر (ب.غ) 87
2. 9 الاتساق وعدم الاتساق 95
2. 10 المبادئ العامة للتوصل إلى البراهين الصورية 99
2. 11 اكتشاف البراهين الصورية 100
2. 12 تمارين 101

الفصل الثالث: الأنساق الصورية لحساب القضايا

1. 3 الأنساق الاستنباطية 113
1. 1 مجموعة المفاهيم الأولية 113
2. 2 مجموعة البديهيات 114
3. 2 النسق الصوري 116

116 3. النسق السوري P
128 4.3 استقلال الأشكال البديهية للنسق P
133 5.3 تمامية النسق P
142 6.3 اتساق النسق P
142 7.3 أنساق سورية أخرى
145 8.3 تمارين

الفصل الرابع: لغة ودلالة حساب المحمولات

149 4. 1 ضرورة توسيع لغة حساب القضايا
151 4. 2 المحمولات
155 4. 3 العمليات على المحمولات
157 4. 4 المكلمات
159 4. 5 اللغة الرمزية والترجمة لحساب المحمولات
167 4. 6 قواعد بناء الصيغ
168 4. 7 شجرة الصيغة
169 4. 8 المتغيرات الحرة والمتغيرات المقيدة
170 9.4 دلالة حساب المحمولات
171 1.9.4 تفسير الصيغ في حساب المحمولات
176 2.9.4 صدق وكذب الصيغ في حساب المحمولات

10.4 تمارين 181

الفصل الخامس: الاستنتاج الطبيعي لحساب المحمولات

- 1.5 البراهين الصورية في حساب المحمولات 185
1. قاعدة التكميم الكلي 187
2. قاعدة التكميم الوجودي 187
3. قاعدة التخصيص الكلي 188
4. قاعدة التمثيل الوجودي 191
5. 2 البرهنة على خطأ صور الحجج 195
5. 3 العلاقات 202
- 4.5 الهوية 209
5. 4. 1 قواعد اشتقاق علاقة الهوية 209
5. 5 تمارين 211

الفصل السادس: الأنساق الصورية لحساب المحمولات

- 1.6 مكونات النسق الصوري لحساب المحمولات 217
- 2.6 النسق الصوري لحساب المحمولات مع المساواة 226
- 3.6 تمارين 228

الفصل السابع: أشجار الصدق

- 1.7 بناء أشجار الصدق 230
- 2.7 قواعد اشتقاق أشجار الصدق 234

239	3.7 تطبيقات أشجار الصندق
248	4.7 أشجار الصندق في حساب المحمولات
256	5.7 أشجار صندق الهوية
258	6.7 تمارين
261	حلول التمارين
343	المراجع

المقدمة

هذا الكتاب هو تطوير لمحاضراتنا التي ألقيناها على طلبة الكليات العلمية والأدبية في عدة جامعات عربية لأكثر من عقدين. وهكذا فهو موجه، بشكل أساسي، للطلبة الجامعيين الدارسين للمنطق ولا يتطلب منهم أية معلومات مسبقة في المنطق أو في الرياضيات وإن كنا قد استخدمنا فيه مفاهيم وعمليات وعلاقات أولية من نظرية المجموعات نفترض أن يكون القارئ مطلعاً عليها سواء كان تخصصه أدبياً أم علمياً.

لقد كان هدفنا من إصدار هذا الكتاب هو تقديم مادة نريدها أن تكون، أولاً قابلة للاستيعاب بشكل كامل من قبل طلبة الجامعات، خصوصاً ونحن نرى أن معظم الكتب العربية والأجنبية ينقصها الوضوح الذي يجعل محتواها في متناول هؤلاء الطلبة. كما أن تجربتنا في تدريس هذا العلم قد أوصلتنا إلى استنتاج يفيد بان غياب مصادر قادرة على تبسيطه قد أعاق حتى انتشاره والتخصص فيه.

أردنا بهذا الكتاب ثانياً، أن نقدم مادة باللغة العربية تتسجم مع ما وصل إليه هذا العلم من أساليب ومعالجات عصرية وتكون استمراراً لكتب الرواد الذين كتبوا فيه ولم تعد معالجاتهم تسائر التقدم الهائل في هذا العلم. إن تقديم مادة يستطيع طلبة الجامعات استيعابها بسبب من وضوح المعالجة الناتج من دقتها وكذا مسابقتها للتطور تمثل أهدافنا الرئيسية.

إن ما أردنا الوصول إليه من محتوى الكتاب هو تمكين الطلبة من اكتشاف وكتابة البراهين الصورية للحجج قدمنا له بالتفصيل عرضاً دقيقاً لعملية الاشتقاق التي تمثل إحدى الأركان الرئيسية لمحتوى الكتاب. ذلك أننا نعتقد بان إحدى الأهداف المركزية للمنطق هو التمييز بين الحجج الصحيحة

والخاطئة. وبعد أن مكنا القارئ من عملية الاشتقاق قمنا ببناء المنطق الرمزي نفسه على شكل نسق والذي يمثل الهدف المركزي الآخر. ندخل في الفصل الأول لغة رمزية بسيطة هي لغة حساب القضايا حيث ندرس الجانب النحوي (التركيبى) وجانب الدلالة من هذه اللغة. استخدمنا العديد من الأمثلة لغرض ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الرمزية لحساب القضايا.

الفصل الثاني مخصص بشكل رئيسي لمفهوم البرهان الصوري في حساب القضايا. باستخدام تعريف العلاقتين (ينتج) و(يكافئ) تدخل العديد من قواعد الاشتقاق المستخدمة في البراهين الصورية الثلاثة: المباشر، الشرطي، غير المباشر. تدخل الحجج الصحيحة والحجج الخاطئة، حيث يستخدم المثال المضاد لبرهان خطأ الحجج. ندخل كذلك مفهومي اتساق الصيغ وعدم اتساقها، حيث نقوم بتعريفهما وبرهان الشرط اللازم والكافي لهما.

الفصل الثالث يغطي بناء نسق صوري لحساب القضايا. بعد تحديد مكونات النسق الصوري المتمثلة في أبجدية النسق، قواعد بناء الصيغ، قواعد الاشتقاق ومجموعات بديهيات النسق، نقوم ببناء النسق الصوري وذلك بإعطاء بعض من مبرهنات النسق. نبرهن أيضا خواص النسق : التمامية، الاتساق، الاستقلال.

يخصص الفصل الرابع لدلالة حساب المحمولات. إن تفسير صيغة في حساب المحمولات يماثل تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية لصيغة في حساب القضايا. تناقش مفهومي الكذب والصدق في التفسيرات. إن استيعاب هذين المفهومين من قبل الطلبة يساعدهم على فهم لماذا تحافظ على الصدق قواعد الاشتقاق المدخلة في الفصل التالي.

في الفصل الخامس تضاف أربعة قواعد اشتقاق جديدة هي: التخصيص الكلي، التكميم الكلي، التمثيل الوجودي والتكميم الوجودي. وهكذا يصبح بالإمكان إعطاء براهين صورية للحجج في حساب المحمولات. نقوم بإدخال العلاقات على أنواعها وننشأ براهين صورية للحجج التي تحوي المكممين، الكلي والوجودي. يختتم هذا الفصل بعلاقة الهوية حيث تعطى قواعد اشتقاقها وتنشأ براهين صورية لها.

يعالج الفصل السادس الأنساق الصورية لحساب المحمولات، حيث يتم بناء نسق صوري لحساب المحمولات.

يخصص الفصل السابع لاستخدام أشجار الصدق كطريقة فعالة من أجل : تحديد نوع الصيغ، صحة الحجج، تكافؤ الصيغ واتساقها. يتم هذا الاستخدام في حساب القضايا ثم يتم إدخال أشجار الصدق في حساب المحمولات لتحديد صحة الحجج.

قمنا بحل التمارين التي تغطي كل فصول الكتاب بالتفصيل، حيث شغلت الحلول ثمانين صفحة. وهذا هو أول كتاب باللغة العربية في المنطق يتضمن حلولاً للتمارين بهذا العدد الكبير. إن هدفنا من هذا هو تشجيع الطلبة والأساتذة في الجامعات على تبني الكتاب ككتاب تدريسي.

أخيراً نود أن نشكر الدكتور بوعرفة عبد القادر على اهتمامه بإنجاز هذا الكتاب وكذا الأنسة عراش أمينة التي بذلت جهداً كبيراً من أجل الإخراج التقني الأفضل له.

د/أسعد الجنابي

2006

الفصل الأول

Language of Propositional Calculus

لغة حساب القضايا

1.1 موضوع المنطق واللغة الرمزية

تحدث المحاجة كلما قدمت أسباب لدعم قضية ما. فعندما أكد غاليلو قضية أن الأرض تتحرك وقدم أسبابا أو دلائل داعما هذه القضية فإنه بذلك استخدم المحاجة. بشكل مشابه، فعندما يؤكد المحامي قضية أن موكله بريء ويقدم أسبابه ودلائله داعما هذه القضية فإنه بذلك يستخدم المحاجة. عندما يستخدم العالم والمحامي المحاجة فإنهما يعلنان ذلك بواسطة تقديم قضية أو مجموعة قضايا يعتقدان بها من أجل دعم أو إسناد القضية التي يريدان إثباتها. لنسمي القضية المدعومة بواسطة المحاجة بالنتيجة، ولنسمي القضية أو القضايا المستخدمة في المحاجة لدعم النتيجة بالمقدمات. المجموعة التي تضم المقدمات والنتيجة تسمى الحجة. إن معنى كلمة (الحجة) هنا يختلف عن معناه في اللغة العادية، فليس له أي جامع مع الجدالات أو المناظرات. فمثلا، المقدمات والنتيجة التي نجدها في كتاب الهندسة ليس لها ما تفعله مع النزاع أو الاختلاف. وهكذا فإن الحجة هي مجموعة من القضايا، إحداهما تسمى نتيجة أما الأخرى فتسمى مقدمات.

من الواضح أنه توجد حجج صحيحة وأخرى خاطئة. تسمى الحجة صحيحة إذا كانت المقدمات فعلا تدعم النتيجة. أو بعبارة أخرى، إذا كانت

النتيجة تنتج من المقدمات، وتسمى الحجة خاطئة إذا كانت المقدمات لا تدعم

النتيجة. أو بعبارة أخرى، إذا كانت النتيجة لا تنتج من المقدمات.

مجموعة القضايا في المثال التالي تكوّن حجة صحيحة.

(1) إذا كانت الأرض تدور حول الشمس فإن الأرض تتحرك.

(2) الأرض تدور حول الشمس.

(3) الأرض تتحرك.

القضيتان (1) و(2) في المثال أعلاه تمثلان المقدمات و(3) هي النتيجة.

مجموعة القضايا في المثال التالي تكوّن حجة خاطئة.

(1) إذا كانت الأرض تدور حول الشمس فإن الأرض تتحرك.

(2) الأرض تتحرك.

(3) الأرض تدور حول الشمس.

القضيتان (1) و(2) في المثال تمثلان المقدمات و(3) هي النتيجة.

المنطق هو العلم الذي يدرس الحجج. إن ما يهم المنطق هو الجواب

على السؤال: هل أن النتيجة تنتج من المقدمات؟ أي هل أنه عندما تكون

المقدمات جميعها صادقة، فالنتيجة تكون صادقة أيضا؟. إذا كان الجواب

بنعم، فيقال أن الحجة صحيحة أو أن التفكير الاستدلالي صحيحا. وإذا كان

الجواب بلا، أي أنه عندما تكون المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة، فيقال أن

الحجة خاطئة أو يقال أن التفكير الاستدلالي خاطئ. لهذا يقال أيضا أن

المنطق يبحث في التفكير الاستدلالي¹. تؤكد س.هاك على أن (إحدى المهام المركزية للمنطق هي التمييز بين الحجج الصحيحة والحجج الخاطئة)². إن التفكير يجد تعبيره في اللغة ولهذا فلا بد له أن يبحث في اللغة التي هي الوسيلة الوحيدة لصياغة وارتقاء الأفكار. وفي الحقيقة، فإن الفكر واللغة يشترطان أحدهما الآخر. وبالرغم من أن اللغة العادية تمثل إنجازا عظيما في تاريخ الفكر البشري ولكنه بسبب من غاياتها العملية، فلم تكن الدقة والوضوح صفة لها. ولهذا فلتجنب المصاعب التي ترتبط بهذه اللغة والتي ستعرض لها ومنها الغموض وكذلك فإنه من أجل الاقتصاد في الفراغ والوقت فلقد قام المشتغلون في العلوم المختلفة باستخدام رموزا للتعبير عن نظرياتهم، الأمر الذي مكن العلوم من التطور الهائل.

بشكل مشابه، تم تكوين رموزا للمنطق، وذلك لأن دقة اللغة الرمزية هو الأهم من أجل توضيح التركيب المنطقي لاستدلالاتنا، بينما اللغة العادية تكون عاجزة عن ذلك. وكمثال لناخذ مجموعتي القضايا (الحجتين) التاليتين، وحيث وضعت (إذن) لفصل المقدمات عن النتيجة.

(أ) أنا صديق أحمد.

أحمد شاعر.

إذن، أنا صديق شاعر.

(ب) أنا صديق أحدهم.

¹ د. اسعد الجنابي-المنطق الرياضي: دوره ومكانه في الرياضيات الحديثة، مركز البحوث، عدن، 1976.

² Haack, S.- Philosophy of logics, Cambridge University Press, 1999, Ch. 1.

أحدهم نزل على سطح القمر .

إذن، أنا صديق النازل على سطح القمر .

هاتان المجموعتان لهما نفس الشكل من وجهة نظر اللغة العادية، بالرغم من أن التفكير الاستدلالي كان صحيحا فقط في (أ). إن الشكل اللغوي لمجموعتي القضايا ليس متطابقا مع تركيبيهما المنطقي. إن هذا يقود إلى ضرورة ابتكار لغة متكاملة للمنطق، بحيث يصبح من غير الممكن التعبير عن استدلالات مختلفة التركيب المنطقي لنفس الشكل اللغوي. بالإضافة إلى ذلك، ففي اللغة المتكاملة هذه توجد رموز ليست مبهمّة، وصياغات دقيقة. وهكذا يكون من السهل جدا التحقق من صحة الاستدلالات التي نعملها، وهذه السهولة غير ممكنة في اللغة العادية. وكما يقول وايت هيد: "يمكننا بواسطة اللغة الرمزية الانتقال في الاستدلالات أليا تقريبا بواسطة العين"¹. لقد أصبحت اللغة الرمزية ضرورة من أجل إنجاز المعالجة العلمية الدقيقة المطلوبة بالمنطق، كما أنها أصبحت أداة اكتشاف وليس مجرد رموز فقط²، لأنها تكتشف أفكارا جديدة.

المنطق الرمزي المعاصر يدرس صور الحجج. صور الحجج هي نماذج مجردة تشترك بها العديد من الحجج المختلفة المضمون³. وللتوضيح نأخذ الحجج الثلاثة التالية والتي تمتلك نفس الصورة :

¹ Copi, I. M.-Symbolic logyc,Macmillan publishing co.Inc.New York, 1979, P. 7

² Susane K. Langer- An Introduction tosymbolic logic, Dover pulication, 1976, P. 60.

³ John, N. And Dennis, R. – Logic, McGraw-Hill co., New York, 1988, P.15.

1. إذ هطل المطر فإن أحمد يفتح المظلة.
هطل المطر.

إذن، أحمد يفتح المظلة.

2. إذا تطابق المثلثان ABC و $A_1B_1C_1$ فإن $AB = A_1B_1$.

تطابق المثلثان ABC و $A_1B_1C_1$.

إذن، $AB = A_1B_1$.

3. إذا حل الصيف فإن درجة الحرارة ترتفع.

حل الصيف.

إذن: درجة الحرارة ترتفع.

إن ما تشترك به الحجج الثلاثة هو الصورة التالية والتي أصبح من الممكن
إيجادها باستخدام الرموز:

إذا كان K فإن L

K

إذن، L

القضيتان K و L في هذه الصورة يمكن التعويض فيهما بأي زوج من
القضايا للحصول على حجة ما. أي أن K و L متغيران. وبما أن عدد أزواج
القضايا لا نهائي فإن صورة الحجج هذه تمثل عدد لانهائي أيضا من الحجج
المختلفة والتي لها نفس التركيب، نقصد تركيب المقدمات والنتيجة. كذلك فإن
الصورة المذكورة هي استدلال ذو خطوة واحدة بمقدمتين ونتيجة.

القضايا

مفهوم القضية في المنطق يشبه مفاهيم الهندسة المستوية: النقطة، المستقيم، المستوي إذ سنتقبله بدون تعريف. توصف القضية بأنها الجملة الخبرية التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة. سنقوم الآن بتوضيحها بواسطة الأمثلة:

العدد 6 لا يقبل القسمة على 3.

الكندي فيلسوف عربي.

صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية.

نلاحظ في هذه الأمثلة أن القضيتين الثانية والثالثة صادقتان، أو أن قيمة صدق كل منهما T. القضية الأولى كاذبة، أو أن قيمة صدقها F. سندرس العمليات على القضايا وذلك باستخدام روابط لنصل إلى تكوين لغة رمزية لحساب القضايا. سنهتم بجانب النحو أو التركيب¹ لهذه اللغة، أي دراسة اللغة الرمزية دون الالتفات إلى تفسيرها أو دراسة ما نسميه بناء الصيغ وكذا سنهتم بجانب الدلالة² لها، أي دراسة كيفية تفسير هذه اللغة. نقسم القضايا إلى قضايا ذرية (بسيطة) وقضايا مركبة. القضية الذرية هي القضية التي لا يمثل أي جزء منها قضية. أما القضية المركبة فيمكن تجزئتها إلى قضايا أخرى تسمى مركباتها.

¹ - Syntax

² - Semantics

كبداية لتكوين لغة رمزية لحساب القضايا سنرمز بواسطة الحروف الكبيرة A, B, C, \dots (ما عدا T و F) وهذه الحروف ودلائلها $A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots$ للتعبير عن القضايا الذرية ونسميها المتغيرات القضائية.


2.1. 1 دالة النفي Function of Negation

النفي هي العملية الأبسط على القضايا. يعرف نفي قضية معطاة على أنه قضية تكون صادقة إذا كانت القضية المعطاة كاذبة، وتكون كاذبة إذا كانت القضية المعطاة صادقة. سنرمز لنفي القضية K بواسطة $\neg K$. يمكننا إعطاء التعريف التالي: إذا كانت K قضية فإن $\neg K$ تقرأ (نفي K)، تعتبر صادقة إذا كانت K كاذبة وتعتبر $\neg K$ كاذبة إذا كانت K صادقة. أدوات النفي بالإضافة إلى (ليس) في اللغة العربية هي أيضا: لم، لا، من الخطأ أن يعتبر الرمز \neg رابطا بالرغم من أنه يؤثر على قضية واحدة ولهذا يسمى رابطا أحاديا. من المفيد كتابة قيم صدق القضايا في جداول الصدق. جدول الصدق $\neg K$ يكون على الشكل أدناه .

K	$\neg K$
T	F
F	T

يتبين من الجدول انه إذا كانت K صادقة، فإن $\neg K$ تكون كاذبة وإذا كانت K كاذبة فإن $\neg K$ صادقة، وهكذا يعرف هذا الجدول دالة صدق¹.

¹ - دالة الصدق هي الدالة التي تتكون مجموعة تعريفها من متاليات قيم صدق ومستقرها المجموعة $\{T, F\}$



مجموعة تعريف دالة الصدق هذه هي $\{T,F\}$ ، أما مستقرها فهو المجموعة نفسها $\{T,F\}$. يمكن التعبير عن دالة الصدق هذه كما هو موضح في المخطط، حيث f يرمز لدالة النفي.

إذا رمزنا لدالة النفي بواسطة f فيكون $f(T) = F$ ، $f(F) = T$. إن اعتبار النفي كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد قيمة صدق K وذلك بمعرفة قيمة صدق القضية المركبة لها K .

Conjunctive Function

2.1.2 دالة الوصل

إذا ربطت قضيتان بواسطة الرابط (و)، فالقضية الناتجة تسمى قضية وصل هاتين القضيتين. إذا رمزنا بواسطة K للقضية (أحمد داخل الدار) و L للقضية (علي يذاكر دروسه) ورمزنا للرابط (و) بواسطة \wedge ، فإننا نستطيع كتابة (أحمد داخل الدار و علي يذاكر دروسه) هكذا $K \wedge L$ والذي يقرأ (K وصل L). تسمى كل من K و L (القضيتين المركبتين للقضية $K \wedge L$) بالمعطوفة.

سنبين الآن كيف تعتمد قيمة صدق $K \wedge L$ على قيم صدق K و L . فمثلا القضية التالية: (العدد 2 هو عدد أولي وعدد زوجي) هي قضية صادقة لأن كلا من القضيتين المركبتين لها (المعطوفتين) صادقتين. أما القضية: (تونس دولة عربية ودولة آسيوية) فهي كاذبة وذلك لأن المعطوفة الثانية وهي (تونس دولة آسيوية) كاذبة. يمكننا إعطاء التعريف التالي:

إذا كانت K و L قضيتين فإن $K \wedge L$ تسمى (وصل) K و L . تُعتبر $K \wedge L$ صادقة فقط إذا كانت القضيتان K و L صادقتين. أما في الحالات الأخرى فتعتبر $K \wedge L$ كاذبة. تسمى K المعطوفة الأولى و L المعطوفة الثانية. يعبر عن الوصل أيضا باللغة العربية بكلمات مثل: (لكن)، (بالرغم من)، (وأكثر من ذلك) ويمكن وضع تعريف الوصل في الجدول أدناه.

K	L	$K \wedge L$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

تعريف قضية الوصل يمكن تعميمه إلى

أي عدد من القضايا. الوصل :

$M_1 \wedge M_2 \wedge \dots \wedge M_n$ والذي عادة يرمز

له $\bigwedge_{i=1}^n M_i$ يكون صادقا إذا كانت كلا من المعطوفات :

M_1, M_2, \dots, M_n صادقة، ويكون كاذبا إذا كانت معطوفة واحدة على الأقل من المعطوفات كاذبة.

يسمى الرمز \wedge رابطا ثنائيا. جدول صدق قضية الوصل يعرف دالة

صدق. إن مجموعة تعريف هذه الدالة هي المجموعة :


$\{T, F\}^2 = \{T, F\} \times \{T, F\} = \{(T, T), (T, F), (F, T), (F, F)\}$ أو مجموعة

متتاليات قيم الصدق TT, TF, FT, FF ، أما مستقرها فهو المجموعة $\{T, F\}$.

ويمكن التعبير عن دالة الصدق هذه بواسطة المخطط أدناه. إذا رمزنا لدالة

الوصل بواسطة $\wedge f$ فيكون :

$\wedge f(T, T) = T, \wedge f(T, F) = F, \wedge f(F, T) = F, \wedge f(F, F) = F$



إن اعتبار الوصل كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد قيمة صدق $K \wedge L$ وذلك بمعرفة قيمة صدق مركباتها K و L .

2.1.3 دالة الفصل Disjunctive Function

الرابط (أو) يستخدم في الحياة اليومية بمعنيين مختلفين:

- 1) معنى (العناد غير التام)¹: تعتبر القضية المركبة صادقة إذا كانت على الأقل إحدى القضيتين المركبتين لها صادقة.
- 2) معنى (العناد التام)²: تعتبر القضية المركبة صادقة إذا كانت إحدى القضيتين المركبتين لها صادقة ولكن ليس كلاهما. في هذه الحالة نقول أحيانا (إما...أو...). إذا استخدم الرابط (أو) في القضية (هذا التلميذ كفاء أو جاد) في معنى العناد غير التام فإن قضية الفصل هذه تكون صادقة إذا كانت على الأقل إحدى القضيتين المركبتين لها صادقة، أي إذا كان هذا التلميذ كفاء أو

¹ - Inclusive

² - Exclusive

جاد أو كلاهما: كفاء وجاد. ويكون الفصل كاذبا فقط إذا كانت القضيتان المركبتان كلتاهما كاذبتين، أي إذا كان (التلميذ غير كفاء ومهمل).

أما إذا فهم الرابط (أو) في القضية (سعد سيكون كيميائيا أو جغرافيا) بالمعنى الآخر (العناد التام) فإن هذه القضية تعتبر صادقة، إذا كانت إحدى المركبتين كاذبة وتعتبر كاذبة إذا كانت المركبتان كلتاهما صادقتين أو كاذبتين. الكلمة (ما لم) تعبر كذلك عن فصل العناد التام، مثلا يذهب أحمد هذا المساء إلى المسرح ما لم يذهب إلى البحر بعد الظهر. ويسمى فصل العناد التام أيضا: الفصل الصارم، يرمز لفصل العناد غير التام (V) أما

العناد التام فيرمز له \dot{V} . وبما أننا سنتعامل مع فصل العناد غير التام فسنقول قضية فصل ونعني به الفصل غير التام. كما أن اختيارا واحدا سيؤدي إلى المحافظة على دقة لغتنا الرمزية. تسمى كل من المركبتين في قضية الفصل المفصولة. تعريف فصل العناد التام وغير التام يمكن وضعهما في الجدولين أدناه.

K	L	KVL
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

K	L	$\dot{L}\dot{V}\dot{K}$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

يمكن تعميم تعريف قضية الفصل إلى أي عدد من القضايا. الفصل

$M_1 \vee M_2 \vee \dots \vee M_n$ والذي عادة يرمز له $\bigvee_{i=1}^n M_i$ يكون صادقا، إذا كانت

واحدة على الأقل من المفصولات M_1, M_2, \dots, M_n صادقة، ويكون كاذبا إذا كانت جميع المفصولات كاذبة.


يسمى الرمز \vee رابطا ثنائيا. جدول صدق قضية الفصل يعرف دالة، مجموعة تعريف الدالة هي :

$\{T, F\}^2 = \{T, F\} \times \{T, F\} = \{(T, T), (T, F), (F, T), (F, F)\}$ أما مستقرها

فهو المجموعة $\{T, F\}$. يمكن التعبير عن دالة الصدق هذه بواسطة مخطط الصدق أدناه.

إذا رمزنا لدالة الفصل بواسطة \vee_f فيكون:

$$\vee_f(T, T) = T, \vee_f(T, F) = T, \vee_f(F, T) = T, \vee_f(F, F) = F$$



إن اعتبار الفصل كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد قيمة صدق $K \vee L$ وذلك بمعرفة قيمة صدق مركبتها K و L .

4.2.1 دالة الاستلزام (الشرطية) Implicative (conditional)

Function

غالبا ما نستخدم قضايا مركبة من قضيتين مرتبطتين بواسطة (إذا كان...فإن...)، فمثلا:

(1) إذا كان الرباعي ABCD متوازي أضلاع فإن قطريه AC و BD يكونان متماصفين.

(2) إذا كان الجو معتدلا فإن أحمد يذهب لزيارة أصدقائه.

كل من هاتين القضيتين قد تم الحصول عليها وذلك بوضع (إذا كان) قبل الأولى ووضع (فإن) بين القضيتين. وهكذا نسمي (إذا كان...فإن...) رابطا أيضا. إذا رمزنا بواسطة K إلى (الجو معتدل) و L إلى (أحمد يذهب لزيارة أصدقائه) فإن القضية الثانية أعلاه يمكن كتابتها على الشكل: (إذا كان K فإن L) وإذا رمزنا للرابط (إذا كان...فإن...) بواسطة \rightarrow (يستخدم أيضا الرمز \supset)، فإن هذه القضية يمكن كتابتها على الشكل $(K \rightarrow L)$. K تسمى استلزام (شرطية) إلى K و L وتقرأ: (إذا كان K فإن L) أو (K تستلزم L). يسمى K المقدم أما L فيسمى التالي. كذلك نقول: أن K شرط كافي إلى L (إلى صدق L)، و L شرط ضروري إلى K (إلى صدق K). يمكن وضع كل مبرهنة رياضية تقريبا على شكل قضية شرطية وذلك بوضع شرط (معطى) المبرهنة بعد (إذا كان) ووضع (فإن) بين شرط ومطلوب المبرهنة، أي يصبح شرط المبرهنة مقدما ومطلوب المبرهنة تاليا. إن هذا الشكل للتعبير عن المبرهنة يسمى الشكل الشرطي.

حتى ندرس متى تكون القضية الشرطية صادقة ومتى تكون كاذبة سنبدأ من نقطة استخدامها في الحياة اليومية. غالبا ما تستخدم $L \rightarrow K$ للتعبير عن حقيقة أن القضية L تنتج من القضية K . بعبارة أخرى، إننا متعودون في الممارسة اليومية على وجود علاقة سببية بين مقدم ونالي القضية الشرطية، ولهذا فإن القضايا الشرطية التالية، مثلا:

- (1) إذا كان $2 + 2 = 4$ فإن القاهرة هي عاصمة مصر.
- (2) إذا كان $2 + 2 = 4$ فإن دمشق هي عاصمة مصر.
- (3) إذا كان $2 + 2 \neq 4$ فإن القاهرة هي عاصمة مصر.
- (4) إذا كان $2 + 2 \neq 4$ فإن دمشق هي عاصمة مصر.

يبدو بدون معنى ومجرد عبث ولكن هذا ليس سببا كافيا لرفض دراستها من وجهة نظر دوال الصدق التي هي أكثر شمولاً من المعنى الدارج للقضية الشرطية في الحياة اليومية. ولكن ماذا يعني أن قضية ما L تنتج من قضية أخرى K ? إن هذا يعني عادة بأنه إذا كانت K صادقة فإن L تكون بالتأكيد صادقة أيضا. أما في الحالة المناقضة، أي إذا كانت K صادقة و L كاذبة فعندئذ يعتبر القول بأنه (من K تنتج L كاذبة) كاذبا. وهكذا فإن

$L \rightarrow K$ تعتبر كاذبة عندما تكون K صادقة و L كاذبة. ومن أجل معرفة قيم صدق $L \rightarrow K$ فمن الضروري أخذ $L \rightarrow K$ عندما تكون K كاذبة. ولتوضيح ذلك نستخدم القضية (إذا كان الرباعي ABCD معيناً (K) فإن القطرين AC و BD متعامدان (L)). إذا كانت K كاذبة فلا يمكن التأكيد أن قطرا ABCD يكونان متعامدين. كما لا يمكن التأكيد بأنهما ليسا متعامدين. وفي الحقيقة،

وكما هو معروف، فإنه توجد رباعيات ليست معينات ولكن أقطارها متعامدة. أي أنه توجد حالة تكون فيها K كاذبة و L صادقة ويتوجب اعتبار $K \rightarrow L$ صادقة. كذلك توجد رباعيات ليست معينات وأقطارها ليست متعامدة. أي أنه توجد حالة تكون فيها K كاذبة و L كاذبة ويتوجب اعتبار $K \rightarrow L$ صادقة. وحتى يظهر تلك الخواص فإننا نقول، أن القضية الشرطية $K \rightarrow L$ تكون دائما صادقة عندما تكون K كاذبة.

سنعطي مثالا توضيحيا آخر من الحياة اليومية يناقش قيم صدق القضية الشرطية، بسبب أهميتها الكبيرة كما سنرى لاحقا وكذلك لأن اغلب مصاعب دارس المنطق تعود إلى الفهم غير الدقيق للقضية الشرطية ومع الأسف فإن أغلبهم يمتلك فهما خاطئا لها.

مثال

وعد والد ابنه بأنه (إذا نجح في الامتحان فإنه سيستلم هدية منه). يمكن أن نعبر عن هذا الوعد على شكل استلزام $K \rightarrow L$ وذلك بأخذ (نجح الابن في الامتحان (K)) هو المقدم و(الابن يستلم من الوالد هدية (L)) هو التالي. الآن لنفرض أنه:

(1) الابن نجح في الامتحان، أي أن K صادقة والابن استلم الهدية من الوالد، L صادقة. في هذه الحالة يكون الوالد قد صدق (وفى) بوعده أو أن $K \rightarrow L$ صادقة.

(2) الابن نجح في الامتحان، أن K صادقة والابن لم يستلم الهدية، L كاذبة. في هذه الحالة لم يف الوالد بوعده (كذب) أي أن $K \rightarrow L$ كاذبة.

(3) الابن لم ينجح، أي أن K كاذبة والابن استلم الهدية، L صادقة. هنا الوالد قد وفى بوعدده أيضا، أي أن $L \rightarrow K$ صادقة.

(4) الابن لم ينجح في الامتحان، أي أن K كاذبة والابن لم يستلم الهدية، L كاذبة. هنا الوالد قد وفى بوعدده، $L \rightarrow K$ صادقة.


أخذين بنظر الاعتبار ما أوردناه أعلاه فإن جدول الاستنزام يكون على الشكل أدناه. يتبين من الجدول أن الاستنزام $L \rightarrow K$ يكون كاذبا فقط عندما تكون K صادقة وL كاذبة، وفي الحالات الباقية فإن $L \rightarrow K$ تكون صادقة. لقد جرت العادة على إعطاء هذا الاستنزام اسم (الاستنزام المادي).

K	L	$K \rightarrow L$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

يسمى الرابط \rightarrow رابطا ثنائيا. جدول

صدق الاستنزام يعرف دالة، ومجموعة تعريف الدالة هي:

$$\begin{aligned} \{T,F\}^2 &= \{T,F\} \times \{T,F\} \\ &= \{(T,T), (T,F), (F,T), (F,F)\} \end{aligned}$$



أما مستقرها فهو المجموعة $\{T,F\}$.

يمكن التعبير عن دالة الصدق هذه

كما هو موضح في المخطط، حيث $f \uparrow$

يرمز لدالة استنزام.

يمكننا التعبير عن دالة الاستلزام $\uparrow f$ كما يلي :

$$\cdot \uparrow f(T,T) = T, \uparrow f(T,F) = F, \uparrow f(F,T) = T, \uparrow f(F,F) = T$$

إن اعتبار الاستلزام كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد قيمة صدق $L \rightarrow K$ وذلك بمعرفة قيمة صدق مركبتها K و L . وبعبارة أخرى، فإن قيم صدق $L \rightarrow K$ تعتمد فقط على قيم صدق K وقيم صدق L .

5.2.1 دالة الاستلزام الثنائي Biconditional Function

القضية المركبة: (الرباعي ABCD يكون متوازي أضلاع إذا فقط إذا كان $BC = AD$ و $CD = AB$) تكون صادقة إذا كانت مركبتها، أي القضية (الرباعي ABCD يكون متوازي أضلاع (K) والقضية ($CD = AB$ و $BC = AD$)) كلتاها صادقتان أو كلتاها كاذبتان.

القضية المركبة المتكونة من قضيتين K و L وبينهما الرابط (إذا فقط إذا كان) تسمى الاستلزام الثنائي ويرمز له بواسطة $L \leftrightarrow K$ حيث يعبر الرابط \leftrightarrow عن (إذا فقط إذا كان) وهذا جدول صدق الاستلزام الثنائي.

K	L	$K \leftrightarrow L$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

يتم برهان القضية المركبة أعلاه وذلك ببرهان المبرهنتين المتعاكستين: (إذا كان الرباعي ABCD متوازي أضلاع فإن $CD = AB$ و $BC = AD$) و(إذا كان $CD = AB$ و $BC = AD$ فإن الرباعي ABCD يكون متوازي أضلاع).

وهكذا فإن المبرهنتين المتعاكستين يمكن كتابتهما على الشكل: (إذا كان K فإن L) و(إذا كان L فإن K). باستخدام الروابط تكتب هكذا :

$$(K \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow K)$$

نستطيع بواسطة الجدول تبيان أن قضية الوصل هذه والاستلزام الثنائي $L \leftrightarrow K$ لهما قيم الصدق نفسها، أي أن لهما المعنى نفسه والجدول يبين ذلك أدناه.

K	L	$K \rightarrow L$	$L \rightarrow K$	$(K \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow K)$	$K \leftrightarrow L$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

مثال

النقاط A, B, C تكون على استقامة واحدة إذا فقط إذا كانت المسافة من A إلى C تساوي مجموع المسافتين من A إلى B ومن B إلى C . يسمى الرابط \leftrightarrow رابطا ثنائيا. جدول صدق الاستلزام الثنائي يعرف دالة ومجموعة تعريف الدالة هي:


$$\{T, F\}^2 = \{T, F\} \times \{T, F\} = \{(T, T), (T, F), (F, T), (F, F)\}$$

أما مستقرها فهو المجموعة $\{T, F\}$. يمكن التعبير عن دالة الصدق هذه بواسطة مخطط الصدق أدناه.

إذا رمزنا لدالة الاستلزام الثنائي بواسطة $\Downarrow f$ فيكون:

$$\Downarrow f(T,T) = T, \Downarrow f(T,F) = F, \Downarrow f(F,T) = F, \Downarrow f(F,F) = T$$

إن اعتبار الاستلزام الثنائي كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد قيمة صدق $K \leftrightarrow L$ وذلك بمعرفة قيمة صدق مركبتها K و L . وبعبارة أخرى، فإن قيم صدق $K \leftrightarrow L$ تعتمد فقط على قيم صدق K وقيم صدق L .



2.1. 6 دالة الشطب (نفي الوصل) Stroke (Non-Conjunctive) Function

تتكون قضية مركبة من قضيتين وذلك باستخدام الرابط (إما لا... أو لا...) والذي يسمى (الشطب) أو (نفي الوصل) ويرمز له (\mid) ويعرف هذا الرابط بواسطة الجدول أدناه.

K	L	$K \mid L$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T


يتبين من الجدول أن $K \mid L$ تكون كاذبة فقط إذا كانت K و L صادقتين معا. مثال: نأخذ القضيتين:
أحمد طالب مجد.
أحمد يبدد وقته هباءً.

لنكوّن قضية باستخدام رابط نفي الوصل: (إما أن أحمد طالب ليس مجد أو أن أحمد لا يبدد وقته هباء). هذه القضية تفيد بأنه: لا يمكن أن يكون أحمد طالبا مجدا ويبدد وقته هباء في نفس الوقت. إن قضية نفي الوصل تكون كاذبة في حالة صدق القضيتين المركبتين لها.

يسمى الرابط | رابطا ثنائيا. جدول صدق قضية نفي الوصل يعرف دالة مجموعة تعريف الدالة هي:

$$\{T,F\}^2 = \{T,F\} \times \{T,F\} = \{(T,T), (T,F), (F,T), (F,F)\}$$

أما مستقرها فهو المجموعة $\{T,F\}$. يمكن التعبير عن دالة الصدق هذه بواسطة مخطط الصدق أدناه، حيث يرمز f لدالة نفي الوصل.



يمكننا التعبير عن لدالة نفي الوصل f كما يلي :

$$f(T,F) = T, \quad f(F,T) = T, \quad f(F,F) = T \\ f(T,T) = F$$

إن اعتبار نفي الوصل كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد

قيمة صدق $K|L$ وذلك بمعرفة قيمة صدق مركبتها K و L . وبعبارة أخرى، فإن قيم صدق $K|L$ تعتمد فقط على قيم صدق K وقيم صدق L .

2.1. 7 دالة النفي المشترك (نفي الفصل) Joint-Denial (Non-Disjunctive) Function

تتكون قضية مركبة من قضيتين وذلك باستخدام الرابط (لا...ولا) والذي يسمى (النفي المشترك) ويرمز له (\downarrow) ويعرف هذا الرابط بواسطة الجدول أدناه.

K	L	$K \downarrow L$
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

يتبين من الجدول أن $K \downarrow L$ تكون صادقة فقط إذا كانت K و L كاذبتين معا.
 مثال: لنأخذ القضيتين السابقتين ونكون منهما القضية التالية:
 أحمد ليس طالبا مجدا واحمد لا يبدد وقته هباء.

هذه القضية تكون صادقة فقط إذا كانت القضيتين اللتين تتكون منهما كاذبتين. يسمى الرابط \downarrow رابطا ثنائيا. جدول صدق قضية نفي الفصل يعرف دالة مجموعة تعريف الدالة هي:

$$\{T,F\}^2 = \{T,F\} \times \{T,F\} = \{(T,T), (T,F), (F,T), (F,F)\}$$


أما مستقرها فهو المجموعة $\{T,F\}$. يمكن التعبير عن دالة الصدق هذه بواسطة مخطط الصدق أدناه.

إذا رمزنا لدالة نفي الفصل بواسطة $f \downarrow$ فيكون:

$$\downarrow f (T,T) = F, \downarrow f (T,F) = F, \downarrow f (F,T) = F, \downarrow f (F,F) = T$$

الفصل كدالة صدق يملك أهمية خاصة لأنه يعني أننا نستطيع تحديد قيمة صدق $K \downarrow L$ وذلك بمعرفة قيمة صدق مركبتها K و L. وبعبارة أخرى،

فإن قيم صدق $K \downarrow L$ تعتمد فقط على قيم صدق K وقيم صدق L .



إن عدم انتشار استخدام كل من الرابطين \downarrow و \uparrow يعود إلى تعقيد وطول استخدامهما، فمثلاً إذا أردنا كتابة $K \rightarrow L$ بواسطة \downarrow فقط، فإننا نحصل على :

$$((K \downarrow K) \downarrow ((L \downarrow L) \downarrow (L \downarrow L))) \downarrow ((K \downarrow K) \downarrow ((L \downarrow L) \downarrow (L \downarrow L)))$$

1.3 اللغة الرمزية لحساب القضايا

تستخدم الحروف x, y, z في رموز اللغة الرياضية للتعبير عن المتغيرات العددية. كذلك تستخدم الرموز $+, -, \times, \div$ للتعبير عن العمليات على الأعداد. فمثلاً الرمز $+$ يعني إضافة ما يسبقه إلى ما هو بعده. وبالمثل يحدث بالنسبة لبقية هذه الرموز وإذن فهي ثوابت. تستخدم كذلك الحروف A, B, C, \dots في نظرية المجموعات للتعبير عن المجموعات كمتغيرات. وتستخدم الرموز \cap, \cup, \dots للتعبير عن العمليات على المجموعات. فمثلاً الرمز \cap يعني تقاطع المجموعة التي تسبقه مع المجموعة التي بعده. وبالمثل يحدث بالنسبة إلى بقية الرموز. هذه الرموز إذن ثوابت.

بشكل مشابه نرى متغيرات وثوابت في لغة حساب القضايا. الحروف A, B, C, ... وهذه الحروف ودلائلها A_1, A_2, \dots والتي تختلف عنها وذلك لتشكيل حروف إضافية للتعبير عن المتغيرات القضائية. تتكون ثوابت اللغة الرمزية هذه من رموز الروابط $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$. وأخيرا تستخدم الأقواس)، (،) للجمع. باختصار نستطيع أن نمثل لغة حساب القضايا بمجموعة الرموز التالية: $\{A, B, \dots, A_1, A_2, \dots, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\}$ إذا رمزنا لمجموعة رموز المتغيرات القضائية بالرمز P فإن مجموعة رموز حساب القضايا تصبح¹:

$$P \cup \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \} \cup \{ (,) \}$$

لقد وضعنا القوسين (,) في مجموعة لوجودهما لاختلافهما عن المجموعتين الأخريتين.

1. 4 تركيب (نحو) لغة حساب القضايا Syntax (Grammar) of language for propositional calculus

(قواعد بناء الصيغ)

لقد حصلنا من المتغيرات القضائية على تعبيرات أكثر تعقيدا (مركبة) وذلك باستخدام الروابط وكانت على الشكل :

$$\neg K, K \wedge L, K \vee K, K \rightarrow L, K \leftrightarrow L$$

منها: نفي، وصل، فصل، استلزام، استلزام ثنائي مثلا :

¹ Cori, R. Mathematical Logic, Oxford University Press, 2000.

$\neg K \wedge L, (K \wedge L) \vee M, (K \rightarrow L) \wedge M, (K \leftrightarrow L) \rightarrow M$ وبنفس

الطريقة يمكننا من هذه الأخيرة الحصول على تعبيرات أكثر تعقيدا عندما تحتوي على رموز أكثر وهكذا. مثل هذه التعبيرات سواء كانت بسيطة أم معقدة سنسميها صيغا. إن مفهوم الصيغة هذا يتعرف بواسطة قواعد بناء الصيغ التي تبين كيفية بناء الصيغ في حساب القضايا، ابتداء بالمتغيرات القضائية، و يربط هذه المتغيرات بالروابط والأقواس.

سوف نستخدم الحروف اليونانية $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ وهذه الحروف ودلائلها

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \beta_1, \beta_2, \dots$ للتعبير عن أية صيغة، فمثلا نستخدم الصيغة α

لتعوض الصيغة K ، β_1 لتعوض $M \rightarrow (K \leftrightarrow L)$ و $\alpha \wedge \beta$ لتعوض :

$\neg(K \leftrightarrow L) \rightarrow M) \wedge \neg K$. بهذه الطريقة نصل إلى تركيب (نحو) لغة

حساب القضايا الذي به نعرف ما نسميه صيغ حساب القضايا وذلك بواسطة القواعد التالية لبناء الصيغ وهي:

(1) كل متغير قضائي يكون صيغة.

(2) إذا كانت α و β صيغتان فإن كلا مما يأتي يكون صيغة.

$\neg \alpha, (\alpha \wedge \beta), (\alpha \vee \beta), (\alpha \rightarrow \beta), (\alpha \leftrightarrow \beta)$

(3) أي تتابع آخر من الرموز لا يكون صيغة.

يتم تكوين الصيغ المركبة من الصيغ البسيطة بواسطة تكرار تطبيق

القاعدة (2). وهكذا فمثلا بواسطة القاعدة (1) نرى أن K و L صيغتان.

وينتج عن هذا وبواسطة القاعدة (2) أن $(K \wedge L)$ صيغة. وإذن بواسطة

القاعدة (2) أيضا تكون $\neg(K \wedge L)$ صيغة. كمثال آخر، فإنه بواسطة القاعدة

(1) تكون K صيغة وبالتالي وبواسطة القاعدة (2) تكون $K \uparrow$ صيغة ومرة أخرى بواسطة (2) تكون $K \uparrow \uparrow$ صيغة (نستطيع الاستمرار بإضافة رمز النفي بالعدد الذي نرغبه) وفعلا فإن $K \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$ تكون صيغة.

نلاحظ أن القاعدة (2) تشترط في كل مرة ندخل فيها أحد الروابط الثنائية (أي أحد الروابط: \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow) ندخل أيضا بالمقابل زوج من الأقواس وهكذا تكون مثلا $(K \wedge L)$ صيغة بينما $K \wedge L$ ليست صيغة، لكن زوج من الأقواس يحصر كل شيء آخر في الصيغة لا يكون في الحقيقة ضروريا لجعل معنى الصيغة أكثر وضوحا. وهكذا فسنبتنى طريقة نحذف بواسطتها الأقواس الخارجية أحيانا في حالة عدم وقوع التباس. إن حذف الأقواس الخارجية هو الانحراف الوحيد عن قواعد بناء الصيغ الذي نسمح به. وهكذا فنكتب $M \rightarrow (K \leftrightarrow L)$ عوضا عن $M \rightarrow ((K \leftrightarrow L))$.

نشير إلى أن الحروف اليونانية $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ وهذه الحروف ودلائلها $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \beta_1, \beta_2, \dots$ ليست من اللغة الشبئية (لغة حساب القضايا) وإنما من ما وراء لغة¹ حساب القضايا، وهي اللغة التي تشرح لغة حساب القضايا. إن القواعد الثلاثة أعلاه تمكننا من التمييز بين تتابع الرموز الذي يكون صيغا والتتابع الذي لا يمثل صيغة.

مثال:

كل تتابع من الرموز مما يأتي لا يمثل صيغة $L \wedge K \rightarrow$ ، $K \leftrightarrow L$ $\vee K$.

¹ - Metalanguage.

الكثير من المناطقة يستخدمون مصطلح (الصيغة الجيدة التكوين) مقابل (الصيغة) الذي استخدمناه نحن من أجل الاختصار.


إن الفرق بين تتابع الرموز الذي يمثل صيغة والذي لا يمثل صيغة يشابه الفرق بين الكلمات والجمل المقامة حسب قواعد النحو أو التركيب في لغتنا العربية وجمل تتابع الحروف التي ليس لها معنى مثل (الأرض من على أحمد يكون). ويحدث أحيانا أن نجد صعوبة في التفريق في الجمل ذات المعنى والجمل عديمة المعنى في اللغة العادية ولكننا نستطيع بدقة التفريق بين التتابع الذي يمثل صيغة والتتابع الذي لا يمثل صيغة في المنطق.

Tree of Formula

1. 5 شجرة الصيغة

إن قواعد بناء الصيغ تحدد كيفية بناء الصيغ من المتغيرات القضائية ولهذا نستطيع بناء (شجرة) لكل صيغة انطلاقا من المتغيرات القضائية.

مثال: سنبنى شجرة الصيغة $(K \leftrightarrow L) \vee ((K \wedge M) \rightarrow \neg M)$



المستوى (1) من الشجرة يولف المتغيرات القضائية وكل مستوى آخر قد تم الحصول عليه بواسطة تطبيق القاعدة (2) من قواعد بناء الصيغ على الصيغ التي تقع في المستوى السابق له أو إعادة كتابة نفس الصيغ التي تم تشكيلها سابقا، فمثلا الصيغة $L \leftrightarrow K$ على المستوى 2 قد تمت إعادة كتابتها على المستوى (3).

1. 6 تمارين

(أ) حدد القضايا الذرية ثم ترجم إلى اللغة الرمزية لحساب القضايا مما يأتي:

- 1) ذهب أحمد وعلي إلى المكتبة.
- 2) المثلث ABC قائم الزاوية ومتساوي الساقين.
- 3) احمد يذهب إلى المدرسة لكن علي لا يذهب.
- 4) العدد a أكبر من b أو العدد b أكبر من a.
- 5) يسافر سالم إلى بيروت أو يبقى في داره للراحة.
- 6) إذا كان المستقيم a عموديا على c والمستقيم b عموديا على c فإن a يوازي b أو لا يوازي b.
- 7) تتدمر الحضارة البشرية إذا اندلعت الحرب الذرية.
- 8) إذا كان $ab > 0$ فإن $a > 0$ و $b > 0$ أو $a < 0$ و $b < 0$.
- 9) إذا كان $ab < 0$ فإن $a > 0$ و $b < 0$ أو $a < 0$ و $b > 0$.
- 10) $b < c$ إذا وفقط إذا كان $-c < -b$.

11) إذا كان مقياس المنطق صعبا، فإن أحمد وفاطمة ينجحان فيه إذا وفقط إذا حضرا المحاضرات.

(ب) لتكن

K: أحمد يحضر الاجتماع.

L: علي يحضر الاجتماع.

M: خلود تحضر الاجتماع.

ترجم إلى اللغة العادية كل من الصيغ التالية:

$$K \leftrightarrow M \quad (3) \quad M \rightarrow \neg K \quad (2) \quad K \rightarrow L \quad (1)$$

$$(K \rightarrow M) \vee (\neg M \rightarrow L) \quad (5) \quad (K \vee L) \rightarrow M \quad (4)$$

(ج) أنشئ جدول صدق كل من الصيغ التالية:

$$(K \vee L) \rightarrow (L \vee K) \quad (2) \quad \neg \neg K \rightarrow K \quad (1)$$

$$(K \rightarrow L) \wedge \neg L \quad (4) \quad (K \vee L) \rightarrow (\neg K \wedge \neg L) \quad (3)$$

$$(K \rightarrow (L \rightarrow M)) \leftrightarrow ((K \wedge L) \rightarrow M) \quad (6) \quad (K \rightarrow L) \leftrightarrow (\neg K \vee L) \quad (5)$$

(د) بين أن كل زوج من الصيغ التالية لهما نفس قيم الصدق:

$$\neg(K \wedge L), (\neg K \vee \neg L) \quad (3) \quad K \wedge L, L \wedge K \quad (2) \quad \neg \neg K, K \quad (1)$$

$$K \rightarrow L, \neg K \vee L \quad (5) \quad \neg(K \vee L), (\neg K \wedge \neg L) \quad (4)$$

$$K \rightarrow (L \rightarrow M), (K \wedge L) \rightarrow M \quad (6)$$

(ه) أنشئ شجرة كلا من الصيغتين التاليتين:

$$(1) \neg(K \wedge L) \rightarrow \neg(K \wedge L) \vee (M \rightarrow L) \wedge (K \leftrightarrow (L \vee \neg M)) \quad (2)$$

(و) لتكن K, L, M تعبر عن القضايا التالية:

$$K: 2^3 = 8, \quad L: 4 \times 6 = 20, \quad M: 9 \text{ عدد فردي}$$

حدد فيما إذا كانت كل من الصيغ التالية صادقة أو كاذبة بعد ترجمتها إلى اللغة العادية.

$$(أ) \neg(K \vee L) \wedge M \quad (ب) L \wedge M \quad (ج) \neg K \rightarrow \neg L \quad (د) (K \vee L) \wedge M$$

(ز) برهن باستخدام جداول الصدق أن كلا من أزواج الصيغ التالية لها نفس قيم الصدق:

$$(أ) \neg K, (K \downarrow K)$$

$$(ب) (K \wedge L), ((K \downarrow K) \downarrow (L \downarrow L))$$

$$(ج) \neg K, (K | K)$$

$$(د) (K \vee L), ((K | K) | (L | L))$$

(ح) لتكن K و L تعبران عن قضايا صادقة و M و N تعبران عن قضايا كاذبة.

حدد قيمة صدق كل من الصيغ التالية:

$$(1) \neg K, (2) L \vee M, (3) \neg(L \vee M), (4) \neg K \wedge \neg(L \vee M)$$

$$(5) \neg(L \vee M) \rightarrow N, (6) \neg N \vee \neg(K \wedge \neg(L \vee M))$$

$$(7) (K \leftrightarrow L) \rightarrow (L \rightarrow K), (8) \neg(K \wedge L) \leftrightarrow (\neg K \vee \neg L)$$

(ط) باستخدام قواعد بناء الصيغ، حدد فيما إذا كان كل مما يأتي يمثل صيغة في حساب القضايا. وضح إجابتك.

$$\neg(K \vee L) \quad (5), \quad (K \vee L) \quad (4), \quad K L \quad (3), \quad (\neg K) \quad (2), \quad \neg\neg\neg K \quad (1)$$

$$K \rightarrow L \rightarrow M \quad (8), \quad ((K) \leftrightarrow L) \quad (7), \quad \neg((K \wedge \neg L)) \quad (6)$$

الفصل الثاني

Natural Deduction of
propositional calculus

الاستنتاج الطبيعي لحساب
القضايا

لقد سمينا الاستنتاج هنا بالطبيعي بسبب قربه من طريقة إقامة الدليل التي يقوم بها الناس وعلى وجه الخصوص في المجالات القانونية، العلمية والفلسفية وتكون أقرب إلى طريقة الرياضيين في برهان المبرهنات. طريقة الاستنتاج الطبيعي عبارة عن مجموعة من قواعد الاشتقاق، أما المفهوم المركزي فيها فهو مفهوم البرهان الصوري وهي طريقة تركيبية¹ بحتة. فمن الممكن التحقق من صحة البرهان الصوري بدون الرجوع إلى دلالة الرموز الداخلة في هذا البرهان. ولكن إثبات هذه القواعد يكون دلاليا وهذا ما سنبينه في الخمس الأولى منها. سندرس أيضا أنواع البراهين الصورية ولتبدأ ببعض التعاريف المرتبطة بهذا المفهوم.

2. 1 أنواع الصيغ

Tautology

1. الصيغة التكرارية

تكون الصيغة تكرارية إذا كانت صادقة من أجل جميع قيم الصدق الممكنة لمتغيراتها القضائية.

مثال: كل من الصيغتين التاليتين تكون تكرارية: $(K \wedge K)$ ، $(K \vee \neg K)$.

¹ - Syntactic

K	$\neg K$	$K \vee \neg K$	$\neg(K \wedge \neg K)$
T	F	T	T
F	T	T	T

يتبين من الجدولين أن كلا من $K \vee \neg K$ ، $\neg(K \wedge \neg K)$ تكون صادقة لجميع قيم الصدق الممكنة لمتغيرها القضائي K. وهكذا فهما صيغتان تكرر إيتان.

الصيغة $K \vee \neg K$ تسمى قانون الثالث المرفوع والذي ينص في المنطق التقليدي (ثنائي القيمة) كما يلي :

تكون القضية صادقة أو كاذبة وليس ثمة أمرا ثالثا. أما الصيغة الثانية $\neg(K \wedge \neg K)$ فتسمى عادة قانون عدم التناقض والذي ينص على أن القضية لا يمكن أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الوقت.

Contradiction

2. الصيغة المتناقضة

تسمى الصيغة متناقضة إذا كانت كاذبة من أجل جميع قيم الصدق الممكنة لمتغيراتها القضائية.

مثال: الصيغة التالية متناقضة: $\alpha \equiv \neg((K \vee L) \leftrightarrow (L \vee K))$

K	L	$K \vee L$	$(K \vee L) \leftrightarrow (L \vee K)$	α
T	T	T	T	F
T	F	T	T	F
F	T	T	T	F
F	F	F	T	F

يتبين من الجدول أن $((K \vee L) \leftrightarrow (L \vee K))$ تكون كاذبة لجميع قيم الصدق الممكنة لمتغيراتها القضائية، أي أنها صيغ متناقضة.

3. الصيغة العارضة Contingency

بالإضافة إلى الصيغ التكرارية والصيغ المتناقضة فإنه يوجد نوع ثالث من الصيغ والتي هي ليست تكرارية ولا متناقضة وتسمى الصيغ العارضة. تسمى الصيغة عارضة إذا كانت صادقة من أجل بعض قيم الصدق الممكنة لمتغيراتها القضائية وكاذبة من أجل قيم أخرى.

مثال: الصيغة التالية عارضة: $(K \vee L) \rightarrow M$

K	L	M	$K \vee L$	$(K \vee L) \rightarrow M$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

يتبين من الجدول أن $(K \vee L) \rightarrow M$ تكون صادقة لبعض قيم الصدق لمتغيراتها القضائية وكاذبة لقيم أخرى.

سوف ندخل طريقة أخرى لكتابة جداول الصدق. وتعتبر هذه الطريقة

الأسهل عند كتابة جداول الصيغ المعقدة. المثال أدناه يوضح هذه الطريقة.

مثال: لننشئ جدول صدق الصيغة $\neg K \rightarrow ((K \rightarrow L) \wedge \neg L)$

((K	→	L)	∧	⌈	L)	→	⌈	K
T	T	T	F	F	T	T	F	T
T	F	F	F	T	F	T	F	T
F	T	T	F	F	T	T	T	F
F	T	F	T	T	F	T	T	F
(1)	(5)	(2)	(8)	(6)	(3)	(9)	(7)	(4)

نلاحظ أنه قد تم إنشاء الجدول حسب الخطوات التالية:

أولاً: إنشاء أعمدة قيم الصدق الخاصة بالمتغيرات القضائية وهي الأعمدة (1)، (2)، (3)، (4).

ثانياً: إنشاء أعمدة قيم الصدق الخاصة بروابط المجال الأضيق من اليسار إلى اليمين، وفي هذه الحالة يكون الرابط \rightarrow هو الأول (العمود (5)) في حين يتلوه الرابطان الآخران الدالان على النفي (العمودان (6) و(7)).

ثالثاً: إنشاء جدول قيم الصدق الخاصة بالروابط الأخيرة الباقية التي تؤدي وظيفتها ابتداء من المجال الأضيق إلى المجال الأوسع، حيث أنشأنا قيم صدق الرابط \wedge بين $(K \rightarrow L)$ و $\lceil L$ (العمود (8))، وأخيراً نكمل الجدول بإنشاء الرابط الخاص بأوسع مجال وهو \rightarrow (العمود (9)) الذي يقع بين $(\lceil L) \wedge (K \rightarrow L)$ على يساره و $\lceil K$ على يمينه.

نلاحظ أن العمود الرئيسي في جدول الصدق وهو عمود الرابط ذي المجال الأوسع (أو الرابط الرئيسي) يحتوي على قيمة الصدق T فقط وبالتالي فإن الصيغة المعطاة في المثال هي صيغة تكرارية.

2. العلاقة (ينتج) والعلاقة (يكافئ)

لقد ناقشنا في الفقرة (4.2.1) العلاقة (ينتج) بين القضايا وسنقوم الآن بإعطاء تعريف لها بين الصيغ.

نقول بأنه من الصيغة α تنتج الصيغة β إذا كانت $\alpha \rightarrow \beta$ صيغة تكرارية. وللتعبير رمزيا بأنه من α تنتج β نكتب: $\alpha \Rightarrow \beta$.

مثال: لناخذ زوجي الصيغ التالية: $K \leftrightarrow L, K \rightarrow L$ و $K \vee L, K \wedge L$ ولتبنى الجدول التالي:

K	L	$K \leftrightarrow L$	$K \rightarrow L$	$K \vee L$	$K \wedge L$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F

يتبين من الجدول أنه إذا كانت $K \leftrightarrow L$ صادقة فإن $K \rightarrow L$ صادقة أيضا وهكذا فإن $(K \leftrightarrow L) \rightarrow (K \rightarrow L)$ تكون صادقة دائما أي أنها صيغة تكرارية. ولهذا يمكننا القول أنه، من $K \leftrightarrow L$ تنتج $K \rightarrow L$. أما بالنسبة إلى $K \vee L$ و $K \wedge L$ فيتبين من الجدول أنه على السطرين 2، 3 فإن $K \vee L$ صادقة ولكن $K \wedge L$ كاذبة وهكذا فإن $(K \vee L) \rightarrow (K \wedge L)$ ليست تكرارية ونقول أنه من $K \vee L$ لا تنتج $K \wedge L$. يتبين من الجدول أنه: من $K \leftrightarrow L$ لا تنتج $K \vee L$ وكذلك من $K \leftrightarrow L$ لا تنتج $K \wedge L$.

يحدث غالبا أن تنتج قضية من قضيتين أو أكثر، لناخذ المثال أدناه.

من القضيتين:

1) إذا كانت الأرض تدور حول الشمس فإن الأرض تتحرك.

و

2) الأرض تدور حول الشمس.

نقول بأنه تنتج القضية: الأرض تتحرك.

سنقوم الآن بتعميم مفهوم العلاقة (ينتج) إلى أي عدد من الصيغ حسب

التعريف التالي:

نقول بأن الصيغة β تنتج من الصيغ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ إذا كانت

$\beta \rightarrow (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \dots \wedge \alpha_n)$ صيغة تكرارية. بشكل خاص، إذا كانت β نفسها

تكرارية فإنها تنتج من مجموعة خالية من الصيغ.

مثال: الصيغة $\neg K$ تنتج من الصيغتين L و $K \rightarrow L$ وذلك لأن

$\neg K \rightarrow ((K \rightarrow L) \wedge \neg L)$ صيغة تكرارية.

نقول بأن الصيغة α تكافئ β (أو أنهما متكافئتان) إذا كانت $\alpha \leftrightarrow \beta$

صيغة تكرارية. رمزيا نكتب $\alpha \Leftrightarrow \beta$.

مثال: الصيغة $\neg K \wedge \neg L$ تكافئ $\neg(K \rightarrow L)$ لأن $\neg(K \rightarrow L) \leftrightarrow (\neg K \wedge \neg L)$ صيغة

تكرارية. الجدول التالي يبين هذا التكافؤ:

K	L	$K \rightarrow L$	$\neg(K \rightarrow L)$	$\neg K \wedge \neg L$	$\neg(K \rightarrow L) \leftrightarrow (\neg K \wedge \neg L)$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	F	F	T

نستطيع الآن برهان المبرهنتين التاليتين:

مبرهنة₁

إذا كانت $\alpha_1 \Leftrightarrow \beta_1$ (α_1, β_1 صيغتان) فإن $\alpha_1 \Rightarrow \beta_1$ و $\alpha_1 \Rightarrow \beta_1$.

البرهان

بما أن $\alpha_1 \Leftrightarrow \beta_1$ فإن $\alpha_1 \Leftrightarrow \beta_1$ صيغة تكرارية. أي أن قيم صدق α_1 تساوي قيم صدق β_1 من أجل جميع قيم الصدق الممكنة للمتغيرات القضائية المكونة إلى α_1 و β_1 . وهذا يعني أن $\alpha_1 \rightarrow \beta_1$ صيغة تكرارية وبالمثل $\alpha_1 \rightarrow \beta_1$ صيغة تكرارية، وهكذا يكون $\alpha_1 \Rightarrow \beta_1$ و $\alpha_1 \Rightarrow \beta_1$.

مبرهنة₂

إذا كانت $\alpha_1 \Rightarrow \beta_1$ و $\alpha_1 \Rightarrow \beta_1$ فإن $\alpha_1 \Leftrightarrow \beta_1$.

البرهان مماثل للبرهان السابق.

2.3 صورة الحجة وبرهان صحتها Argument Form and Proving its Validity

صورة الحجة هي مجموعة منتهية من الصيغ إحداها تسمى نتيجة والأخرى تسمى مقدمات.

كذلك يمكننا أن نقول أن صورة الحجة هي متتالية من الصيغ

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ، حيث $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ هي المقدمات و α_n هي النتيجة.

تكون صورة الحجة صحيحة إذا كانت النتيجة صادقة عندما تكون جميع

المقدمات صادقة، أو أن $\beta \rightarrow (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n)$ صيغة تكرارية. أي أن

$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n \Rightarrow \beta$ (تقرأ: من α_1 و α_2 وإلى α_n تنتج β).

صورة الحجة الصحيحة التي مقدماتها $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ونتيجتها β نكتبها هكذا: $\beta \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. الرمز \mid يقرأ (يقرر) والذي يرمز لكلمة (إن) التي تفصل المقدمات عن النتيجة. هذا الرمز ليس من لغة حساب القضايا وإنما ينتمي إلى ما وراء اللغة الخاصة بحساب القضايا. وهكذا فالرمز \mid يقرر أن النتيجة β التي على يمينه تنتج من المقدمات التي على يساره فقط. إن صورة الحجة في الفقرة (1.1) يمكن كتابتها على الشكل $K \mid L, K \rightarrow L$.

نبين الآن كيفية استخدام جدول الصدق لبرهان صحة صورة حجة مقدماتها $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ونتيجتها β . سنبين ما نريد وذلك بإنشاء جدول مختصر يبرهن صحة صورة الحجة إذا كانت جميع الأسطر التي تكون فيها كل المقدمات صادقة فيجب أن تكون فيها النتيجة صادقة أيضا. إن هذا يكفي لبرهان أن $\beta \rightarrow (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n)$ صيغة تكرارية، لأنه في حالة كون إحدى معطوفات المقدم (أي $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$) تكون كاذبة، على الأقل، فإن هذا يكفي لأن يكون المقدم $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ كاذبا وبالتالي تكون $\beta \rightarrow (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n)$ صادقة. ولهذا وكما سنفعل في المثال أدناه سنقوم في الاستمرار بإيجاد قيم الصدق من المقدمات في كل سطر على التوالي عندما تكون المقدمات صادقة وسنتوقف عن هذا الإيجاد عند ظهور أول قيمة F لمقدمة على السطر وذلك لأن هذا يكفي كما أسلفنا لأن تكون:

$$\beta \rightarrow (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \text{ صادقة.}$$

مثال

سنبرهن صحة صورة الحجة التي مقدماتها:

المختصر أدناه. $\alpha_1: M \vee \neg K$, $\alpha_2: (K \rightarrow L) \vee \neg M$, $\alpha_3: K$ ونتيجتها L : وذلك بإنشاء الجدول

K	L	M	α_1	α_2	α_3	β	$(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \alpha_3) \rightarrow \beta$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F				T
T	F	T	T	F			T
T	F	F	F				T
F	T	T	T	T	F		T
F	T	F	T	T	F		T
F	F	T	T	T	F		T
F	F	F	T	T	F		T

نلاحظ من الجدول أن السطر 1 هو الوحيد الذي فيه المقدمات صادقة وعلى نفس السطر يقابلها نتيجة صادقة. أي أنه لا يوجد أي سطر تكون فيه المقدمات جميعها صادقة والنتيجة كاذبة. إذن صورة الحجة صحيحة. ولتطبيق ما ذكرناه حول برهان صحة صورة حجة في هذه الفقرة على هذا المثال، قمنا بإضافة العمود الأخير حيث نلاحظ أن الصيغة $(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \alpha_3) \rightarrow \beta$:

1) تكون على السطر الأول صادقة لأن جميع المعطوفات $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ صادقة والنتيجة صادقة أيضا.

2) تكون على السطر الثاني صادقة لأن المعطوفة الأولى من مقدمها كاذبة.

3) تكون على السطر الثالث صادقة لأن المعطوفة الثانية من مقدمها كاذبة.

4) تكون على السطر الرابع صادقة لأن المعطوفة الأولى من مقدمها كاذبة.

5) تكون على السطر الخامس صادقة لأن المعطوفة الثالثة من مقدمها كاذبة.

وهكذا يمكن ملاحظة أنه على جميع الأسطر الثمانية تكون الصيغة $\beta \rightarrow (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \alpha_3)$ دائما صادقة من أجل جميع قيم الصدق الممكنة لمتغيراتها القضائية K, L, M أي أنها صيغة تكرارية. واذن :

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta$$

2. 4 برهان خطأ صورة حجة Proving Invalidity of Argument Form

للتحقق من أن صورة حجة ما صحيحة نقوم باستخدام الجدول والتحقق من أنه عندما تكون جميع مقدمات الحجة صادقة فإن نتیجتها تكون صادقة أيضا. أما للتحقق من خطأ صورة حجة ما فإنه يكفي وجود سطر واحد على الأقل تكون فيه جميع المقدمات صادقة ولكن النتيجة تكون كاذبة. ولهذا سنقوم بإيجاد تعيين واحد لقيم صدق المتغيرات القضائية بحيث تكون جميع المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. إن هذا التعيين يسمى (المثال-المضاد)¹.

مثال

لنأخذ الحجة التالية ونحاول تحديد صحتها

إذا سافر أحمد إلى تونس لقضاء إجازته، فإن ماجد يسافر إلى تونس أيضا وإذا سافر ماجد إلى تونس، فإن فائزة تسافر أيضا. أحمد يسافر إلى تونس لقضاء إجازته أو فائزة تسافر. إذن، ماجد لا يسافر إلى تونس. القضايا الذرية.

أحمد يسافر إلى تونس لقضاء إجازته. K

¹ - Counter-example

L ماجد يسافر إلى تونس لقضاء إجازته.

M فائزة تسافر إلى تونس لقضاء إجازتها.

الترجمة

المقدمات $\alpha_1: (K \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow M), \alpha_2: K \vee M$

النتيجة $\beta: \neg L$

سنحاول أولاً إعطاء مثال-مضاد أي إيجاد تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية K, L, M بحيث تكون المقدمات جميعها صادقة والنتيجة كاذبة. نأخذ $\neg L$ كاذبة. حتى تكون $\neg L$ كاذبة يجب أن تكون L صادقة. الآن حتى تكون α_1 صادقة فيجب أن تكون كلتا المعطوفتين صادقتان. حتى تكون المعطوفة الأولى $K \rightarrow L$ صادقة وبما أن L صادقة فإن K يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة. حتى تكون المعطوفة الثانية $L \rightarrow M$ صادقة وبما أن L صادقة فإن M يجب أن تكون صادقة أيضاً. وحتى تكون α_2 أي $K \vee M$ صادقة وبما أن M صادقة فإن K يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة. وهكذا نحصل، من هذه المناقشة، على السطر المطلوب التالي من الجدول (أي، المثال-المضاد):

K	L	M	α_1	α_2	β	$(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \beta$
T	T	T	T	T	F	F

يستخدم المثال-المضاد في مختلف العلوم. سنجد مثال-مضاد للقضية التالية: لأية ثلاثة مجموعات A, B, C يكون $A \cup (B - C) = (A \cup B) - C$. نعطي المثال-المضاد التالي: لتكن $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{2, 4, 6\}, C = \{2, 3, 5\}$ وهكذا

فإن $A \cup (B - C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ولكن $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ وبالتالي

$$A \cup (B - C) \neq (A \cup B) - C \quad \text{وإذن : } (A \cup B) - C = \{1, 4, 6\}$$

يقال أيضا بأن صورة حجة تكون خاطئة إذا كانت على الأقل حالة خاصة واحدة من تلك الصورة خاطئة.

من الأفضل عند تحديد صحة صورة حجة ما البدء بمحاولة البرهان على خطأ صورة الحجة، أي إعطاء مثال-مضاد وذلك لأنه أكثر اختصارا وفعالية وإذا لم ننجح في هذه المحاولة فنقول بأننا وصلنا إلى (طريق مسدود) وهكذا تكون صورة الحجة صحيحة.

من المهم ملاحظة أن صحة صورة حجة تعتمد فقط على تركيبها. أي أن صحة أو خطأ صورة حجة لا تعتمد على معنى قضاياها الذرية، وإنما تعتمد فقط على تركيب مكوناتها (المقدمات والنتيجة). سنوضح ذلك بمقارنة المثالين التاليين:

مثال I

إذا واطب أحمد على الدراسة فإنه سيحصل على نقاط جيدة. إذا لم يواظب أحمد على الدراسة فإنه يتمتع بوقت فراغ كبير. إذن يحصل أحمد على نقاط جيدة أو يتمتع بوقت فراغ كبير.

القضايا الذرية

K	أحمد يواظب على الدراسة.
L	يحصل أحمد على نقاط جيدة.
M	يتمتع أحمد بوقت فراغ كبير.

الترجمة

$$\alpha_1: K \rightarrow L, \alpha_2: \neg K \rightarrow M$$

المقدمات

$$L \vee M$$

النتيجة

سنحاول أولاً البرهان على خطأ صورة الحجة، أي إعطاء مثال-مضاد. نأخذ النتيجة كاذبة، أي أن L كاذبة و M كاذبة. حتى تكون α_1 صادقة وبما أن L كاذبة فيجب أن تكون K كاذبة. حتى تكون α_2 صادقة وبما أن M كاذبة فإن $\neg K$ يجب أن تكون كاذبة، أي أن K يجب أن تكون صادقة. إذن وصلنا إلى طريق مسدود: K يجب أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الوقت وهذا غير ممكن. إذن يفشل المثال المضاد والحجة صحيحة.

مثال 2

أحمد يواظب على الدراسة ويحصل على نقاط جيدة. أحمد لا يواظب على الدراسة أو يتمتع بوقت فراغ كبير. إذن، إذا كان أحمد يواظب على الدراسة فإنه لن يتمتع بوقت فراغ كبير. باستخدام نفس الحروف لنفس القضايا الذرية كما في المثال (I) نحصل على الترجمة التالية:

$$\alpha_1: K \wedge L, \alpha_2: \neg K \vee M$$

المقدمات

$$\beta: K \rightarrow \neg M$$

النتيجة

سنحاول الحصول على مثال-مضاد. نأخذ النتيجة β كاذبة أي يجب أن تكون K صادقة و M صادقة. حتى تكون α_1 صادقة وبما أن K صادقة فيجب

أن تكون L صادقة. α_2 تكون صادقة لأن M صادقة و K صادقة. إذن صورة الحجة خاطئة و سطر الجدول المطلوب الذي يمثل المثال-المضاد هو:

K	L	M	α_1	α_2	β	$(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \beta$
T	T	T	T	T	F	F

نلاحظ أنه بالرغم من أن رموز القضايا الذرية في المثال (2) تحمل نفس معنى القضايا الذرية في المثال (1) ولكن الحجة هنا خاطئة وذلك لأن تركيب الحجة (تركيب المقدمات والنتيجة) في المثال (2) يختلف عن تركيب المثال (1).

Rules of Derivation

2. 5 قواعد الاشتقاق

سنكشف في هذه الفقرة عما نعنيه بقواعد الاشتقاق¹ (الاستدلال) وعن كيفية استخدام بعض هذه القواعد وأكثرها أهمية. سنختار أمثلة مختلفة نستطيع بواسطتها توضيح هذا الاستخدام بشكل أفضل. سنبرهن بواسطة جداول الصدق صحة حالات خاصة من بعض قواعد الاشتقاق والتي تمتلك عدد غير محدود من هذه الحالات الخاصة.

قواعد الاشتقاق هي صور حجج أساسية (بسيطة) صحيحة، وأما وظيفتها فهي اشتقاق (استنتاج) نتيجة صورة حجة من مقدماتها، وذلك باستخدام متتالية من هذه القواعد. سنكشف في مثال عن هذه المتتالية في فقرة

¹ - Derivation (Inference)

(البراهين الصورية). إن الاشتقاق هو كيفية الانتقال من صيغة أو عدد من الصيغ (تسمى المقدمات) إلى صيغة أخرى (تسمى النتيجة).

1. قاعدة الوضع (إثبات التالي) Modus Ponens

سنطبق التعريف المعطى للعلاقة ينتج على المثال التالي:

(1) إذا كانت الأرض تدور حول الشمس فإن الأرض تتحرك.

(2) الأرض تدور حول الشمس.

(3) الأرض تتحرك.

إذا رمزنا بواسطة K للقضية: الأرض تدور حول الشمس، وبواسطة L

للقضية الأرض تتحرك فإن القضيتين (1) و(2) في المثال هذا يمكن أن تكتب هكذا:

$$K \rightarrow L \quad (1)$$

$$K \quad (2)$$

سنتحقق من أنه حسب تعريف العلاقة (ينتج) فإنه من $K \rightarrow L$ و K تنتج

(تشتق) L . ومن أجل ذلك يكفي برهان أن الصيغة $L \rightarrow (K \wedge (K \rightarrow L))$

تكون تكرارية. أي أنه من $K \rightarrow L$ و K نستق L . هذا الاشتقاق صحيح لأن

$L \rightarrow (K \wedge (K \rightarrow L))$ صيغة تكرارية والجدول أدناه يبين ذلك. وبتعبير آخر

$$K \rightarrow L, K \quad \vdash \quad L$$

K	L	$K \rightarrow L$	K	L	$(K \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow L$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	T	F	F	T

يتبين من الجدول أنه عندما تكون المقدمتان K و $K \rightarrow L$ صادقتين فإن النتيجة L تكون صادقة أيضا وهذا ما يحدث في السطر الأول فقط ولا يوجد أي سطر تكون فيه المقدمتان صادقتان والنتيجة كاذبة. يبين العمود الأخير من الجدول أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة يكون صيغة تكرارية.

مخطط قاعدة اشتقاق النتيجة β من المقدمات $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (حيث β)

$\frac{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n}{\beta}$: (أية صيغ) تكتب على الشكل التالي: $(i = 1, 2, \dots, n)$

وهكذا فإن مخطط قاعدة الوضع يكتب: $\frac{\alpha \rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$ (حيث α, β أية

صيغتان). إن قاعدة الوضع تنص على أن: من استلزام ومقدمه يمكن اشتقاق تاليه، إذن $\alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \beta$.

إن قاعدة الوضع التي هي قاعدة اشتقاق صحيحة عادة ما تخطط بقاعدة

الاشتقاق $\frac{\alpha \rightarrow \beta, \beta}{\alpha}$ (حيث α, β أية صيغتان) الغير صحيحة. يمكن معرفة

ذلك بواسطة استخدام جدول الصدق لحالة خاصة منها، مثلا: بأخذ K هي α ,

L هي β فتصبح $\frac{K \rightarrow L, L}{K}$. يكفي لبرهان عدم صحتها تبين أن

$(L \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow K$ ليست صيغة تكرارية وهكذا يكون: من L و $K \rightarrow L$ لا تنتج K . الجدول أدناه يبين ما نريد.

K	L	$K \rightarrow L$	$L \wedge (K \rightarrow L)$	$(L \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow K$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	F
F	F	T	F	T

نرى من الجدول أنه على السطر الثالث تكون مقدمتي الحجة L و $K \rightarrow L$ صادقتين بينما النتيجة K كاذبة، أي أن K لا تنتج من المقدمتين المذكورتين أو أن صورة الحجة خاطئة وبالتالي هي ليست قاعدة اشتقاق صحيحة. العمود الأخير من الجدول يبين أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة ليس صيغة تكرارية.

Modus Tollens

2. قاعدة نفى التالي

سنعرض لهذه القاعدة بأخذ المثال التالي: من القضيتين

(1) إذا نجح أحمد في الامتحان فإنه يجد عملا.

و

(2) لم يجد أحمد عملا.

تنتج القضية (لم ينجح أحمد في الامتحان). إذا رمزنا بواسطة K للقضية (نجح أحمد في الامتحان) وبواسطة L إلى (يجد أحمد عملا)، فإننا يمكننا أن نكتب القضيتين في المثال هكذا :

$$K \rightarrow L \quad (1)$$

$$\neg L \quad (2)$$

سنتحقق من أنه حسب تعريف العلاقة (ينتج) فإنه من $K \rightarrow L$ و $\neg L$ تنتج $\neg K$ ومن أجل ذلك يكفي برهان أن $\neg K \rightarrow (\neg L \wedge (K \rightarrow L))$ صيغة تكرارية، وبعبارة أخرى فإن صورة الحجة المتكونة من المقدمين $\neg L$ و $K \rightarrow L$ والنتيجة $\neg K$ صحيحة. هذا البرهان يمكن تحقيقه بواسطة الجدول أدناه.

K	L	$K \rightarrow L$	$\neg L$	$\neg K$	$(\neg L \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow \neg K$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

نرى من الجدول أنه عندما تكون المقدمتان $\neg L$ و $K \rightarrow L$ صادقتين فإن النتيجة $\neg K$ تكون صادقة. هذا يحدث في السطر الرابع ولا يوجد أي سطر تكون فيه المقدمتان صادقتان والنتيجة كاذبة. كذلك يبين العمود الأخير أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة يكون صيغة تكرارية. بشكل مشابه نستطيع البرهنة على أنه من القضيتين:

(1) إذا كانت السماء تمطر فإن السماء تكون غائمة.

و

(2) السماء ليست غائمة

تنتج القضية (السماء لا تمطر).

يمكن توضيح قاعدة نفي التالي بأسلوب مبسط أكثر عندما نستخدم قضايا تتعلق بحالات معروفة لدينا وقريبة منا في الحياة اليومية، فمثلا: لنفرض أن أمامنا كمية من الماء ونريد أن نبرهن أن القضية (درجة حرارة الماء تساوي 100° كاذبة، يمكننا أن نستدل هكذا: إذا كانت درجة حرارة الماء تساوي 100° فإن الماء يجب أن يغلي. ولكننا نرى بوضوح أن الماء لا يغلي. من هنا ينتج أن القضية (درجة حرارة الماء تساوي 100°) كاذبة.

مخطط قاعدة نفي التالي يكتب على الشكل $\frac{\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta}{\neg \alpha}$ (حيث α, β أية

صيغتان). قاعدة نفي التالي تنص على أن: من استلزام ونفي تاليه يمكن اشتقاق نفي مقدمه، أو أن $\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \vdash \neg \alpha$.

إن قاعدة الاشتقاق الصحيحة هذه عادة ما تخلط بقاعدة الاشتقاق

الغير صحيحة. ويمكن برهان ذلك بواسطة استخدام جدول $\frac{\alpha \rightarrow \beta, \neg \alpha}{\neg \beta}$

الصدق لحالة خاصة مثلا، بأخذ K هي α و L هي β فتصبح $\frac{K \rightarrow L, \neg K}{\neg L}$.

يكفي لبرهان عدم صحتها تبيان أن $\neg L \rightarrow ((K \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow \neg K)$ صيغة غير تكرارية. وهكذا يكون: من K و $L \rightarrow K$ لا تنتج $\neg L$. الجدول أدناه يبين ما نريد.

K	L	$K \rightarrow L$	$\neg K$	$\neg L$	$(\neg K \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow \neg L$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	F
F	F	T	T	T	T

نرى أنه على السطر الثالث تكون مقدمتا صورة الحجة $K \rightarrow L$ و $\neg K$ صادقتين بينما النتيجة $\neg L$ كاذبة، أي أن $\neg L$ لا تنتج من المقدمتين المذكورتين أو أن صورة الحجة خاطئة وبالتالي فهي ليست قاعدة اشتقاق صحيحة. كذلك فإن العمود الأخير من الجدول يبين أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة ليس صيغة تكرارية.

Rule of Hypothetical Syllogism

3. قاعدة القياس الشرطي

من صدق القضيتين :

(1) إذا كانت زاويتان من المثلث ADC تساوي زاويتين من المثلث BEC (K) فإن المثلثين ADC و BEC يكونان متشابهين (L).

و

(2) إذا كان المثلثان ADC و BEC متشابهين فإن $\frac{AD}{BE} = \frac{AC}{BC}$ (M).

يمكننا أن نقول بأننا قد برهنا صدق القضية (إذا كانت زاويتان من

المثلث ADC تساوي زاويتين من المثلث BEC (K) فإن $\frac{AD}{BE} = \frac{AC}{BC}$ (M)،

أي أننا برهنا صدق القضية $K \rightarrow M$. لقد أصبح واضحا أنه عندما تكون $K \rightarrow L$ و $L \rightarrow M$ صادقتان فإن $K \rightarrow M$ تكون صادقة أيضا، أي أنه من

$K \rightarrow L$ و $L \rightarrow M$ تنتج $K \rightarrow M$. وبعبارة أخرى فإن صورة الحجة المتكونة من المقدمتين $K \rightarrow L$ و $L \rightarrow M$ والنتيجة $K \rightarrow M$ صحيحة. أي أن :

$K \rightarrow L, L \rightarrow M \vdash K \rightarrow M$. ومن أجل أن نبرهن أن هذا صحيحا يكفي برهان أن $\alpha \equiv ((K \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow M)) \rightarrow (K \rightarrow M)$ صيغة تكرارية ونستطيع تبيان ذلك بواسطة جدول الصدق أدناه.

K	L	M	$K \rightarrow L$	$L \rightarrow M$	$K \rightarrow M$	α
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T
T	F	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T

يتبين من الجدول أنه عندما تكون المقدمتان $K \rightarrow L$ و $L \rightarrow M$ صادقتين فإن النتيجة $K \rightarrow M$ تكون صادقة أيضا. هذا يحدث على الأسطر: الأول والخامس والسابع والثامن ولا يوجد أي سطر تكون فيه المقدمتان صادقتين والنتيجة كاذبة. كذلك يبين العمود الأخير من الجدول أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة يكون صيغة تكرارية.

مخطط قاعدة القياس الشرطي يكتب على الشكل التالي:

$$\text{(حيث } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ أية صيغ). قاعدة القياس الشرطي } \frac{\alpha_1 \rightarrow \alpha_2, \alpha_2 \rightarrow \alpha_3}{\alpha_1 \rightarrow \alpha_3}$$

تنص على أنه:

من $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2$ و $\alpha_2 \rightarrow \alpha_3$ نستق $\alpha_1 \rightarrow \alpha_3$ (حيث $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ أية صيغ).

نستطيع أن نكتب: $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2, \alpha_2 \rightarrow \alpha_3 \mid \alpha_1 \rightarrow \alpha_3$.

تعميم قاعدة القياس الشرطي إلى أي عدد من الصيغ يكون على الشكل

التالي:

$$\frac{\alpha_1 \rightarrow \alpha_2, \alpha_2 \rightarrow \alpha_3, \dots, \alpha_{n-2} \rightarrow \alpha_{n-1}, \alpha_{n-1} \rightarrow \alpha_n}{\alpha_1 \rightarrow \alpha_n}$$

يستخدم القياس الشرطي في برهان المبرهنات الرياضية. ذلك لأن

المبرهنات على الشكل $M_1 \rightarrow M_n$ لا يمكن برهان صدقها مباشرة وإنما بواسطة برهان القضايا البينية:

$M_1 \rightarrow M_2, M_2 \rightarrow M_3, \dots, M_{n-2} \rightarrow M_{n-1}, M_{n-1} \rightarrow M_n$ ومن صدق هذه

القضايا ينتج صدق $M_1 \rightarrow M_n$. في الاستدلالات الرياضية يقوم صدق القضايا

البينية على تعريف، مبرهنة أو بديهية. ومن أجل اكتشاف هذه القضايا البينية

فغالباً، وللسهولة، يتم البدء من القضية الأخيرة. فحتى يتم اكتشاف $M_{n-1} \rightarrow M_n$

فإننا نقوم بالبحث عن قضية M_{n-1} بحيث ينتج منها تالي المبرهنة وحتى يتم

التأكد من صدق M_{n-1} فإنه يتم البحث عن قضية أخرى هي M_{n-2} والتي تنتج

منها M_{n-1} ... إلخ، وإلى أن يتم الوصول إلى القضية M_1 . في مثل هذه الحالات

تتبع الاستدلالات حسب الأسلوب الآتي:

حتى تكون M_n صادقة، يكفي أن تكون M_{n-1} صادقة،
 حتى تكون M_{n-1} صادقة، يكفي أن تكون M_{n-2} صادقة،

 حتى تكون M_2 صادقة، يكفي أن تكون M_1 صادقة.
 M_1 صادقة.

إذن M_n صادقة أيضا.

سنناقش مثلا على برهان يتم فيه استخدام التعميم أعلاه. لندرس برهان
 المبرهنة التالية: (برهن أنه إذا كان $a > b$ فإن $a + c > b + c$).
 حتى تكون $a + c > b + c$ (M_5) صادقة يكفي أن تكون $a + c - (b + c) > 0$ (M_4)
 صادقة.

حتى تكون $a + c - (b + c) > 0$ (M_4) صادقة يكفي أن تكون $a + c - b - c > 0$ (M_3)
 صادقة.

حتى تكون $a + c - b - c > 0$ (M_3) صادقة يكفي أن تكون $a - b > 0$ (M_2)
 صادقة.

حتى تكون $a - b > 0$ (M_2) صادقة يكفي أن تكون $a > b$ (M_1) صادقة.
 $a > b$ (M_1) صادقة.

إذن $a + c > b + c$ (M_5) صادقة أيضا.

في الحقيقة استخدمنا هنا أولا القياس الشرطي:

$$\frac{M_1 \rightarrow M_2, M_2 \rightarrow M_3, M_3 \rightarrow M_4, M_4 \rightarrow M_5}{M_1 \rightarrow M_5}$$

وبعد ذلك استخدمنا قاعدة الوضع: $\frac{M_1 \rightarrow M_5, M_1}{M_5}$

Rule of Conjunction

4. قاعدة العطف

لنأخذ القضايا :

(1) المستقيمان a و b يقعان على نفس المستوي مع المستقيم c (K).

(2) المستقيمان a و b يقعان على نفس المسافة من المستقيم c (L).

(3) المستقيمان a و b يقعان على نفس المستوي مع المستقيم c والمستقيمان

و b يقعان على نفس المسافة من المستقيم c (K ∧ L).

من المعروف أنه من صدق المقدمتين الأولى والثانية ينتج صدق القضية

الثالثة. أي أنه من K و L تنتج K ∧ L، أي أن : $K, L \vdash K \wedge L$.

وللتحقق من ذلك يكفي أن نبرهن أن $(K \wedge L) \rightarrow (K \wedge L)$ صيغة تكرارية

وهذا ما يبينه الجدول أدناه.

K	L	$K \wedge L$	$(K \wedge L) \rightarrow (K \wedge L)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

يتبين من الجدول أنه عندما تكون المقدمتان K و L صادقتين فإن النتيجة

$K \wedge L$ صادقة أيضا. هذا ما يحدث على السطر الأول فقط. ولا يوجد سطر

تكون فيه المقدمتان صادقتين والنتيجة كاذبة. كذلك فإن العمود الأخير يبين أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة يكون صيغة تكرارية.

$$\frac{\alpha, \beta}{\alpha \wedge \beta} .$$

مخطط قاعدة العطف يكون على الشكل التالي:

تنص قاعدة العطف على أنه: من صيغتين α, β نشق $\alpha \wedge \beta$ ، أي أن :

$$\alpha, \beta \vdash \alpha \wedge \beta$$

Rule of Disjunctive Syllogism

5. قاعدة قياس الفصل

لنأخذ الحجة التالية :

اليوم هو الخميس (K) أو اليوم هو الجمعة (L).

اليوم ليس الخميس $\neg K$.

إذن، اليوم هو الجمعة L.

صورة الحجة المذكورة أعلاه هي:

$$K \vee L$$

$$\neg K$$

$$L, \text{ إذن،}$$

من صدق المقدمتين $K \vee L$ و $\neg K$ ينتج صدق النتيجة L، أي أن

$$K \vee L, \neg K \vdash L$$

ومن أجل إثبات ذلك يكفي أن نبرهن أن

$$(K \vee L) \wedge \neg K \rightarrow L$$

صيغة تكرارية وهذا ما يبينه الجدول أدناه.

K	L	$K \vee L$	$\neg K$	L	$((K \vee L) \wedge \neg K) \rightarrow L$
T	T	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	F	T

يتبين من الجدول أنه عندما تكون المقدمتان $K \vee L$ و $\neg K$ صادقتين تكون النتيجة صادقة أيضا وهذا ما يحدث على السطر الثالث فقط ولا يوجد سطر تكون فيه المقدمتان صادقتين والنتيجة كاذبة. كذلك يبين العمود الأخير أن وصل المقدمتين يستلزم النتيجة يكون صيغة تكرارية.

مخطط قاعدة قياس الفصل يكون على الشكل التالي $\frac{\alpha \vee \beta, \neg \alpha}{\beta}$ (حيث

α, β أية صيغتان). تنص قاعدة الفصل على أنه: من $\alpha \vee \beta$ و $\neg \alpha$ نشق β ، أو أن $\alpha \vee \beta, \neg \alpha \vdash \beta$.

Rule of Simplification

6. قاعدة التبسيط

من $\alpha \wedge \beta$ نشق α (β)، أي أن $\alpha \wedge \beta \vdash \alpha$ وكذلك $\alpha \wedge \beta \vdash \beta$.

Rule of Addition

7. قاعدة الجمع

من α نشق $\alpha \vee \beta$ (أي أنه من α نشق $\alpha \vee \beta$ أو أية صيغة أخرى β).

أي أن $\alpha \vdash \alpha \vee \beta$.

قواعد الاشتقاق الباقية أدناه تكون الصيغة التكرارية التي تمثل كلا منها

عبارة عن استلزاما ثنائيا. وبما أنه من تكرارية $\alpha_2 \leftrightarrow \alpha_1$ ينتج $\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2$ وهذا

يعني $\alpha_2 \Rightarrow \alpha_1$ و $\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2$ ، أي أنه من α_1 تنتج (تشتق) α_2 ومن α_2 تنتج α_1 .
قواعد الاشتقاق الباقية أدناه تسمى أيضا قواعد استيعاضية.

8. قاعدة دي مورغان Rule of De Morgan

(1) من $(\alpha \wedge \beta)$ نستق $(\neg \alpha \vee \neg \beta)$ ومن $(\neg \alpha \vee \neg \beta)$ نستق $(\alpha \wedge \beta)$.

(2) من $(\alpha \vee \beta)$ نستق $(\neg \alpha \wedge \neg \beta)$ ومن $(\neg \alpha \wedge \neg \beta)$ نستق $(\alpha \vee \beta)$.

9. قاعدة النفي المضاعف Rule of Double Negation

من $\neg \neg \alpha$ نستق α ومن α نستق $\neg \neg \alpha$.

10. قاعدة الاستلزام Rule of Implication

من $\alpha \rightarrow \beta$ نستق $\neg \alpha \vee \beta$ ومن $\neg \alpha \vee \beta$ نستق $\alpha \rightarrow \beta$.

11. قاعدة عكس النقيض Rule of Contraposition

من $\alpha \rightarrow \beta$ نستق $\neg \beta \rightarrow \neg \alpha$ ومن $\neg \beta \rightarrow \neg \alpha$ نستق $\alpha \rightarrow \beta$.

12. قاعدة الاستلزام الثنائي Rule of Biconditional

من $\alpha \leftrightarrow \beta$ نستق $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ و من $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ نستق $\alpha \leftrightarrow \beta$.

13. قاعدة الاستيراد-التصدير Rule of Exportation-Importation

من $(\alpha_1 \rightarrow (\alpha_2 \rightarrow \alpha_3))$ نستق $(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \alpha_3$ ومن $(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \alpha_3$ نستق $(\alpha_1 \rightarrow (\alpha_2 \rightarrow \alpha_3))$.

Commutative Rule

14. قاعدة التبديل

(1) من $\alpha \wedge \beta$ نستق $\beta \wedge \alpha$ ومن $\beta \wedge \alpha$ نستق $\alpha \wedge \beta$.

(2) من $\alpha \vee \beta$ نستق $\beta \vee \alpha$ ومن $\beta \vee \alpha$ نستق $\alpha \vee \beta$.

Associative Rule

15. قاعدة التجميع

(1) من $\alpha_1 \vee (\alpha_2 \vee \alpha_3)$ نستق $(\alpha_1 \vee \alpha_2) \vee \alpha_3$ ومن $(\alpha_1 \vee \alpha_2) \vee \alpha_3$ نستق $\alpha_1 \vee (\alpha_2 \vee \alpha_3)$.

(2) من $\alpha_1 \wedge (\alpha_2 \wedge \alpha_3)$ نستق $(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \wedge \alpha_3$ ومن $(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \wedge \alpha_3$ نستق $\alpha_1 \wedge (\alpha_2 \wedge \alpha_3)$.

Distributive Rule

16. قاعدة التوزيع

(1) من $\alpha_1 \vee (\alpha_2 \wedge \alpha_3)$ نستق $(\alpha_1 \vee \alpha_2) \wedge (\alpha_1 \vee \alpha_3)$ ومن $(\alpha_1 \vee \alpha_2) \wedge (\alpha_1 \vee \alpha_3)$ نستق $\alpha_1 \vee (\alpha_2 \wedge \alpha_3)$.

(2) من $\alpha_1 \wedge (\alpha_2 \vee \alpha_3)$ نستق $(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \vee (\alpha_1 \wedge \alpha_3)$ ومن $(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \vee (\alpha_1 \wedge \alpha_3)$ نستق $\alpha_1 \wedge (\alpha_2 \vee \alpha_3)$.

Rule of Tautology

17. قاعدة تحصيل الحاصل

(1) من $\alpha \wedge \alpha$ نستق α ومن α نستق $\alpha \wedge \alpha$.

(2) من $\alpha \vee \alpha$ نستق α ومن α نستق $\alpha \vee \alpha$.

تعريف

المجموعة الكافية للروابط هي المجموعة التي يمكن تمثيل أية دالة صدق بواسطة صيغة تحوي على روابط من هذه المجموعة.

نحن نهدف هنا إلى البرهنة على أن مجموعات أزواج الروابط $\{ \neg, \vee, \wedge \}$ ، $\{ \neg, \rightarrow \}$ هي مجموعات كافية للروابط. وسنقوم بالبرهنة على ذلك على مرحلتين :

(1) البرهان على أن المجموعة $\{ \neg, \vee, \wedge \}$ هي مجموعة كافية للروابط.

(2) البرهان على أنه إذا كانت المجموعة $\{ \neg, \vee, \wedge \}$ هي مجموعة كافية للروابط فإن مجموعات أزواج الروابط أعلاه هي مجموعات كافية للروابط.

مبرهنة 1

المجموعة $\{ \neg, \vee, \wedge \}$ هي مجموعة كافية للروابط.

يمكن البرهان في إنشاء صيغة تحوي الروابط \neg, \vee, \wedge لكل جدول صدق ونحن نعرف أن كل جدول صدق يعرف دالة صدق.

البرهان

لنكن عندنا دالة صدق ذات n متغير قضائي. سوف ننشئ صيغة α

تحوي المتغيرات القضائية K_1, K_2, \dots, K_n .

(1) إذا أخذت دالة الصدق القيمة F لكل تركيبة من قيم صدق المتغيرات القضائية، فإن هذه الدالة تكون أية صيغة متناقضة وهكذا فالصيغة التالية يمكن أن تمثل α :

$$(K_1 \wedge \neg K_1) \wedge (K_2 \wedge K_3 \wedge \dots \wedge K_n)$$

(2) إذا أخذت دالة الصدق القيمة T لتركيبية واحدة على الأقل من المتغيرات القضائية، فإن طريقتنا تقوم على بناء صيغة صادقة من أجل تلك التركيبية وكاذبة من أجل التركيبات الأخرى. فمثلا، إذا كانت $n = 3$ ، فإن الصيغة $\neg K_1 \wedge K_2 \wedge K_3$ تكون صادقة فقط من أجل التركيبية $F T T$ من قيم صدق المتغيرات K_1, K_2, K_3 على الترتيب و $K_1 \wedge K_2 \wedge \neg K_3$ تكون صادقة فقط من أجل التركيبية $T T F$. هذه الصيغ الخاصة ندعوها الوصلات الأساسية¹، فإذا أعطينا تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية K_1, K_2, \dots, K_n ، فإننا نكتب K_i في الوصل إذا كانت قيمة K_i هي T ونكتب $\neg K_i$ إذا كانت قيمة K_i هي F ($1 \leq i \leq n$). وإذن، فمن أجل تعيين لقيم الصدق فإن كل معطوفة ستأخذ القيمة T وبالتالي سيأخذ الوصل بأكمله القيمة T .

الآن ومن أجل برهان مبرهنتنا، لنأخذ جميع التركيبات إلى n من قيم الصدق التي من أجلها تأخذ دالة صدقنا القيمة T . خذ α فصلا لجميع الوصلات الأساسية المحصول عليها بواسطة أخذ هذه التركيبات كقيم صدق للمتغيرات K_1, K_2, \dots, K_n . ولرؤية هذا، عين قيم صدق إلى K_1, K_2, \dots, K_n . إذا أخذت دالة صدقنا لهذه التركيبية من قيم الصدق القيم T ، فإن الوصل

¹ Basic conjuncions

الأساسي المقابل لهذه التركيبة يكون ضمن α ويأخذ القيمة T لهذا التعيين. وهكذا فإن α تأخذ القيمة T أيضا. أما إذا أخذت دالة صدقنا القيمة F، فإن الوصل الأساسي المقابل لهذه التركيبة لا يكون ضمن α لأن كل الوصلات الأساسية الأخرى المتضمنة في α تأخذ القيمة F أيضا لهذا التركيب وبالتالي، فإن α تأخذ القيمة F. وإذن، فمن أجل كل تعيين لقيم الصدق، فإن قيمة صدق α تكون كما هي معطاة بواسطة دالة الصدق.

سنعطي أدناه مثلا توضيحيا وذلك بأخذ دالة صدق ذات ثلاثة متغيرات

معرفة بواسطة جدول الصدق التالي :

T	T	T	F
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	T
F	F	F	F

إن تركيبات قيم الصدق التي من أجلها تأخذ دالة الصدق القيمة T هي

FFT, FTF, FTT, TFF

وبالتالي فإن الوصلات الأساسية لهذه التركيبات هي :

$$K_1 \wedge K_2 \wedge K_3$$

$$\neg K_1 \wedge K_2 \wedge K_3$$

$$\neg K_1 \wedge K_2 \wedge \neg K_3$$

$$\neg K_1 \wedge \neg K_2 \wedge K_3$$

الصيغة α التي أنشأناها في البرهان هي :

$$(K_1 \wedge \neg K_2 \wedge \neg K_3) \vee (\neg K_1 \wedge K_2 \wedge K_3) \vee (\neg K_1 \wedge K_2 \wedge \neg K_3) \vee$$

$$(\neg K_1 \wedge \neg K_2 \wedge K_3)$$

هذه الصيغة، التي تحوي الروابط \neg , \wedge , \vee ، تقابل دالة الصدق المعرفة بواسطة جدول الصدق المعطى في المثال وجدول الصدق هذا هو جدول صدق هذه الصيغة.

إن شكل الصيغة α هذا يسمى الشكل العادي للفصل¹، حيث أن α عبارة عن صيغة فصل وكل مفصولة فيها هي صيغة وصل لمعطوفات تمثل كل واحدة منها متغير قضائي أو نفي متغير قضائي.

باستخدام المبرهنة 1 أعلاه سنجد مجموعات أخرى للروابط.

مبرهنة 2

المجموعات: 1. $\{\neg, \wedge\}$ ، 2. $\{\neg, \vee\}$ ، 3. $\{\neg, \rightarrow\}$ هي مجموعات كافية للروابط.

البرهان

1. من أجل أية صيغتين α ، β :

$$\alpha \vee \beta \Leftrightarrow \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$$

حسب قاعدة دي مورغان وبالتالي فإن أية صيغة تحوي الروابط

\neg, \vee, \wedge فقط يمكن تحويلها إلى صيغة تحوي الرابطين \neg, \wedge فقط.

¹ - Disjunctive normal form

2. وبالمثل نستطيع استخدام المتكافئة

$$\alpha \wedge \beta \Leftrightarrow \neg(\neg\alpha \vee \neg\beta)$$

لنجد أن $\{\neg, \vee\}$ مجموعة كافية للروابط.

3. يجب أن نجد صيغتين مكافئتين إلى $\alpha \wedge \beta$ و $\alpha \vee \beta$ وتحويان الرابطين \neg و \rightarrow فقط.

عندنا :

$$\alpha \wedge \beta \Leftrightarrow \neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$$

$$\alpha \vee \beta \Leftrightarrow \neg\alpha \rightarrow \beta$$

يمكن استخدام هاتين المتكافئتين لتحويل أية صيغة تحوي الروابط

\neg, \vee, \wedge فقط إلى صيغة تحوي الرابطين \rightarrow, \neg فقط.

توجد مجموعات أخرى كافية للروابط والمبرهنتان التاليتان تبرهنان ذلك.

مبرهنة 3

المجموعة $\{\downarrow\}$ هي مجموعة كافية للروابط.

البرهان

استخدم مبرهنة 2 - الجزء 1 والمتكافئتين :

$$\neg\alpha \Leftrightarrow \alpha \downarrow \alpha$$

و

$$\alpha \wedge \beta \Leftrightarrow (\alpha \downarrow \alpha) \downarrow (\beta \downarrow \beta)$$

سنبرهن هاتين المتكافئتين أدناه.

لتكن $\alpha : K$ و $\beta : L$ ، لننشئ جدولتي الصدق :

K	$\neg K$	$K \downarrow K$	$\neg K \leftrightarrow (K \downarrow K)$
T	F	F	T
F	T	T	T

K	L	$K \wedge L$	$K \downarrow K$	$L \downarrow L$	$(K \downarrow K) \downarrow (L \downarrow L)$	$(K \wedge L) \leftrightarrow ((K \downarrow K) \downarrow (L \downarrow L))$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	T	F	T
F	T	F	T	F	F	T
F	F	F	T	T	F	T

نلاحظ من الجدول الأول أعلاه أن $\neg K \leftrightarrow (K \downarrow K)$ صيغة تكرارية وبالتالي

$\neg K \leftrightarrow (K \downarrow K)$. ومن الجدول الثاني نلاحظ أن:

$(K \wedge L) \leftrightarrow ((K \downarrow K) \downarrow (L \downarrow L))$ صيغة تكرارية وبالتالي:

$(K \wedge L) \leftrightarrow ((K \downarrow K) \downarrow (L \downarrow L))$.

مبرهنة 4

المجموعة $\{ \neg, \downarrow \}$ هي مجموعة كافية للروابط.

البرهان

استخدم المبرهنة 2 - الجزء 2 والمتكافئتين

$$\neg \alpha \leftrightarrow \alpha \downarrow \alpha$$

$$\alpha \vee \beta \Leftrightarrow (\alpha | \alpha) | (\beta | \beta)$$

سنبرهن هاتين المتكافئتين أدناه.

لتكن $\alpha : K$ و $\beta : L$ ، لننشئ جدولي الصدق :

K	$\neg K$	$K K$	$\neg K \leftrightarrow (K K)$
T	F	F	T
F	T	T	T

K	L	$K \vee L$	$K K$	$L L$	$(K K)$ $ (L L)$	$(K \vee L) \leftrightarrow ((K K)$ $ (L L))$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	T	F	T	T	T
F	T	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	F	T

نلاحظ من الجدول الأول أعلاه أن $\neg K \leftrightarrow (K | K)$ صيغة تكرارية وبالتالي
 $\neg K \leftrightarrow (K | K)$. ومن الجدول الثاني نلاحظ أن $(K \vee L) \leftrightarrow ((K | K) | (L | L))$
 صيغة تكرارية وبالتالي $(K \vee L) \leftrightarrow ((K | K) | (L | L))$.

لا توجد مجموعة كافية يمكن اختيارها من بين الروابط الخمسة

$\neg, \vee, \wedge, \leftrightarrow, \rightarrow$ ما عدا ما ورد في المبرهنة 2.

مبرهنة 5

أزواج المجموعات $\{V, \wedge\}$ ، $\{\leftrightarrow, V\}$ ، $\{\leftrightarrow, \wedge\}$ هي مجموعات غير كافية للروابط.
البرهان

نلاحظ أن أيا من أزواج المجموعات المعطاة لا تحوي على رابط النفي \neg . وهكذا فإن أية دالة صدق تأخذ دائما القيمة F لا يمكن التعبير عنها بواسطة صيغة باستخدام أي زوج، لأنه بإعطاء جميع المتغيرات القضائية في هذه الصيغة القيمة T ، فإن الصيغة كلها بالضرورة تأخذ القيمة T . ولا توجد طريقة لجعل جزء من الصيغة أو كلها تأخذ القيمة F بواسطة هذا التعيين. وإذن لا توجد صيغة تحوي فقط روابط من $\rightarrow, \leftrightarrow, \wedge, V$ وتكون صيغة متناقضة. وإذن لا توجد مجموعة جزئية من مجموعة هذه الروابط تكون مجموعة كافية.

Formal Proofs

2.7 البراهين الصورية

عندما يكون عدد المتغيرات القضائية في صورة الحجة كبيرا، فإن طريقة الجدول لبرهان صحة صورة الحجة تكون غير مناسبة، فنحن نعلم أنه إذا كان هذا العدد يساوي n فإن عدد الأسطر في الجدول تكون 2^n . إن هذا السبب يدعونا لإيجاد طريقة أخرى أكثر عملية وسهولة واختصار لبرهان صحة صورة حجة ما. إن هذه الطريقة تسمى البرهان الصوري. هذا البرهان يسمح لنا باشتقاق نتيجة صورة الحجة من مقدماتها في حساب القضايا وذلك باستخدام قواعد الاشتقاق التي مرت بنا.

مثال: لناخذ الحجة التالية.

هشام ليس في مكتبه أو ليس في داره. لكنه إذا لم يكن في مكتبه فإنه يكون قد ذهب لزيارة أهله. وإذا لم يكن في داره فإنه يكون قد ذهب لزيارة طبيبه. إذن، ذهب هشام لزيارة أهله أو ذهب لزيارة طبيبه.

القضايا الذرية

K: هشام في مكتبه. L: هشام في داره. M: هشام ذهب لزيارة أهله.

N: هشام ذهب لزيارة طبيبه.

الترجمة

المقدمات $\neg K \vee \neg L, \neg K \rightarrow M, \neg L \rightarrow N$

النتيجة $M \vee N$

بما أن عدد التغيرات التضائية أربعة فإن عدد أسطر الجدول الذي يمكن أن نستخدمه إبرهان صحة هذه الحجة يكون $2^4 = 16$. لكننا باستخدام قواعد الاثنثاق التي مررت بنا نستطيع اثتقاق النتيجة $M \vee N$ من المقدمات المذكورة وذلك باثنثاق متتالية من الصيغ تكون آخر صيغة مشتقة فيها هي النتيجة $M \vee N$.

(1) أول صيغة مشتقة هي $\neg L \rightarrow \neg K$ وتنتج من المقدمة $\neg K \vee \neg L$ باستخدام قاعدة الاستلزام.

(2) الصيغة المشتقة $N \rightarrow \neg K$ تنتج من المقدمة $\neg L \rightarrow N$ ومن الصيغة المشتقة في (1) باستخدام قاعدة القياس الشرطي.

(3) الصيغة $\neg M \rightarrow K$ تنتج من المقدمة $\neg K \rightarrow M$ باستخدام قاعدة عكس النقيض والنفي المضاعف.

(4) $\neg M \rightarrow N$ تنتج من الصيغة المشتقة في (2) $K \rightarrow N$ والصيغة المشتقة في (3) $\neg M \rightarrow K$ باستخدام القياس الشرطي.

(5) آخر صيغة مشتقة وهي النتيجة $M \vee N$ تنتج من $\neg M \rightarrow N$ باستخدام قاعدة الاستلزام والنفي المضاعف.

يمكن إنشاء البرهان أعلاه بشكل أكثر صورية وذلك بكتابة المقدمات الثلاثة والصيغ المشتقة الخمسة كما مبين أدناه.

أرقام الخطوط	البرهان	السبب
1.	$\neg K \vee \neg L$	م
2.	$\neg K \rightarrow M$	م
3.	$\neg L \rightarrow N$	م
4.	$K \rightarrow \neg L$	الاستلزام, 1
5.	$K \rightarrow N$	القياس الشرطي 3,4
6.	$\neg M \rightarrow K$	عكس النقيض, 2
7.	$\neg M \rightarrow N$	القياس الشرطي 5,6
8.	$M \vee N$	الاستلزام, 7

البرهان الصوري كما ورد في المثال أعلاه هو المتتالية المنتهية من الصيغ على الخطوط من 1 إلى 8 أي المتتالية $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_8$ ، حيث β_1 هي المقدمة $\neg K \vee \neg L$ ، β_2 هي المقدمة $\neg K \rightarrow M$ ، β_3 هي المقدمة $\neg L \rightarrow N$ ، β_4

هي الصيغة المشتقة $L \rightarrow K$ ، β_5 هي الصيغة المشتقة $N \rightarrow K$ ، β_6 هي الصيغة المشتقة $M \rightarrow K$ ، β_7 هي الصيغة المشتقة $M \rightarrow N$ ، β_8 هي الصيغة المشتقة الأخيرة (النتيجة) $M \vee N$. نلاحظ بأن الصيغ (حدود) المتتالية إما أن تكون مقدمات وهي صيغ على الخطوط 1، 2، 3 أو صيغ مشتقة على الخطوط من 4 إلى 8، أما الحد الأخير من المتتالية β_8 ($n = 8$) فهو النتيجة $M \vee N$.

بتفصيل أكثر: الخط 4 (نقصد الصيغة على الخط 4) اشتق من الخط 1 وذلك لأن $\beta_4 \rightarrow \beta_1$ صيغة تكرارية واستخدمت قاعدة الاستلزام. الخط 5 اشتق من الخطين 3 و4 وذلك لأن $\beta_5 \rightarrow (\beta_3 \wedge \beta_4)$ صيغة تكرارية واستخدمت قاعدة القياس الشرطي. الخط 6 اشتق من الخط 2 وذلك لأن $\beta_6 \rightarrow \beta_2$ صيغة تكرارية واستخدمت قاعدة عكس النقيض. الخط 7 اشتق من الخطين 5 و6 وذلك لأن $\beta_7 \rightarrow (\beta_5 \wedge \beta_6)$ صيغة تكرارية واستخدمت قاعدة القياس الشرطي. الخط 8 اشتق من الخط 7 وذلك لأن $\beta_8 \rightarrow \beta_7$ صيغة تكرارية واستخدمت قاعدة الاستلزام.

في الحقيقة بالإضافة إلى المتتالية المنتهية من الصيغ $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_8$ والتي تمثل البرهان الصوري، فإننا من أجل اشتقاق حدود هذه المتتالية استخدمنا متتالية منتهية من قواعد الاشتقاق $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7$ ، حيث D_1 هي قاعدة الاستلزام، D_2 هي القياس الشرطي، D_3 هي عكس النقيض، D_4 هي النفي المضاعف، D_5 هي القياس الشرطي، D_6 هي قاعدة الاستلزام، D_7 هي النفي المضاعف.

في إنشاء البرهان أعلاه تم ذكر المقدمات على الخطوط الثلاثة الأولى من البرهان وأضفنا الرمز (م) ليشير إلى كل منها. ثم قمنا باشتقاق النتيجة $M \vee N$. الأعداد على اليمين تبين الخطوط التي اشتقت منها كل صيغة مشتقة وعلى يمين هذه الأعداد ذكرنا اسم القاعدة التي استخدمت في كل اشتقاق. سنعطي الآن تعريف البرهان الصوري.

البرهان الصوري لصورة الحجة التي مقدماتها $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ونتيجتها β هي متتالية منتهية من الصيغ $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ بحيث أن كل β_i ($i = 1, 2, \dots, n$) هي مقدمة أو صيغة مشتقة من الصيغ التي تسبقها في المتتالية باستخدام قاعدة اشتقاق صحيحة. آخر صيغة مشتقة β_n من المتتالية هي النتيجة β . تسمى عادة حدود المتتالية $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ بخطوات البرهان.

2. 8 أنواع البراهين الصورية

Direct Proof

2. 8. 1 البرهان المباشر

يقوم البرهان المباشر على اشتقاق النتيجة المطلوبة لصورة حجة وذلك باشتقاق متتالية من الصيغ واحدة بعد الأخرى من المقدمات المعطاة باستخدام قواعد الاشتقاق المعروفة وحيث تكون آخر صورة مشتقة هي نتيجة صورة الحجة. المثال في الفقرة السابقة يمكن اعتباره مثالاً لهذا النوع من البراهين.

Conditional Proof

2. 8. 2 البرهان الشرطي (ب.ش)

يستخدم البرهان الشرطي من أجل تبسيط البرهان التي تكون نتيجة صورة الحجة المطلوبة فيه عبارة عن استلزام. البرهان الشرطي لصحة صورة الحجة هذه يقوم على إضافة مقدم الاستلزام إلى المقدمات الأصلية ثم

نشق متتالية من الصيغ من المقدمات الأصلية ومن المقدمة المضافة (سنسميها مقدمة البرهان الشرطي (ب.ش)) حتى نصل إلى اشتقاق تالي الاستلزام، وبهذا نكون قد برهننا الاستلزام المطلوب (النتيجة) من المقدمات الأصلية لصورة الحجة فقط. أي أن البرهان الشرطي ينص على ما يلي:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1 \vdash \beta_2 \text{ إذا كان } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta_1 \rightarrow \beta_2$$

إن البرهان الشرطي هو أيضا قاعدة اشتقاق صحيحة ويمكن إضافتها إلى قائمة القواعد المعروفة ولكننا أفردنا فقرة له بسبب خصوصيته. إثبات صحة البرهان الشرطي يكون بواسطة المبرهنة أدناه.

مبرهنة

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta_1 \rightarrow \beta_2 \text{ فإن } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1 \vdash \beta_2$$

البرهان

$$\text{بما أن } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1 \vdash \beta_2$$

$$(1) \quad (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n \wedge \beta_1) \rightarrow \beta_2$$

صيغة تكرارية. حتى نبرهن $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta_1 \rightarrow \beta_2$ فيكفي أن نبرهن أن

$$(2) \quad (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow (\beta_1 \rightarrow \beta_2)$$

صيغة تكرارية. ولكن (2) \leftrightarrow (1) حسب قاعدة الاستيراد-التصدير. إذن (2) يكون أيضا صيغة تكرارية وبهذا يتم البرهان.

مثال

سنعطي برهانا صوريا لصورة الحجة الصحيحة التالية

$$M \rightarrow N, K \rightarrow \neg L, K \rightarrow (L \vee M) \text{ المقدمات}$$

$$K \rightarrow N$$

النتيجة

سنستخدم البرهان الشرطي لاستنتاج $K \rightarrow N$ وذلك بإضافة K (مقدم الاستلزام) إلى المقدمات الأصلية واشتقاق N (تالي الاستلزام). سنقوم بإضافة عمود آخر (أرقام المقدمات) إلى البرهان الصوري. يتشكل هذا العمود وذلك بإعطاء كل مقدمة رقماً هو رقم أول ظهور لها في البرهان. سنبين أن المقدمات تظهر على كل سطر من البرهان.

السبب	البرهان	أرقام الخطوط	أرقام المقدمات
م	$M \rightarrow N$	1.	{1}
م	$K \rightarrow \neg L$	2.	{2}
م	$K \rightarrow (L \vee M)$	3.	{3}
(مقدمة ب.ش) م	K	4.	{4}
الوضع 3,4	$L \vee M$	5.	{3,4}
عكس النقيض 2,	$L \rightarrow \neg K$	6.	{2}
النفي المضاعف 4,	$\neg \neg K$	7.	{4}
نفي التالي 6,7	$\neg L$	8.	{2,4}
قياس الفصل 5,8	M	9.	{2,3,4}
الوضع 1,9	N	10.	{1,2,3,4}
ب.ش 4,10	$K \rightarrow N$	11.	{1,2,3}

نرى أن الصيغة المشتقة على الخط 5 (β_5) تم اشتقاقها من β_3 و β_4 وذلك لأن $\beta_5 \rightarrow (\beta_3 \wedge \beta_4)$ صيغة تكرارية. فإذاً مجموعة أرقام مقدمات β_5

تساوي اتحاد مجموعة أرقام مقدمات β_3 مع مجموعة أرقام مقدمات β_5 . أي أن مجموعة أرقام مقدمات β_5 هي $\{3,4\} \cup \{4\} = \{3,4\}$. مجموعة أرقام مقدمات الصيغة على الخط 6 (β_6) المشتقة من β_2 هي المجموعة $\{2\}$ ، نفس الشيء بالنسبة إلى β_7 . مجموعة أرقام مقدمات الصيغة المشتقة على الخط 8 (β_8) هي $\{2\} \cup \{4\} = \{2,4\}$ وذلك لأن $\beta_8 \rightarrow (\beta_6 \wedge \beta_7)$ صيغة تكرارية، أي أن β_8 اشتقت من β_6 و β_7 . مجموع أرقام مقدمات الصيغة على الخط 9 (β_9) تساوي $\{3,4\} \cup \{2,3,4\} = \{2,3,4\}$ وذلك لأن β_9 اشتقت من β_5 و β_8 ، أي أن $\beta_9 \rightarrow (\beta_5 \wedge \beta_8)$. مجموعة أرقام مقدمات الصيغة على الخط 10 (β_{10}) تساوي المجموعة $\{1\} \cup \{2,3,4\} = \{1,2,3,4\}$ وذلك لأن $\beta_{10} \rightarrow (\beta_1 \wedge \beta_9)$ صيغة تكرارية، أي أن β_{10} اشتقت من β_1 و β_9 . استخدمنا قاعدة البرهان الشرطي على الخط 11. مقدمة (ب.ش)، (K) تقع على الخط 4. لقد تم اشتقاق N على الخط 10. مجموعة أرقام المقدمات على الخط 10 هي $\{1,2,3,4\}$ وهكذا فإن الصيغة على الخط 11 تكون $K \rightarrow N$ (β_{11}) ومجموعة أرقام مقدماتها تكون $\{1,2,3,4\} - \{4\} = \{1,2,3\}$.

Indirect Proof

2. 8. 3 البرهان الغير مباشر (ب.غ)

طريقة البرهان الغير مباشر معروفة لكل من درس الهندسة الإقليدية، وتمثل إضافة جديدة لتقوية إمكانياتنا على البرهنة. البرهان الغير مباشر لصحة صورة الحجة يقوم على إضافة نفي النتيجة كمقدمة البرهان الغير مباشر (ب.غ) إلى المقدمات الأصلية لصورة الحجة ثم نشق من المقدمات الأصلية هذه والمقدمة المضافة نشق صيغة متناقضة، أي صيغة ونفيها وينتج نفي

المقدمة المضافة أي تنتج نتيجة صورة الحجة المعطاة¹. أي أن البرهان الغير مباشر ينص على ما يأتي: إذا كان

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta \quad \text{فإن} \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta \vdash \beta_1 \wedge \neg \beta_1$$

يتوضح مما سبق أن البرهان الغير مباشر هو أيضا قاعدة اشتقاق صحيحة ويمكن إضافته إلى القواعد المعروفة ولكننا أفردنا فقرة له بسبب خصوصيته. إثبات صحة البرهان الغير مباشر يكون بواسطة المبرهنة أدناه. مبرهنة

لتكن $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ مقدمات صورة الحجة و β نتیجتها. لتكن β_1 أية صيغة.

$$\text{إذا كان} \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta \vdash \beta_1 \wedge \neg \beta_1 \quad \text{فإن} \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta$$

البرهان

بما أن $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta \vdash \beta_1 \wedge \neg \beta_1$ إذن الاستلزام

$$(1) \quad (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n \wedge \neg \beta) \rightarrow \beta_1 \wedge \neg \beta_1$$

صيغة تكرارية. وبما أن التالي (1) $(\beta_1 \wedge \neg \beta_1)$ صيغة متناقضة فإن إحدى معطوفات المقدم يجب أن تكون كاذبة، أي أن إحدى المعطوفات $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta$ يجب أن تكون كاذبة. عندنا حالتين:

(1) إذا كانت إحدى المعطوفات $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ كاذبة فإن يكون

$$(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow \beta$$

صيغة تكرارية، وبالتالي يكون $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta$

¹ للمزيد من التفصيل راجع

د.أسعد الجنابي - البرهان غير البنياني، مركز البحوث، عدن، 1976.

(2) إذا كانت $\neg \beta$ كاذبة فإن β صادقة فتكون $(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow \beta$ صيغة تكرارية. وبالتالي يكون $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta$ وبهذا يتم البرهان.

مثال

سنعطي برهانا صوريا لصورة الحجة الصحيحة التالية:

$$(M \vee N) \rightarrow \neg L, (M \vee S) \wedge (S \rightarrow N)$$

$$\neg L$$

البرهان الصوري

سنستخدم البرهان الغير مباشر لاشتقاق $\neg L$ وذلك بإضافة نفيها $\neg L$ أو L إلى المقدمات الأصلية واشتقاق صيغة متناقضة، $\beta_1 \wedge \neg \beta_1$ (حيث β_1 أية صيغة).

أرقام المقدمات	أرقام الخطوات	البرهان	السبب
{1}	1.	$(M \vee N) \rightarrow \neg L$	م
{2}	2.	$(M \vee S) \wedge (S \rightarrow N)$	م
{3}	3.	L	مقدمة ب.غ) م
{1}	4.	$L \rightarrow \neg(M \vee N)$	عكس النقيض, 1
{1, 3}	5.	$\neg(M \vee N)$	الوضع 3,4
{1, 3}	6.	$\neg M \wedge \neg N$	دي مورغان, 5
{2}	7.	$S \rightarrow N$	إنتبسيط, 2
{2}	8.	$\neg N \rightarrow \neg S$	عكس النقيض, 7

{1,2,3}	9.	$\lceil S$	الوضع 6,8
{2}	10.	MVS	التبسيط, 2,
{2}	11.	$\lceil M \rightarrow S$	الاستلزام, 10,
{1,2,3}	12.	S	الوضع 6,11
{1,2,3}	13.	$S \wedge \lceil S$	العطف 9, 12
{1,2}	14.	$\lceil L$	ب.غ 3,13

سنبين مرة أخرى كيف أن المقدمات تظهر على كل سطر من البرهان. سنسمي أولاً متتالية الصيغ التي تمثل البرهان الصوري في المثال أعلاه كما يلي $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_9, \beta_{10}, \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}$ (النتيجة). مجموعتا أرقام المقدمات الأصلية هما $\{1\}$ و $\{2\}$ ، أما مجموعة أرقام المقدمة المضافة (مقدمة ب.غ) فهي $\{3\}$. (نشير إلى رقم المقدمة المضافة يكون دائماً هو رقم الخط الذي تظهر عليه لأول مرة). الصيغة المشتقة β_4 تم اشتقاقها من β_1 وذلك لأن $\beta_1 \rightarrow \beta_4$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة مقدمات β_4 تكون هي نفسها مجموعة أرقام مقدمات β_1 ، أي $\{1\}$. الصيغة المشتقة β_5 تم اشتقاقها من β_3 و β_4 ، ذلك لأن $\beta_3 \wedge \beta_4 \rightarrow \beta_5$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة مقدمات β_5 تكون تساوي $\{1\} \cup \{3\} = \{1,3\}$. الصيغة المشتقة β_6 تم اشتقاقها من β_5 وذلك لأن $\beta_5 \rightarrow \beta_6$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_6 تكون هي نفسها مجموعة أرقام مقدمات β_5 ، أي $\{1,3\}$. الصيغة المشتقة β_7 تم اشتقاقها من β_2 وذلك لأن $\beta_2 \rightarrow \beta_7$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_7 تكون هي نفسها مجموعة أرقام

مقدمات β_2 ، أي $\{2\}$. الصيغة المشتقة β_8 تم اشتقاقها من β_7 وذلك لأن $\beta_8 \rightarrow \beta_7$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_8 تكون هي نفسها مجموعة أرقام مقدمات β_7 ، أي $\{2\}$. الصيغة المشتقة β_9 تم اشتقاقها من الصيغتين β_6 و β_8 وذلك لأن $\beta_9 \rightarrow (\beta_6 \wedge \beta_8)$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_9 تكون $\beta_9 = \{2\} \cup \{1,3\}$. الصيغة المشتقة β_{10} تم اشتقاقها من β_2 وذلك لأن $\beta_{10} \rightarrow \beta_2$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_{10} تكون هي نفسها مجموعة أرقام مقدمات β_2 ، أي $\{2\}$. الصيغة المشتقة β_{11} تم اشتقاقها من β_{10} وذلك لأن $\beta_{11} \rightarrow \beta_{10}$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_{11} تكون هي نفسها مجموعة أرقام مقدمات β_2 ، أي $\{2\}$. الصيغة المشتقة β_{12} تم اشتقاقها من الصيغتين β_6 و β_{11} وذلك لأن

$\beta_{12} \rightarrow (\beta_6 \wedge \beta_{11})$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_{12} تكون $\beta_{12} = \{2\} \cup \{1,3\}$. الصيغة المشتقة β_{13} تم اشتقاقها من الصيغتين β_9 و β_{12} وذلك لأن $\beta_{13} \rightarrow (\beta_9 \wedge \beta_{12})$ صيغة تكرارية وإذن مجموعة أرقام مقدمات β_{13} تكون $\beta_{13} = \{1,2,3\} \cup \{1,2,3\}$. على الخط 14 استخدمنا قاعدة البرهان الغير مباشر ومقدمة (ب.غ) L تقع على الخط 3. لقد تم اشتقاق الصيغة المتناقضة $S \wedge \neg S$ على الخط 13 ومجموعة أرقام المقدمات على هذا الخط هي $\{1,2,3\}$ وهكذا فإن الصيغة على الخط 14 تكون $L \wedge (\beta_{14})$ ومجموعة أرقام مقدماتها $\{3\} - \{1,2,3\} = \{1,2\}$.

يظهر البرهان غير المباشر عموما على شكل ثلاث حالات كما هو مبين

أدناه.

الحالة الأولى:

لبرهان أية مبرهنة مطلوبة $K \rightarrow L$ حيث K شرطها و L نتیجتها، نقوم عوضاً عن ذلك ببرهان صدق القضية $\neg K \rightarrow (\neg L \wedge K)$. أي نقوم بافتراض نفي L ($\neg L$) وبعد ذلك وباستخدام $\neg L$ و K يتم برهان K . وبما أن $K \rightarrow L$ تكافئ $\neg K \rightarrow (\neg L \wedge K)$ فإننا نكون قد برهنا $K \rightarrow L$ المطلوبة. جدول الصدق أدناه يبرهن التكافؤ المذكور وذلك ببرهان أن:

$$\alpha \equiv (K \rightarrow L) \leftrightarrow ((\neg L \wedge K) \rightarrow \neg K)$$

K	L	$\neg L \wedge K$	$K \rightarrow L$	$(\neg L \wedge K) \rightarrow \neg K$	α
T	T	F	T	T	T
T	F	T	F	F	T
F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T

الحالة الثانية:

لبرهان أية مبرهنة مطلوبة $K \rightarrow L$ حيث K شرطها و L نتیجتها، نقوم عوضاً عن ذلك ببرهان صدق القضية $\neg L \rightarrow (\neg L \wedge K)$. أي نقوم بافتراض نفي L ($\neg L$) وبعد ذلك وباستخدام $\neg L$ و K يتم برهان L . وبما أن $K \rightarrow L$ تكافئ $\neg L \rightarrow (\neg L \wedge K)$ فإننا نكون قد برهنا $K \rightarrow L$ المطلوبة. جدول الصدق أدناه يبرهن التكافؤ المذكور وذلك ببرهان أن:

$$\alpha \equiv (K \rightarrow L) \leftrightarrow ((\neg L \wedge K) \rightarrow L)$$

K	L	$\neg L \wedge K$	$K \rightarrow L$	$(\neg L \wedge K) \rightarrow L$	α
T	T	F	T	T	T
T	F	T	F	F	T
F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T

الحالة الثالثة:

لبرهان أية مبرهنة مطلوبة $K \rightarrow L$ حيث K شرطها و L نتيجتها، نقوم عوضاً عن ذلك ببرهان صدق القضية $(\neg L \wedge K) \rightarrow (R \wedge \neg R)$. أي نقوم بافتراض نفي L ($\neg L$) وبعد ذلك وباستخدام $\neg L$ و K يتم برهان صيغة متناقضة $R \wedge \neg R$. وبما أن $K \rightarrow L$ تكافئ $(\neg L \wedge K) \rightarrow (R \wedge \neg R)$ فإننا نكون قد برهننا $K \rightarrow L$ المطلوبة. جدول الصدق أدناه يبرهن التكافؤ المذكور وذلك ببرهان أن: $\beta \equiv (K \rightarrow L) \leftrightarrow ((\neg L \wedge K) \rightarrow (R \wedge \neg R))$ صيغة تكرارية.

K	L	R	$K \rightarrow L$	$K \wedge \neg L$	$R \wedge \neg R$	α	β
T	T	T	T	F	F	T	T
T	T	F	T	F	F	T	T
T	F	T	F	T	F	F	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	F	F	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	F	T	T	F	F	T	T
F	F	F	T	F	F	T	T

لقد توصلنا أعلاه إلى المتكافئات الثلاثة التالية:

$$K \rightarrow L \Leftrightarrow (\neg L \wedge K) \rightarrow \neg K \quad (1)$$

$$K \rightarrow L \Leftrightarrow (\neg L \wedge K) \rightarrow L \quad (2)$$

$$K \rightarrow L \Leftrightarrow (\neg L \wedge K) \rightarrow (R \wedge \neg R) \quad (3)$$

وهكذا فحتى نبرهن أن $K \rightarrow L$ صادقة فيكفي أن نبرهن صدق إحدى الصيغ:

$$(\neg L \wedge K) \rightarrow \neg K, (\neg L \wedge K) \rightarrow L, (\neg L \wedge K) \rightarrow (R \wedge \neg R).$$

بما أنه في كل الحالات أعلاه يستخدم نفي النتيجة فيقال أن المبرهنة قد برهنت بواسطة (البرهان غير المباشر). يستخدم البرهان بدون معرفة المنطق الرياضي، ولكن بدون المنطق الرياضي لا يمكن إثبات صحة البرهان.

إذا كان شرط المبرهنة المطلوبة (K) هو وصل لقضيتين، أي أن المبرهنة على الشكل $L \rightarrow (K_1 \wedge K_2)$ فإن صدقها يمكن برهانه باستخدام المتكافئة:

$$(K_1 \wedge K_2) \rightarrow L \Leftrightarrow (\neg L \wedge ((K_1 \wedge K_2) \rightarrow \neg K_1)) \quad (1)$$

أو

$$(K_1 \wedge K_2) \rightarrow L \Leftrightarrow (\neg L \wedge ((K_1 \wedge K_2) \rightarrow \neg K_2)) \quad (2)$$

يمكن برهان هاتين المتكافئتين باستخدام جداول الصدق وذلك ببرهان (على الترتيب) أن:

$$('1) (\neg L \wedge ((K_1 \wedge K_2) \rightarrow \neg K_1)) \Leftrightarrow ((K_1 \wedge K_2) \rightarrow L) \text{ صيغة تكرارية.}$$

$$('2) (\neg L \wedge ((K_1 \wedge K_2) \rightarrow \neg K_2)) \Leftrightarrow ((K_1 \wedge K_2) \rightarrow L) \text{ صيغة تكرارية.}$$

يمكن إجراء تعميم ليشمل الحالات التي يكون فيها شرط المبرهنة هو وصل لأكثر من قضيتين.

9.2 الاتساق وعدم الاتساق Consistency and Inconsistency

نقول أن مجموعة من مجموعة من الصيغ تكون متسقة إذا لم يكن بالإمكان اشتقاق صيغة متناقضة منها. إذا رمزنا لمجموعة الصيغ بالرمز Γ وبالرمز α لأي صيغة فيمكننا كتابة تعريف الاتساق المذكور رمزيا كالتالي:

$$\Gamma \not\vdash \alpha \wedge \Gamma \not\vdash \neg \alpha$$

حيث α أية صيغة.

لتكن $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ حيث أن $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ هي الصيغ. إذن حتى تكون Γ متسقة فيجب أن تكون:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \alpha \wedge \Gamma \vdash \alpha$$

أي أن :

$$(1) \quad (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow (\alpha \wedge \Gamma \vdash \alpha)$$

ليست صيغة تكرارية. وبما أن تالي هذا الاستلزام كاذبا دائما فإذن حتى لا تكون (1) صيغة تكرارية فيجب أن يكون مقدمها $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ صادقا. أي أن جميع المعطوفات $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ يجب أن تكون صادقة، وهكذا يمكننا أن نقول: حتى تكون مجموعة من الصيغ متسقة فيجب أن تكون جميعها صادقة في نفس الوقت. وهذا شرط كافي لاتساقها.

مبرهنة

مجموعة من الصيغ تكون متسقة إذا وفقط إذا أمكن تعيين قيم صدق متغيراتها القضائية بحيث تكون جميع الصيغ صادقة في نفس الوقت.

لنرمز للقضية (مجموعة من الصيغ تكون متسقة) بالرمز K وللقضية (يمكن تعيين قيم صدق لمتغيراتها القضائية بحيث تكون جميعها صادقة في نفس الوقت) بالرمز L . إذن يمكن كتابة المبرهنة على شكل استلزام ثنائي $K \leftrightarrow L$. سنبرهن $L \rightarrow K$ أولاً ثم نبرهن $K \rightarrow L$.

البرهان 1: سنبرهن صدق $K \rightarrow L$ وذلك ببرهان صدق مكافئها $\lceil L \rceil$. لنكن مجموعة الصيغ $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ولنفرض أنه لا يمكن تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية في Γ بحيث تكون جميع الصيغ صادقة ($\lceil L \rceil$). وإذن يكون الوصل $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ كاذباً. وهكذا يكون الاستلزام $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n \rightarrow \alpha \wedge \lceil \alpha \rceil$ صيغة تكرارية (لأنه سيكون على الشكل $F \rightarrow F$). وهكذا يكون $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \alpha \wedge \lceil \alpha \rceil$. أي أنه يمكن اشتقاق صيغة α ونفيها $\lceil \alpha \rceil$ من مجموعة الصيغ وبالتالي تكون مجموعة الصيغ غير متسقة ($\lceil K \rceil$).

البرهان 2: سنستخدم طريقة البرهان المباشر في برهان $L \rightarrow K$. نفرض أنه يمكن تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية بحيث تكون جميع الصيغ صادقة في نفس الوقت. أي أن $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ صيغة تكرارية. وإذن تكون $(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow (\alpha \wedge \lceil \alpha \rceil)$ كاذبة.

أي أن $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \alpha \wedge \lceil \alpha \rceil$ وبالتالي تكون مجموعة الصيغ متسقة (K). مثال: حدد فيما إذا كانت الصيغتان التاليتان متسقتين أو غير متسقتين:

$$\alpha_1: K \wedge L, \alpha_2: K \rightarrow (\lceil L \wedge \lceil M \rceil)$$

الحل: سنحاول البرهان على اتساق α_1 و α_2 وذلك بتعيين قيم صدق للمتغيرات، القضائية K، L، M بحيث تكون α_1 و α_2 صادقتين. حتى تكون α_1 صادقة فيجب أن تكون K صادقة و L صادقة. حتى تكون α_2 صادقة وبما أن K صادقة فيجب أن تكون L و $\neg M$ صادقتين، أي أن L يجب أن تكون كاذبة و M يجب أن تكون كاذبة. وهكذا وصلنا إلى طريق مسدود: (L يجب أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الوقت). إذن لا يمكن تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية بحيث تكون α_1 و α_2 صادقتين. إذن فهما غير متسقتين. سنضع هذه المناقشة على شكل برهان صوري كما يلي:

البرهان

{1}	1. $K \wedge L$	م
{2}	2. $K \rightarrow (\neg L \wedge \neg M)$	م
{1}	3. K	التبسيط، 1.
{1,2}	4. $\neg L \wedge \neg M$	الوضع 2,3
{1,2}	5. $\neg L$	التبسيط، 4.
{1}	6. L	التبسيط، 1.
{1,2}	7. $L \wedge \neg L$	العطف 5,6

البرهان الصوري أعلاه يبين إمكانية اشتقاق صيغة α (هي L) ونفيها $\neg L$ من الصيغتين α_1 و α_2 ، أي أنهما فعلا غير متسقتين.

للبرهنة على اتساق الصيغ بطريقة جداول الصدق يكفي أن نجد سطر واحد على الأقل في جدول صدق الصيغ تمتلك فيه كل مقدمة القيمة T (أي

أنها صادقة). وهكذا فإن عدم وجود أي سطر تكون فيه جميع الصيغ صادقة يعني عدم اتساق هذه الصيغ.

مثال 1: الصيغ $K \vee L, K \wedge L, K \rightarrow L$ متسقة وذلك لوجود سطر واحد على الأقل (هنا السطر الأول) تكون فيه جميع الصيغ صادقة، كما هو مبين في الجدول.

K	L	$K \vee L$	$K \wedge L$	$K \rightarrow L$
T	T	T	T	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	T
F	F	F	F	T

مثال 2: الصيغ $\neg L \rightarrow \neg K, K \vee L, \neg L$ غير متسقة وذلك لعدم وجود أي سطر تكون فيه جميع الصيغ صادقة، كما هو مبين في الجدول أدناه

K	L	$\neg L \rightarrow \neg K$	$K \vee L$	$\neg L$
T	T	T	T	F
T	F	F	T	T
F	T	T	T	F
F	F	T	F	T

2. 10 المبادئ العامة للتوصل إلى البراهين الصورية

إن البرهان عملية ذهنية وبالتالي لا توجد أفضل طريقة نستطيع أن ننصح بها للتوصل إلى البرهان الصوري لأنه توجد أكثر من طريقة واحدة. ولكن الوصول إلى أسهل وأكثر اختصارا لبرهان صحة صورة حجة ما يعتمد بالتأكيد على تركيب نتيجة صورة الحجة. أي هل أنها: متغير قضائي، نفي، وصل، فصل، استلزام، استلزام ثنائي؟. سنورد أدناه مبادئ عامة نراها مفيدة من أجل التوصل إلى البراهين الصورية.

(1) إذا كانت النتيجة متغير قضائي N أو نفي المتغير القضائي $\neg N$ ولم يكن البرهان المباشر واضحا نستخدم البرهان غير المباشر وذلك بإضافة نفي النتيجة واشتقاق صيغة متناقضة.

(2) إذا كانت النتيجة وصلا $M \wedge N$ نبرهن كل من المعطوفتين حسب (1) ثم نستخدم قاعدة العطف.

(3) إذا كانت النتيجة فصلا $M \vee N$ نبرهن إحدى المفصولتين ثم نستخدم قاعدة الجمع.

(4) إذا كانت النتيجة استلزاما $M \rightarrow N$ نستخدم البرهان الشرطي وذلك بإضافة المقدم M إلى المقدمات الأصلية واشتقاق التالي N .

(5) إذا كانت النتيجة استلزاما ثنائيا $M \leftrightarrow N$ نبرهن $M \rightarrow N$ و $N \rightarrow M$ حسب (4) ثم نستخدم قاعدة الاستلزام الثنائي.

11.2 اكتشاف البراهين الصورية

لقد لاحظنا وجود نوع من الصعوبة لدى الطلبة عند برهان صحة حجة، وعلى وجه الخصوص، ليس واضح لديهم من أين يبدأون وكيف يستمرون للوصول إلى النتيجة، وبعبارة أخرى هم يعانون من صعوبة اكتشاف المتتالية المطلوبة من الصيغ، والتي تمثل البرهان الصوري. وبشكل أدق، لا يعرفون ما هي الصيغة التي يبدأون بها وما هي قواعد الاشتقاق، التي يجب تطبيقها على هذه الصيغة وعلى الصيغ الأخرى للوصول إلى النتيجة المثال التوضيحي التالي يبين طريقة اكتشاف البراهين الصورية في حساب القضايا. وتطبق الطريقة نفسها، بخطوطها العامة في الفصل الخامس.

مثال

لنحدد صحة صورة الحجة التالية وذلك بإعطائها برهان صوري

المقدمات : $K \rightarrow (L \vee M), L \rightarrow N, M \rightarrow N, N \rightarrow \perp, O, O$

النتيجة : $\perp K$

حتى نشق $\perp K$ نرى أن المتغير القضائي K موجود في المقدمة الأولى، وهكذا فيمكن اشتقاق $\perp K$ من هذه المقدمة. ومن أجل ذلك يجب أن تكون لدينا الصيغة $(L \vee M)$ ونطبق قاعدة النفي التالي على المقدمة الأولى، أي يجب أن تكون لدينا $\perp M \wedge \perp L$ المكافئة إلى $(L \vee M)$. ومن أجل ذلك يجب أن تكون لدينا $\perp L$ و $\perp M$ ونطبق قاعدة العطف.

(1) $\perp L$ يمكن الحصول عليها من المقدمة الثانية، إذا كانت لدينا $\perp N$ وبتطبيق قاعدة نفي التالي.

(2) M يمكن الحصول عليها من المقدمة الثالثة، إذا كانت لدينا N وبتطبيق قاعدة نفي التالي.

ومن أجل الحصول على N فيجب أن تكون لدينا O ونطبق قاعدة نفي التالي على O والمقدمة الرابعة. وحتى يكون لدينا O فيجب أن تكون لدينا O ونطبق قاعدة النفي المزدوج على O .

الآن نلاحظ أن O تكون لدينا وهي المقدمة الخامسة.

مما ورد أعلاه تبين لنا أن متتالية الصيغ، التي تمثل البرهان الصوري المطلوب هي :

0.1 O نستقها من المقدمة الخامسة بتطبيق النفي المزدوج.

N.2 N نستقها من O والمقدمة الرابعة بتطبيق نفي التالي.

M.3 M نستقها من N والمقدمة الثالثة بتطبيق النفي التالي.

L.4 L نستقها من N والمقدمة الثانية بتطبيق النفي التالي.

M.5 $M \wedge L$ نستقها من L و M بتطبيق العطف.

6. $(L \vee M)$ نستقها من $M \wedge L$ بتطبيق دي مورغان.

7. K (النتيجة) نستقها من $(L \vee M)$ والمقدمة الأولى بتطبيق النفي التالي.

يجد القارئ البرهان الصوري الكامل لهذا المثال في حلول تمارين هذا الفصل.

2. 12 تمارين

(أ) حدد فيما إذا كانت كل صيغة مما يأتي: تكرارية، متناقضة أم عارضة.

$$(1) K \rightarrow K, \quad (2) (K \wedge L) \leftrightarrow (K \vee L)$$

$$(K \rightarrow L) \vee \neg L \quad (4) \quad \text{،} (K \vee L) \rightarrow \neg(L \vee K) \quad (3)$$

$$(K \rightarrow L) \wedge \neg(K \rightarrow L) \quad (6) \quad \text{،} (K \wedge \neg K) \rightarrow (L \vee \neg L) \quad (5)$$

$$(K \rightarrow L) \leftrightarrow (\neg L \rightarrow \neg K) \quad (7)$$

(ب) في كل زوج من الصيغ التالية وباستخدام جداول الصدق حدد فيما إذا كانت :

$$(أ) \Rightarrow (ب)$$

$$(ب) \Rightarrow (أ)$$

$$(أ) \Leftrightarrow (ب)$$

ليس أيًا مما ذكر.

$$K \vee L \quad (ب) \quad \neg K \rightarrow L \quad (أ) \quad (1)$$

$$K \wedge (K \rightarrow L) \quad (ب) \quad K \rightarrow L \quad (أ) \quad (2)$$

$$L \rightarrow R \quad (ب) \quad (K \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow R) \quad (أ) \quad (3)$$

$$(K \vee L) \vee \neg R \quad (ب) \quad \text{،} K \vee (L \vee R) \quad (أ) \quad (4)$$

$$(K \wedge R) \rightarrow \neg R \quad (ب) \quad \text{،} (K \rightarrow R) \rightarrow R \quad (أ) \quad (5)$$

(ج)

(1) جد صيغة تحوي الرابطين \neg ، \vee فقط وتكون مكافئة إلى

$$(\neg K \wedge \neg L) \rightarrow (\neg M \wedge N)$$

(2) جد صيغة تحوي الرابطين \neg ، \wedge فقط. وتكون مكافئة إلى

$$K \rightarrow (L \rightarrow M)$$

(3) جد صيغة تحوي الرابطين \bar{A} ، V فقط وتكون مكافئة إلى $L \leftrightarrow K$

(4) جد صيغة تحوي الرابطين \bar{A} ، \wedge فقط وتكون مكافئة إلى

$$(K \leftrightarrow \bar{L}) \leftrightarrow M$$

(5) جد صيغة تحوي الرابطين \bar{A} ، \rightarrow فقط وتكون مكافئة إلى $(L \wedge M) \wedge K$

(د) ترجم أزواج القضايا التالية إلى لغة حساب القضايا ثم بين باستخدام جداول

الصدق إن كانت متكافئة (المصدر، أفلاطون، النواميس)¹

(1) (أ) إذا كان شيء ما حيا، فإنه ذو روح، وإذا كان ذا روح، كان متحركا بذاته.

(ب) إذا كان شيء ما متحركا بذاته، فإنه ذو روح، وإذا كان ذا روح، كان حيا.

(2) (أ) إذا كانت الروح متحركة بذاتها وكان كل ما هو متحرك بذاته مصدر التغيير، كانت الروح مصدر التغيير.

(ب) لا يصدق القولان أن الروح ليست مصدر التغيير وكذلك أن الروح متحركة بذاتها وأن كل ما هو متحرك بذاته مصدر التغيير.

(3) (أ) إما أن تكون الروح ذاتها مصدر كل من الخير والشر أو أن تكون روح واحدة مصدر الخير وروح أخرى مصدر الشر.

(ب) إذا لم تكن الروح ذاتها مصدر كل من الخير والشر، فإن روحا واحدة مصدر الخير وروحا أخرى مصدر الشر.

¹ مقتبس عن د. كريم متي - المنطق الرياضي، مؤسسة الرسالة، بيروت 1979، عن :

Purill, R. L. - Logic for philosophers . Harper & Row, Publishers, New-York, 1971.

(ه) برهن صحة أو خطأ كل من الحجج التالية.

$$\neg L \rightarrow \neg K, L \leftrightarrow \neg M, K \quad (1) \text{ المقدمات}$$

$$\neg M \quad \text{النتيجة}$$

$$L \rightarrow M, \neg(K \leftrightarrow M) \quad (2) \text{ المقدمات}$$

$$\neg M \rightarrow K \quad \text{النتيجة}$$

(و) أعط براهين صورية مباشرة لكل من الحجج التالية:

$$K \rightarrow (L \vee M), L \rightarrow N, M \rightarrow N, N \rightarrow \neg O, O \quad (1) \text{ المقدمات}$$

$$\neg K \quad \text{النتيجة}$$

$$L \leftrightarrow (M \wedge K), M \rightarrow \neg K \quad (2) \text{ المقدمات}$$

$$\neg L \quad \text{النتيجة}$$

$$K \rightarrow (L \rightarrow M), \neg M \quad (3) \text{ المقدمات}$$

$$\neg K \vee \neg L \quad \text{النتيجة}$$

(ز) أعط برهاناً صورياً لكل من الحجج التالية¹:

(1) إذا كان الموت انفصال الروح عن الجسم، فإنه إذا كانت الروح قادرة على

الوجود مستقلة عن الجسم، فإن الروح تصبح حرة حين يموت الجسم. إذن إذا

¹ مقتبس عن المصدر السابق.

لم يكن من الصدق أن الروح تصبح حرة حين يموت الجسم، فإما أن لا يكون الموت انفصال الروح أو أن الروح لا تستطيع أن توجد مستقلة عن الجسم.

(2) إذا فسدت الروح حين يفسد الجسم، فإنه ينبغي أن نخشى الموت، ولكن إذا لم تفسد الروح حين يموت الجسم، فهناك أمل. وبطبيعة الحال إما أن تفسد الروح حين يموت الجسم أو لا تفسد. من هذا يلزم أنه إذا لم يكن هناك أمل، فإنه ينبغي أن نخشى الموت.

(3) إذا أُلقيت أسئلة على الناس بصورة صحيحة، فإنهم يظهرون معرفة لم يكتسبوها في هذه الحياة. وما كان في استطاعتهم أن يفعلوا ذلك، لو أنهم لم يكتسبوا معرفتهم في حياة سابقة. وإذا اكتسبوا معرفتهم في حياة سابقة، فإنه يمين البرهنة على أن الروح يمكن أن توجد مستقلة عن الجسم. وعليه إذا أُلقيت أسئلة على الناس بصورة صحيحة فإنه يمكن البرهنة على أن الروح يمكن أن توجد مستقلة عن الجسم.

(4) إذا كانت الروح تشبه نغما يعزف على آلة موسيقية، فإنه لا يمكن أن توجد الروح قبل أن يوجد الجسم. ولكن إذا كانت الحجة المستندة إلى التذكر قوية، فإن الروح قد وجدت قبل أن يوجد الجسم. وإذا كانت الروح قد وجدت قبل أن يوجد الجسم، فإن الروح يمكن أن توجد قبل أن يوجد الجسم. وعليه، فإما أن الحجة المستندة إلى التذكر ليست قوية أو أن الروح ليست نغما عزف على آلة موسيقية.

(ح) ترجم إلى اللغة الرمزية لحساب القضايا كلا من الحجج التالية وحدد صحة كل حجة. إذا كانت الحجة خاطئة أعط مثالاً مضاداً وإذا كانت صحيحة أعط برهاناً سورياً.

(1) إذا لم أذهب نقضاء إجازتي أو القيام بعمل إضافي فإني سأبيع سيارتي وأكسب بعض المال. إذن، سأذهب لقضاء إجازتي أو سأبيع سيارتي.

(2) إذا فازت الجزائر أو سوريا بكأس العرب لكرة القدم فإني أكون سعيداً وأقيم احتفالاً. إذن، إذا فازت الجزائر بكأس العرب لكرة القدم فإني أكون سعيداً.

(3) علي يذهب إلى المكتبة أو سالم وفاطمة يذهبان إلى المكتبة. إذا ذهب علي إلى المكتبة فإن فاطمة تذهب إلى المكتبة. إذن، فاطمة تذهب إلى المكتبة.

(4) إذا تغيب أحمد عن دروس المنطق أو تهانن في مراجعة دروسه فإن أحمد يرسب أو يطرد من الجامعة. إذا تهانن أحمد في مراجعة دروسه أو رسب فإنه سيشتعر بالإهانة. لن يشعر أحمد بالإهانة وسيغيب عن دروس المنطق. إذن، سيطرد أحمد من الجامعة.

(5) إذا هرب سالم من بيته فإنه ليس بريئاً من التهمة الموجهة إليه أو لن يكون أننا من القبض عليه. إذا كان سالم بعيداً عن مكان الجريمة فإنه بريء. إذا كان سالم بريئاً فإنه سيكون أننا من القبض عليه. سالم بعيد عن مكان الجريمة. إذن، لن يهرب سالم من بيته.

(6) إذا أقام علي احتفالا، بمناسبة نجاحه فإنه سيُدعي للاحتفال سمير وفائزة. إذا دعا علي سمير، أو فائزة فإنه يجب أن يدعي أحمد. إذن، إذا أقام علي احتفالا بمناسبة نجاحه فإنه يجب أن يدعي أحمد.

(ط) حدد صحة كل من صور الحجج التالية. إذا كانت خاطئة أعط مثالا مضادا وإذا كانت صحيحة أعط برهانا صوريا.

(1) المقدمات

$$\neg B \vee (M \wedge C), \neg B \rightarrow D$$

$$C \vee D \quad \text{النتيجة}$$

(2) المقدمات

$$(C \rightarrow A) \wedge (A \rightarrow B), E \rightarrow C$$

$$B \quad \text{النتيجة}$$

(3) المقدمات

$$(\neg M \wedge \neg L) \rightarrow \neg K, \neg K \rightarrow \neg L, M$$

$$K \quad \text{النتيجة}$$

(4) المقدمات

$$A \rightarrow (B \leftrightarrow C), B \vee \neg C, \neg A \rightarrow D$$

$$D \quad \text{النتيجة}$$

(5) المقدمات

$$A \rightarrow C, \neg C \vee D, B \leftrightarrow D, B \rightarrow \neg(A \wedge D)$$

$$A \leftrightarrow B \quad \text{النتيجة}$$

(6) المقدمات

$$(A \wedge B) \rightarrow (C \vee D), (E \wedge B) \rightarrow A$$

$$(E \wedge B) \rightarrow (C \vee D) \quad \text{النتيجة}$$

(7) المقدمات

$$R \rightarrow (Z \rightarrow X), R \rightarrow (\neg Z \rightarrow S), \neg R \rightarrow O, Z \vee \neg R$$

$$X \vee O \quad \text{النتيجة}$$

(8) المقدمات

$$(A \wedge B) \rightarrow (\neg D \rightarrow \neg C), E \rightarrow A$$

$$(E \wedge C) \rightarrow (D \vee \neg B) \quad \text{النتيجة}$$

(ي) أعط برهانا شرطيا لكل من صور الحجج التالية:

$$K \rightarrow (L \vee M), N \rightarrow K \quad \text{(1) المقدمات}$$

$$N \rightarrow (\neg L \rightarrow M) \quad \text{النتيجة}$$

$$(\neg K \vee \neg L) \rightarrow \neg M, N \rightarrow M \quad \text{(2) المقدمات}$$

$$N \rightarrow (K \wedge L) \quad \text{النتيجة}$$

$$K \rightarrow (L \wedge M), ((N \vee L) \wedge M) \rightarrow O \quad \text{(3) المقدمات}$$

$$K \rightarrow O \quad \text{النتيجة}$$

(ك) برهن النتائج التالية من المقدمات وذلك باستخدام طريقة البرهان غير المباشر :

$$\neg A \rightarrow (B \vee C), C \vee D, \neg B \vee \neg D \quad \text{(1) المقدمات}$$

$A \vee C$	النتيجة
$A \rightarrow (D \wedge E), C \vee E, C \rightarrow (A \wedge \neg D)$	(2) المقدمات
$E \wedge \neg C$	النتيجة
$\neg A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow D, B \rightarrow \neg C, A \vee B$	(3) المقدمات
$A \wedge D$	النتيجة

(ل) املاً نقص المعلومات في كل من البرهانين الصحيحين التاليين:

(1)

أرقام المقدمات	أرقام الخطوط	البرهان	السبب
{1}	1.	$(L \rightarrow M) \wedge (B \rightarrow A)$	م
{2}	2.	$L \wedge B$	مقدمة ب.ش م
	3.	$L \rightarrow M$	
	4.	$(B \rightarrow A) \wedge (L \rightarrow M)$	
	5.	$B \rightarrow A$	
	6.	L	
	7.	M	
	8.	$B \wedge L$	
	9.	B	
	10.	A	
	11.	$M \wedge A$	
	12.	$(L \wedge B) \rightarrow (M \wedge A)$	

(2)

أرقام المقدمات	أرقام الخطوات	البرهان	السبب
{1}	1.	$K \rightarrow \neg(M \vee L)$	م
{2}	2.	$(\neg L \rightarrow \neg G) \wedge (\neg M \rightarrow G)$	م
{3}	3.	K	مقدمة ب.غ. م
	4.	$\neg(M \vee L)$	
	5.	$\neg M \wedge \neg L$	
	6.	$\neg L \rightarrow \neg G$	
	7.	$\neg M \rightarrow G$	
	8.	$\neg G$	
	9.	G	
	10.	$G \wedge \neg G$	
	11.	$\neg K$	

(م) ترجم إلى لغة حساب القضايا كل من القضايا التالية ثم حدد فيما إذا كانت متسقة أم غير متسقة. إذا كانت متسقة فعين قيم صدق للمتغيرات القضائية بحيث تكون جميع القضايا صادقة، وإذا كانت غير متسقة فاعطي برهانا سوريا لصيغة متناقضة.

(1) إذا فسدت الروح حين يموت الجسم، فإنه ينبغي أن نخشى الموت.

إذا لم تفسد الروح حين يموت الجسم، فإن هناك أمل. تفسد الروح حين يموت الجسم أو لا تفسد.

(2) إذا تخرج أحمد علي من الجامعة، فإن أحمد أو علي سيحصلان علي عمل. إذا حصل أحمد علي عمل، فإن علي لن يحصل. وإذا تخرج علي من الجامعة، فإن أحمد لن يتخرج. لن يتخرج أحمد من الجامعة ولن يتخرج علي من الجامعة، ولكن أحمد أو علي سيحصل علي عمل.

(3) إذا كان $a < b$ و $b < c$ ، فإن $a < c$. إذا كان $a < b$ و $b \neq c$ ، فإن $a \neq c$. إذا كان $a \neq b$ و $b < c$ ، فإن $a < c$ ولكن $a < c$ إذا فقط إذا كان $a < b$ و $b < c$ أو $a \neq b$.

(ن) برهن اتساق أو عدم اتساق كل من مجموعات الصيغ التالية :

$$(1) K \rightarrow (L \vee M), K \wedge \neg L$$

$$(2) K \rightarrow L, M \rightarrow \neg L, \neg M \rightarrow N, K \wedge \neg N$$

$$(3) M \vee \neg N, L \leftrightarrow \neg K, K \leftrightarrow (L \vee M), K \vee \neg N, \neg L \vee N$$

$$(4) \neg(N \vee K), \neg K \rightarrow (M \vee N), M \rightarrow N$$

الفصل الثالث

Formal Systems of Propositional Calculus

الأنساق الصورية لحساب القضايا

Deductive Systems

3. 1 الأنساق الاستنباطية

يتكون أي نسق استنباطي من مجموعة من المفاهيم غير المعرفة (الأولية) والتي يتم بواسطتها تعريف مفاهيم أخرى في النسق، غير أولية (معرفة) ومن مجموعة من القضايا يتم تقبلها بدون برهان وتدعى البديهيات. باستخدام المفاهيم المعرفة وغير المعرفة والبديهيات يتم برهان قضايا النسق الأخرى والتي تؤلف مجموعة المبرهنات. والأنساق الاستنباطية يمكن أن تكون رياضية، فيزيائية (جزء من الفيزياء) أو نسق لعلم الحياة¹.

1. مجموعة المفاهيم الأولية Set of Premitive concepts

توجد ضرورة لأخذ بعض المفاهيم بدون تعريف. سنوضح هذه الضرورة بالمثال التالي: لناخذ تعريف مفهوم (العدد الأولي) وهو (عدد صحيح أكبر من 1 ولا يقبل القسمة على أي عدد صحيح موجب عدا نفسه والعدد 1). هذا التعريف يربط مفهوم (العدد الأولي) مع مفاهيم أساسية أكثر وهي: (عدد صحيح)، (موجب)، (العدد 1) و(يقبل القسمة). إن أي تعريف يربط المفهوم المعرف بمفاهيم أخرى. بعض أو جميع هذه المفاهيم الأخرى

¹Carnap, R.-Introduction to symbolic logic and its application, Dover publication, Inc. 1958.

يجب أن تعرف باستخدام مفاهيم أكثر وهكذا دواليك. من الواضح أن عملية التعريف يجب أن تتوقف في مكان ما لتجنب هذا التراجع اللانهائي أو أن نقضي كل وقتنا معرفين مفاهيم أكثر وأكثر ولن نستطيع بناء أية نظرية. إذن، يجب ترك بعض المفاهيم بدون تعريف وهذه هي المفاهيم الأولية. أما تحديد أي المفاهيم نعتبرها أولية فهي مسألة اختيارية تخص واضع النسق، أي أنه حر في اختيار مفهومه (أو مفاهيمه الأولية).

2. مجموعة البديهيات Set of Axioms

إن بناء النسق الاستنباطي يحتم أيضا عدم الاستمرار ببرهان قضية بواسطة قضية (أو قضايا) أخرى وهكذا دواليك. لتجنب هذا التراجع اللانهائي يجب تقبل قضية (أو قضايا) بدون برهان ونسميها البديهيات. أما تحديد أي القضايا نعتبرها بديهيات فهي مسألة اختيارية تخص واضع النسق، أي أنه حر في اختيار بديهياته ولا يعود هذا الاختيار إلى وضوحها بذاتها كما يعتقد البعض عن جهل. إن العديد من الأنساق الاستنباطية تبدأ بمجموعة بديهيات مختلفة عن بعضها البعض.

لقد ظهرت أنساق استنباطية لإقليدية استعملت نفي بديهية إقليدس للتوازي بديهية لها. فلقد قام العالم الروسي لوبانفسكي والهنغاري بولياي في بداية القرن 19 بوضع النسق اللاإقليدي المسمى (هندسة القطع الزائد). نفس الشيء حدث بالنسبة إلى العالم ريمان الذي وضع نسقا هندسيا لإقليديا آخر هو (الهندسة الإهليجية).

3. 2 النسق الصوري

Formal System

لقد كانت عملية الاشتقاق هدفا لدراستنا في الفصل السابق ومن أجل ذلك قمنا بترجمة القضايا إلى اللغة الرمزية لحساب القضايا وذلك من أجل دراسة العلاقات فيما بينها وهما علاقتي (ينتج) و(يكافئ). كذلك قمنا بترجمة الحجج إلى نفس اللغة الرمزية للحصول على صورها حتى تكون عملية تحديد صحتها ممكنة وسهلة المنال باستخدام جداول الصدق أولا ثم باستخدام البراهين الصورية.

إن ما سنقوم به الآن هو بناء نسقا استنباطيا صوريا ونقصد بصوريته حالة استخدام الرموز التي ليس لها أي معنى. الفرق بين النسق الاستنباطي والنسق الاستنباطي الصوري (اختصارا نقول (النسق الصوري)) هو أن المفاهيم الأولية للنسق الصوري تكون رموز ليس لها أي معنى، أي أنها لا تحمل أي محتوى. أما بديهياته فهي صيغ تتكون حسب قواعد معينة ولا تمثل قضايا أبدا. كما أن مجموعة مبرهنات للنسق هي صيغ أيضا.

تظهر الأهمية الحاسمة للأنساق الصورية في المنطق إذا علمنا أنه ما لم يبين المنطق كنسق صوري فإنه يكون من المستحيل على المنطق أن يبلغ هدفه. وذلك لعدم وجود طريقة أخرى (غير بناءه كنسق) لتحديد فيما إذا كان المنطق تاما، أي أنه يحوي كل الصيغ الصادقة دائما وكذلك فيما إذا كان متسقا، أي يحوي أو لا يحوي صيغة ونفيها معا. إن دراسة الأنساق

¹ Hackstaff, L.H.-Systems of Formal Logic, D.Reidel publishing Co.Dordrecht-Holland, 1966, p.11.

المنطقية تعتبر من المهام المركزية للمنطق¹. سندرس في هذا الفصل نسقا سوريا لحساب القضايا محددين أدناه كيفية بناءه.

مكونات النسق الصوري

يكون النسق الصوري معرّفاً وذلك بتوفر ما يلي :

- (1) رموز النسق (أبجدية النسق).
- (2) صيغ هي عبارة عن مجموعة نهائية من تتابع لرموز النسق. يمكن تصور هذه الصيغ مثل كلمات وجمل لغتنا الصورية العادية.
- (3) مجموعة جزئية من الصيغ في (2) نسميها البديهيات.
- (4) مجموعة نهائية من قواعد الاشتقاق. قواعد الاشتقاق هذه تمكننا من أن نقرر فيما إذا كانت صيغة معلومة تنتج (تشتق) من مجموعة نهائية من صيغ معلومة أخرى.

3.3 النسق الصوري P

مكونات النسق الصوري P

يكون النسق الصوري لحساب القضايا P معرّفاً وذلك بتوفر ما يلي :

- (1) رموز لانهائية للنسق (أبجدية النسق) وتتكون من :
 - (أ) الحروف A, B, C, ... وهذه الحروف ودلالاتها $A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots$ وندعوها المتغيرات القضائية. الرمزان \neg , \rightarrow وندعوها الرابطين الأوليين.
 - (ب) الرمزان (و) وندعوها قوس الإغلاق وقوس الفتح على الترتيب.

¹ Haack, S.-Philosophy of logic, Cambridge University Press, 1999, ch. 1.

(2) مجموعة الصيغ التي تتكون حسب القاعدتين :

(أ) المتغيرات القضاية في (1) تكون صيغا.

(ب) إذا كانت α , β صيغتان فإن α و $\beta \rightarrow \alpha$ صيغتين كذلك.

تستخدم الأقواس بنفس الطريقة الموضحة في قواعد بناء الصيغ التي مرت بنا.

(3) مجموعة بديهيات النسق P

يوجد عدد لانهائي من البديهيات وهكذا فلن نستطيع كتابة قائمة البديهيات ولكننا سنعينها أدناه بواسطة ثلاثة أشكال بديهية¹ :

إذا كانت α, β, γ أية صيغ فإن الصيغ التالية هي بديهيات النسق P :

شكل بديهية 1 (A_1)

$$1. \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$$

شكل بديهية 2 (A_2)

$$2. (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

شكل بديهي 3 (A_3)

$$3. (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow ((\neg \beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta)$$

(4) قواعد الاستنتاج

قاعدة الاستنتاج المستخدمة في النسق P هي قاعدة الوضع فقط : من

α و $\alpha \rightarrow \beta$ نستنتج β ، حيث أن α ، β أية صيغتان من P.

¹ - Axiom Schemes

إن سبب اقتصارنا على الرمزين \lceil , \rightarrow في P هو جعل اللغة الرمزية للنسق P أكثر سهولة وحتى تكون مجموعة البديهيات و/أو قواعد الاشتقاق موجزة. فإذا نحن أدخلنا الرمز \vee في رموز النسق فإنه سيتوجب علينا أيضا إدخال بديهيات لتتحكم في هذا الرمز ولتكشف علاقته مع الرمز \rightarrow بوضوح.

إن مجموعة البديهيات أعلاه ليست هي المجموعة الوحيدة فيمكن اختيار مجموعة بديهيات أخرى ولكنها مناسبة من أجل برهان مبرهنتي الاستنتاج والتمام كبيرتي الأهمية. سنبين أدناه الطبيعة الاستنتاجية لنسق P .

تعريف

{البرهان} في النسق P هو متتالية منتهية من الصيغ :

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ حيث أن أية صيغة α_i هي بديهية أو صيغة مشتقة من للصيغ التي تسبقها في المتتالية وذلك باستخدام قاعدة الوضع. هذا البرهان هو برهان الصيغة α_n في النسق P . وتسمى α_n مبرهنة النسق P .

إذا كانت المتتالية المنتهية $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ برهانا في النسق P و $k < n$ فإن المتتالية $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ تكون أيضا برهانا في النسق P لأنها تلبي تعريف (البرهان) وهكذا تكون α_k مبرهنة في النسق P . أن هذا يعني كذلك أن كل بديهيات النسق P هي مبرهانات فيه، حيث يكون برهان كل بديهية من P عبارة عن متتالية ذات حد واحد هو البديهية نفسها.

إذا كانت Γ هي المجموعة المنتهية من الصيغ $\{ \alpha_1 , \alpha_2 , \dots , \alpha_n \}$ فإننا نكتب $\beta \vdash \alpha_1 , \alpha_2 , \dots , \alpha_n$ عوضاً عن $\beta \vdash \{ \alpha_1 , \alpha_2 , \dots , \alpha_n \}$ للاختصار. إذا كانت Γ هي المجموعة الخالية ϕ فإن :

$\beta \vdash \phi$ إذا فقط إذا كانت β مبرهنة. وعادة نحذف الرمز ϕ ونكتب β . وهكذا فإن $\beta \vdash$ يعني أن β مبرهنة. نشير إلى أن الرمز \vdash لا ينتمي إلى رموز النسق P وهكذا فإن أي تعبير يظهر فيه هذا الرمز لا يكن جزءاً من P فمثلاً $\beta \vdash$ قضية حول P وهي أن الصيغة β من مبرهنات P .

(5) المبرهنات

مبرهنة 1 : $\vdash_P \alpha \rightarrow \alpha$ ، أية صيغة α

أرقام الخطوط	البرهان	السبب
1	$(\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha))$	(A_2) بدئية حسب
2	$\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)$	(A_1) بدئية حسب
3	$(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$	1, 2 الوضع
4	$\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$	(A_1) بدئية حسب
5	$\alpha \rightarrow \alpha$	3, 4 الوضع

للتوضيح نشير إلى أننا قد حصلنا على الصيغة رقم 1 من البرهان وذلك بالتعويض عن α بـ α وعن β بـ $\alpha \rightarrow \alpha$ وعن γ بـ α في A_2 ، وهكذا فإن هذه الصيغة هي إحدى حالات A_2 . أما الصيغة رقم 2 فقد حصلنا

عليها وذلك بالتعويض عن α بـ α وعن β بـ $\alpha \rightarrow \alpha$ وعن γ بـ α في A_1 ، وهكذا فإن هذه الصيغة هي إحدى حالات A_1 .

سنبرهن الآن أولى ما وراء مبرهنات P^1 حيث أنها لا تنتمي إلى مبرهنات P ولها مفعول قاعدة اشتقاق. إنها (مبرهنة الاستنتاج) التي غالبا ما سنستخدمها في برهان مبرهنات النسق P . وللتوضيح نقول بأننا غالبا ما نقوم في الرياضيات ببرهان: إذا كان α فإن β وذلك ببرهان β انطلاقا من α .

مبرهنة الاستنتاج The Deduction Theorem

إذا كانت $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ فإن $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ ، حيث أن α و β

صيغتان من P و Γ مجموعة من صيغ P ، Γ يمكن أن تكون خالية.

البرهان: سيكون هذا البرهان بواسطة الاستقراء².

الخطوة القاعدية: نفرض أن متتالية البرهان تتكون من حد واحد. هذا الحد يكون β نفسها وهكذا فإما أن تكون β من بديهيات P أو أن β عنصر في

$\Gamma \cup \{\alpha\}$.

الحالة 1

إذا كانت β إحدى بديهيات P فإن برهان β من α يكون

كالتالي:

¹ - Metatheorems

² - Induction

البرهان

1	β	بديهية P
2	$\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	بديهية حسب A_1
3	$\alpha \rightarrow \beta$	الوضع 1,2

وهكذا برهنا : $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

الحالة 2

إذا كانت $\beta \in \Gamma$ فإن برهان $\alpha \rightarrow \beta$ من Γ يكون كالتالي :

البرهان

1	β	عنصر من Γ
2	$\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	بديهية حسب A_1
3	$\alpha \rightarrow \beta$	الوضع 1,2

الحالة 3

إذا كانت β هي α فإنه حسب المبرهنة 1 لدينا $\alpha \rightarrow \alpha$ الذي يصلح لبرهان $\alpha \rightarrow \alpha$ من Γ وهنا أيضا لدينا $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ وهكذا تنتهي الخطوة القاعدية.

نفرض الآن أن برهان β من $\Gamma \cup \{\alpha\}$ هو متتالية عدد حدودها n حيث $1 < n$ وأن مبرهنة الاستنتاج تصح من أجل كل صيغة γ التي يمكن برهانها من $\Gamma \cup \{\alpha\}$ عن طريق متتالية عدد حدودها أصغر من n . هنا توجد أربع حالات يجب أخذها بعين الاعتبار :

الحالة 1

β هي إحدى بديهيات P . نبرهن $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ كما في الحالة 1 أعلاه تماماً.

الحالة 2

$\beta \in \Gamma$. هنا أيضاً نبرهن $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ كما في الحالة 2 أعلاه تماماً.

الحالة 3

β هي α . وهنا أيضاً كما في الحالة 3 أعلاه تماماً.

الحالة 4

الحصول على β يتم من صيغتين سابقتين لها في البرهان وبتطبيق قاعدة الوضع. هاتان الصيغتان يجب أن تكونا على الشكلين γ و $\beta \rightarrow \gamma$ وكل صيغة من هاتين الصيغتين يمكن برهانها من $\Gamma \cup \{\alpha\}$ بواسطة متتالية عدد حدودها أصغر من n . في كل حالة إ حذف حدود المتتالية الجزئية من متتالية البرهان الأصلية وما تبقى هو المتتالية المطلوبة (راجع تعريف البرهان)،
الفقرة الثانية).

عندنا $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \gamma \rightarrow \beta$ و $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \gamma$ وبتطبيق فرضية الاستقراء نحصل على: $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma$ و $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$.

إن البرهان المطلوب إلى $\beta \rightarrow \alpha$ من Γ يكون الآن كما يلي :

1			
.			
.			
.			
K	$\alpha \rightarrow \gamma$	}	برهان $\alpha \rightarrow \gamma$ من Γ
k+1			
.			
.			
.			
L	$\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$	}	برهان $\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$ من Γ
L+1	$(\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta))$		بديهية حسب A_2
L+2	$(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$		الوضع L, L+1
L+3	$\alpha \rightarrow \beta$		الوضع k, L+2

وهكذا نحصل على $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ في الحالات الأربع.

سنقوم الآن ببرهان عكس مبرهنة الاستنتاج :

مبرهنة

إذا كان $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ فإن $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ ، حيث α و β

صيغتان من P، أما Γ فمجموعة من الصيغ من P (و يمكن أن تكون خالية).

البرهان : هنا عندنا برهان $\alpha \rightarrow \beta$ من Γ ونريد برهان β من

$\Gamma \cup \{\alpha\}$ كالتالي :

1			
.			
.			
.			
K	$\alpha \rightarrow \beta$	}	برهان $\alpha \rightarrow \beta$ من Γ
K+1	α		عنصر من $\Gamma \cup \{\alpha\}$
K+2	β		الوضع k, k+1

سنستخدم مبرهنة الاستنتاج كقاعدة اشتقاق في البرهان التالي :

$$\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma \quad \text{مبرهنة 2}$$

البرهان

{1}	1	$\alpha \rightarrow \beta$	م
{2}	2	$\beta \rightarrow \gamma$	م
{3}	3	α	(مقدمة مبرهنة الاستنتاج) م
{1,3}	4	β	الوضع 1,3
{1,2,3}	5	γ	الوضع 2,4
{1,2}	6	$\alpha \rightarrow \gamma$	مبرهنة الاستنتاج 3,5

لقد برهننا على الخط 5 الصيغة γ من المقدمتين الأصليتين 1,2 ومن مقدمة مبرهنة الاستنتاج المضافة 3. وعلى الخط 6 وباستخدام مبرهنة الاستنتاج كقاعدة اشتقاق تم برهان $\alpha \rightarrow \gamma$ المطلوبة من المقدمتين الأصليتين 1,2 فقط.

نشير إلى أن مبرهنة 2 هي قاعدة الاشتقاق القياس الشرطي والتي

سنستخدمها في برهان المبرهنات اللاحقة.

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta \vdash \alpha \rightarrow \gamma \quad \text{مبرهنة 3}$$

البرهان

⟨1⟩	1	$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$	م
⟨2⟩	2	β	م
⟨3⟩	3	α	(مقدمة مبرهنة الاستنتاج) م
⟨1,3⟩	4	$\beta \rightarrow \gamma$	الوضع 1,3
⟨1,2,3⟩	5	γ	الوضع 2,4
⟨1,2⟩	6	$\alpha \rightarrow \gamma$	مبرهنة الاستنتاج 3,5

┆

$$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$$

مبرهنة 4

البرهان

1	$(\neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow \alpha)$	بديهية حسب A_3
2	$\neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$	مبرهنة 1
3	$(\neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha) \rightarrow \alpha$	مبرهنة 1, 2, 3
4	$\neg \neg \alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha)$	بديهية حسب A_1
5	$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$	القياس الشرطي 3, 4

مبرهنة 4 هي أحد أشكال قاعدة الاستقاق النفي المزدوج.

$$\vdash \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha$$

مبرهنة 5

البرهان

1	$(\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow ((\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg \neg \alpha)$	بديهية حسب A_3
2	$\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$	مبرهنة 4
3	$(\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg \neg \alpha$	الوضع 1, 2
4	$\alpha \rightarrow (\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha)$	بديهية حسب A_1
5	$\alpha \rightarrow \neg \neg \alpha$	القياس الشرطي 3, 4

المبرهنة 5 هي الشكل الآخر من قاعدة الاستقاق النفي المزدوج.

$$\vdash \neg \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$$

مبرهنة 6

البرهان

1	$\neg \alpha$	مقدمة مبرهنة الاستنتاج م
2	α	مقدمة مبرهنة الاستنتاج م
3	$\alpha \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \alpha)$	بديهية حسب A_1
4	$\neg \alpha \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha)$	بديهية حسب A_1

5	$\neg\beta \rightarrow \alpha$	الوضع 2,3
6	$\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$	الوضع 1,4
7	$(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta)$	A_3
8	$(\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta$	الوضع 6,7
9	β	الوضع 5,8
10	$\alpha \rightarrow \beta$	مبرهنة الاستنتاج 2,9
11	$\neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	مبرهنة الاستنتاج 1,10

$$\vdash (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \quad \text{مبرهنة 7}$$

البرهان

1	$\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$	(مقدمة مبرهنة الاستنتاج) م
2	$(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta)$	A_3
3	$\alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \alpha)$	بديهية حسب A_1
4	$(\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta$	الوضع 1,2
5	$\alpha \rightarrow \beta$	القياس الشرطي 3,4
6	$(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	مبرهنة الاستنتاج 1,5

المبرهنة 7 هي أحد أشكال قاعدة الاشتقاق عكس النقيض.

$$\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \quad \text{مبرهنة 8}$$

البرهان

1	$\alpha \rightarrow \beta$	(مقدمة مبرهنة الاستنتاج) م
2	$\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$	مبرهنة 4
3	$\neg\neg\alpha \rightarrow \beta$	القياس الشرطي 1,2
4	$\beta \rightarrow \neg\neg\beta$	مبرهنة 5
5	$\neg\neg\alpha \rightarrow \neg\neg\beta$	للقياس الشرطي 3,4
6	$(\neg\neg\alpha \rightarrow \neg\neg\beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$	مبرهنة 7
7	$\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$	الوضع 5,6
8	$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$	مبرهنة الاستنتاج 1,7

المبرهنة 8 هي الشكل الآخر لقاعدة الاستقاق عكس النقيض.

$$\vdash \alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \beta)) \quad \text{مبرهنة 9}$$

بتطبيق مبرهنة الاستنتاج مرتين على قاعدة الوضع :

$$\vdash \alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta) \quad \alpha, \alpha \rightarrow \beta \vdash \beta$$

البرهان

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | $\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$ | تطبيق مبرهنة الاستنتاج مرتين |
| | | على الوضع |
| 2 | $((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \beta))$ | عكس النقيض |
| 3 | $\alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \beta))$ | القياس الشرطي 1,2 |

$$\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta) \quad \text{مبرهنة 10}$$

البرهان

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1 | $\alpha \rightarrow \beta$ | فرضية مبرهنة الاستنتاج |
| 2 | $\neg\alpha \rightarrow \beta$ | فرضية مبرهنة الاستنتاج |
| 3 | $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$ | مبرهنة 8 |
| 4 | $\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$ | الوضع 1,3 |
| 5 | $(\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$ | مبرهنة 8 |
| 6 | $\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$ | الوضع 2,5 |
| 7 | $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \beta)$ | بديهية حسب A_3 |
| 8 | $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \beta$ | الوضع 6,7 |
| 9 | β | الوضع 4,8 |
| 10 | $(\alpha \rightarrow \beta) \vee (\neg\alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$ | 1-9 |
| 11 | $\alpha \rightarrow \beta \vdash (\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta$ | مبرهنة الاستنتاج 10 |
| 12 | $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$ | مبرهنة الاستنتاج 11 |

Independence of

4.3 استقلال الأشكال البديهية للنسق P

Axiom schemes of system P

نقول عن الأشكال البديهية لنسق ما بأنها مستقلة إذا كان من المستحيل برهان أي منها من الأشكال البديهية الأخرى باستخدام قواعد اشتقاق النسق. ولكنه لن يكون عملي محاولة برهان استقلال شكل البديهية الأولى A_1 ، مثلا من النسق P وذلك بفشل إمكانية برهانها من الأشكال البديهية الأخرى. ولهذا فسننتبع ما يلي :

لتكن شكل البديهية A_m هي المطلوب برهان استقلالها عن الأشكال البديهية الأخرى. إذا أمكننا تبيان أن الأشكال البديهية الأخرى تمتلك صفة تركيبية¹ معينة تحافظ عليها قاعدة اشتقاق النسق وكانت A_m لا تمتلك هذه الصفة فإن A_m تكون مستقلة عن الأشكال البديهية الأخرى للنسق P. ذلك أنه لو كانت شكل البديهية A_m غير مستقلة، أي أنها صيغة يمكن برهانها من الأشكال البديهية الأخرى بتطبيق قاعدة اشتقاق النسق، لوجب أن كل صفة تتصف بها الأشكال البديهية الأخرى وتحافظ عليها قواعد الاشتقاق، تتصف بها A_m كذلك.

وعليه فنسجد مجموعة M من الأعداد الطبيعية، ثلاثة أو أكثر وسنختار منها عددا معينا نسميه القيمة الممتازة تكون قيمة دائمة للأشكال البديهية المغايرة إلى A_m . كما أن قاعدة الاشتقاق (الوضع) تحافظ على هذه

¹ - Syntactic

القيمة الممتازة ومع ذلك لا تكون هذه القيمة الممتازة قيمة دائمة إلى A_m .
وإذن تكون A_m مستقلة.

إن هذه الطريقة المتبعة في برهان الاستقلال هي تعميم لطريقة
جداول الصدق في حساب القضايا، حيث نكتفي بقيمتين T و F . كما إن
القيمة الممتازة هنا تقابل القيمة T في جداول الصدق هذه. (سنسمي الأشكال
البديهية التي تأخذ القيمة الممتازة فقط بالصحيحة).

1. برهان استقلال شكل البديهية A_1 عن A_2 و A_3
البرهان

لتكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0.

سنعرف الرمزين \lceil و \rightarrow حسب الجدولين التاليين :

K	\lceil K
0	1
1	1
2	0

K	L	$K \rightarrow L$
0	0	0
0	1	2
0	2	2
1	0	2
1	1	2
1	2	0
2	0	0
2	1	0
2	2	0

الجدول أنه تبين أن A_2 و A_3 تأخذان القيمة الممتازة 0. كما أن قاعدة الاشتقاق الوضع تحافظ على هذه القيمة (أو أنها تحافظ على الصحة) لأنه إذا أخذت كل من $K \rightarrow L$ و K القيمة الممتازة 0 فيجب أن تأخذ K هذه القيمة كما يبين جدول تعريف \rightarrow أعلاه. (سنستخدم حالات من (A_1, A_2, A_3)).

A_1	A_2
$K \rightarrow (L \rightarrow K)$	$(K \rightarrow (L \rightarrow M)) \rightarrow ((K \rightarrow L) \rightarrow (K \rightarrow M))$
0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 2 0	0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
0 0 2 0 0	0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 0 0 2 1	0 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
1 0 1 2 1	0 2 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1
1 2 2 0 1	0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 2 2
2 0 0 2 2	0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2 0 1 0 2	0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2 1
2 0 2 0 1	0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2
	1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0
	1 0 0 2 1 0 1 2 0 2 1 2 1
	1 0 0 2 2 0 1 2 0 2 1 0 2
	1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 2 0
	1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1
	1 2 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 2
	1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0
	1 2 2 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1
	1 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2
	2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
	2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 1
	2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2
	2 0 1 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0
	2 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1
	2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2
	2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
	2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1
	2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

A_3

$$(\neg L \rightarrow \neg K) \rightarrow ((\neg L \rightarrow K) \rightarrow L)$$

1	0	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0
1	1	2	1	0	0	1	1	2	0	0	1
0	2	2	1	0	0	0	2	0	0	2	2
1	0	2	1	1	0	1	0	2	1	0	0
1	1	2	1	1	0	1	1	2	1	0	1
0	2	2	1	1	0	0	2	2	1	0	2
1	0	2	0	2	0	1	0	0	2	0	0
1	1	2	0	2	0	1	1	0	2	2	1
0	2	0	0	2	0	0	2	2	2	0	2

نلاحظ أن A_1 تأخذ القيمة 2 بالإضافة إلى القيمة 0، وذلك عندما

تأخذ K القيمة 0 و L القيمة 1، بينما تأخذ A_2 و A_3 القيمة 0 دائما.

2. برهان استقلال شكل البديهية A_2 عن A_1 و A_3

البرهان

لتكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0.

سنعرف الرمزين \neg و \rightarrow حسب الجدولين التاليين :

K	$\neg K$
0	1
1	0
2	1

K	L	$K \rightarrow L$
0	0	0
0	1	2
0	2	1
1	0	0
1	1	2
1	2	0
2	0	0
2	1	0
2	2	0

بإنشاء جداول A_1, A_2, A_3 نجد أن A_1 و A_3 تأخذان القيمة الممتازة 0 دائما (صحيحتان). كما أن قاعدة الوضع تحافظ على الصحة، بينما نجد أن A_2 تأخذ القيمة 2 بالإضافة إلى القيمة 0، وذلك عندما تأخذ K القيمة 0، L القيمة 0 و M القيمة 1. إذن A_2 مستقلة عن A_1 و A_3 .

3. برهان استقلال A_3 عن A_1 و A_2

البرهان

سنستخدم طريقة أخرى في البرهان. لنكن A^* هي شكل البديهية الناتج من الشكل A بواسطة حذف جميع رموز النفي \neg من A . وهكذا فإذا كانت A هي $K \rightarrow L$ فإن A^* هي $K \rightarrow L$. لنسمي A^* بالشكل المرافق إلى A . إذن :

1. الأشكال البديهية المرافقة لكل من A_1 و A_2 تكون صيغة تكرارية، حيث أن A_1 هي نفسها A_1^* و A_2 هي نفسها A_2^* .

2. قاعدة الوضع تحافظ على تكرارية الأشكال المرافقة لأنه إذا كانت $(K \rightarrow L)^*$ و K^* صيغتان تكراريتان فإن L^* تكون صيغة تكرارية (لاحظ أن $(K \rightarrow L)^*$ هي $K^* \rightarrow L^*$). ونستخدم مبرهنة سابقة : قاعدة الوضع تقود من صيغتين تكراريتين إلى صيغة تكرارية أخرى.

3. الشكل البديهي المرافق A_3^* ليس شكلا تكراريا، ذلك أن $(L \rightarrow (L \rightarrow K)) \rightarrow (L \rightarrow K)$ ليست صيغة تكرارية. وبالتالي فإن A_3 مستقلة عن A_1 و A_2 .

من المستحسن توفر هذا الشرط في مجموعة بديهيات النسق وذلك لأنه إذا لم تكن المجموعة مستقلة، أي إذا أمكن اشتقاق واحدة منها مثلا من البديهيات الأخرى فإنها تكون بديهية زائدة، لأنها بذلك تصبح صيغة مشتقة (مبرهنة) من بقية البديهيات وبذلك تكون بديهية زائدة. في هذه الحالة يصعب الفصل بين قائمة البديهيات وقائمة المبرهنات. أما من الناحية المنطقية فلا حرج من عدم توفر شرط الاستقلال.

5.3 تمامية النسق P Completeness of system P

بشكل عام، نقول عن نسق ما بأنه يتصف بالتمامية الدلالية إذا كانت كل صيغة تكرارية يمكن البرهان عليها فيه. وبالرموز نكتب

$$\models \alpha \rightarrow \vdash \alpha$$

النسق P يتصف بالتمامية ولبرهان ذلك سنقوم أولا ببرهان المبرهنة

التالية :

مبرهنة

إذا كانت α و $\alpha \rightarrow \beta$ صيغتان تكراريتان فإن β تكون صيغة تكرارية أيضا.

نستطيع صياغة هذه المبرهنة كالتالي :

قاعدة الاشتقاق الوضع تعود من صيغتين تكراريتين إلى صيغة تكرارية أخرى.

البرهان

لنفرض α و $\alpha \rightarrow \beta$ صيغتان تكراريتان. إذا أخذت β القيمة F لتعيين قيم صدق المتغيرات القضاية في α و β ، وبما أن α صيغة تكرارية فإن α تأخذ القيمة T وبالتالي فإن $\alpha \rightarrow \beta$ ستأخذ القيمة F لهذا التعيين وهذا يناقض فرضيتنا بأن $\alpha \rightarrow \beta$ صيغة تكرارية. وهكذا فإن β لا يمكن أن تأخذ القيمة F.

الآن سنبرهن المبرهنة التالية :

Soundness theorem

مبرهنة الصحة

كل مبرهنة تكون صيغة تكرارية.

رمزيا نكتب هذه المبرهنة على الشكل $\vdash \alpha \rightarrow \models \alpha$

البرهان

نستطيع التحقق من أن كل بديهيات P صيغ تكرارية وذلك بواسطة جدول الصدق وهي كذلك ويستطيع القارئ التحقق من ذلك. وبما أن قاعدة الاشتقاق الوضع تقود من صيغ تكرارية إلى صيغ تكرارية أيضا حسب المبرهنة أعلاه، فإن كل مبرهنة من P تكون صيغة تكرارية. سنبرهن الآن المسألة التالية :

المسألة 1

لتكن α أية صيغة ولتكن A_1, A_2, \dots, A_k هي المتغيرات القضاية التي تظهر في α . من أجل تعيين I معلوم لقيم صدق A_1, A_2, \dots, A_k ، لندع A'_j تكون A_j إذا أخذت القيمة T وندع A'_j تكون $\neg A_j$ إذا أخذت القيمة F. لندع α' تكون α إذا أخذت القيمة T حسب التعيين. لندع α' تكون $\neg \alpha$ إذا أخذت القيمة F. إذن

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \alpha'$$

ومن أجل توضيح أهمية هذه المسألة سنعطي المثال التالي :

لتكن α هي $(\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$. إذن في كل سطر من أسطر جدول صدق α فإن المسألة تقرر صحة 8 علاقات اشتقاق بالنسبة إلى α . جدول صدق الصيغة $(\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$ يكون كما هو مبين أدناه :

A_1	A_2	A_3	$\neg A_1 \rightarrow A_2$	$(\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

المسألة تقرر العلاقات التالية في كل سطر من الأسطر

1-السطر الأول :

$$A_1, A_2, A_3 \vdash (\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$$

2-السطر الثاني :

$$A_1, A_2, \neg A_3 \vdash \neg((\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3)$$

3-السطر الثالث :

$$A_1, \neg A_2, A_3 \vdash (\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$$

4-السطر الرابع :

$$A_1, \neg A_2, \neg A_3 \vdash \neg((\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3)$$

5-السطر الخامس :

$$\neg A_1, A_2, A_3 \vdash (\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$$

6-السطر السادس :

$$\neg A_1, A_2, \neg A_3 \vdash \neg((\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3)$$

7-السطر السابع :

$$\neg A_1, \neg A_2, A_3 \vdash (\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$$

8-السطر الثامن :

$$\neg A_1, \neg A_2, \neg A_3 \vdash (\neg A_1 \rightarrow A_2) \rightarrow A_3$$

الآن سنقوم ببرهان المسألة 1 :

البرهان

سيتم البرهان بواسطة الاستقراء على عدد n لظهور الرابطتين \lceil و \rightarrow في α .

1. خطوة قاعدة الاستقراء ($n = 0$): في هذه الحالة تكون الصيغة α متغير واحد غير منفي A_1 . وهكذا فإن المبرهنة ستتحول إلى $A_1 \vdash A_1$ بالنسبة إلى الحالة التي يعين فيها I القيمة T إلى A_1 (نعني بالنسبة إلى سطر جدول الصدق التي تكون فيه قيمة A_1 هي T). كما أن المبرهنة ستتحول إلى $\lceil A_1 \vdash \lceil A_1$ بالنسبة إلى الحالة التي يعين فيها I القيمة F إلى A_1 .

2. خطوة الاستقراء: لنفرض أن المبرهنة تصح لكل صيغة α تحتوي على عدد لظهور الرابطتين \lceil و \rightarrow أصغر من n (هذه هي فرضية الاستقراء). ولنبرهن أنها تصح بالنسبة لكل صيغة في α ذات العدد n لظهور الرابطتين المذكورين.

سندرس الحالتين التاليتين:

الحالة 1

α هي $\lceil \beta$ ، حيث تحتوي الصيغة β على عدد لظهور الرابطتين \lceil و \rightarrow أصغر من n .

الحالة 2

α هي $\gamma \rightarrow \beta$ حيث تحتوي كل من β و γ على عدد لظهور
الرابطين \neg و \rightarrow أصغر من n . إذن حسب فرضية الاستقراء يكون

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \gamma' \text{ و } A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \beta'$$

عند دراستنا للحالة 1 نواجه الحالتين التاليتين :

(الحالة 1 ا)

1. β صادقة حسب I، وإذن α تكون كاذبة حسب I وبالتالي β' هي β و α'

هي $\alpha \neg$. بواسطة فرضية الاستقراء المطبقة على β يكون لدينا :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \beta$$

الآن وبواسطة المبرهنة 5 ($\beta \rightarrow \neg \neg \beta$) وقاعدة الوضع يكون :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \neg \neg \beta$$

ولكن $\neg \neg \beta$ هي α' .

وهو المطلوب.

(الحالة 1 ب)

β كاذبة حسب I. وإذن α صادقة حسب I وبالتالي β' هي $\beta \neg$ و α'

هي α . بواسطة فرضية الاستقراء يكون لدينا :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \beta \neg$$

ولكن $\beta \neg$ هي α' . وهو المطلوب.

الآن، عند دراستنا للحالة 2 نواجه الحالات الثلاث التالية :

الحالة 2 أ)

β كاذبة حسب I

الحالة 2 ب)

γ صادقة حسب I

الحالة 2 ج)

β صادقة حسب I و γ كاذبة حسب I

سندرس كل من الحالات أعلاه.

الحالة 2 أ)

β كاذبة حسب I .

إذن α تكون صادقة حسب I و β' هي β و α' هي α . إذن :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \neg \beta$$

ولكن حسب المبرهنة 6 ($\beta \rightarrow \gamma$) وباستخدام قاعدة

الوضع :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \beta \rightarrow \gamma$$

ولكن $\beta \rightarrow \gamma$ هي α' .

وهو المطلوب.

الحالة 2 ب)

γ صادقة حسب I .

إذن α تكون صادقة حسب I وإذن γ هي γ' و α' هي α . إذن :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \gamma$$

ولكن $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \gamma$ حسب شكل البديهية (A_1) وباستخدام قاعدة الوضع :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \beta \rightarrow \gamma$$

ولكن $\beta \rightarrow \gamma$ هي α' .

وهو المطلوب.

(الحالة 2ج)

β صادقة حسب I و γ كاذبة حسب I .

إذن α تكون كاذبة حسب I و β' هي β و γ' هي $\neg \gamma$ و α' هي $\neg \alpha$. إذن :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \beta \quad \text{و}$$

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \neg \gamma$$

ولكن $(\neg \gamma \rightarrow \neg(\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow \beta$ (حسب المبرهنة 9) وباستخدام

قاعدة الوضع :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \neg(\beta \rightarrow \gamma)$$

ولكن $\neg(\beta \rightarrow \gamma)$ هي α' .

وهو المطلوب.

إذا كانت أية صيغة α من النسق P تكرارية فإنها تكون مبرهنة في النسق P.

رمزيا نكتب هذه المبرهنة على الشكل : $\models \alpha \rightarrow \vdash \alpha$

البرهان

لتكن α صيغة تكرارية ولتكن A_1, A_2, \dots, A_k هي المتغيرات القضائية التي تظهر في α . من أجل أي تعيين لقيم صدق A_1, A_2, \dots, A_k فإنه حسب المسألة 1 يكون لدينا $\vdash \alpha$ (α' هي α) $A'_1, A'_2, \dots, A'_k \vdash \alpha$ ذلك أن α تأخذ دائما القيمة T. وهكذا فعندما يعطي A'_k القيمة T فإننا نحصل على α $A'_1, A'_2, \dots, A'_{k-1}, A_k \vdash \alpha$ وعندما يعطي A'_k القيمة F فإننا نحصل على α $A'_1, A'_2, \dots, A'_{k-1}, \neg A_k \vdash \alpha$. وإننا باستخدام نظرية الاستنتاج نحصل على α $A'_1, A'_2, \dots, A'_{k-1} \vdash A_k \rightarrow \alpha$ وعلى α $A'_1, A'_2, \dots, A'_{k-1} \vdash \neg A_k \rightarrow \alpha$ الآن، وحسب المبرهنة 10 $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$ وباستخدام قاعدة الوضع مرتين نحصل على :

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_{k-1} \vdash \alpha$$

وبالمثل فإن A'_{k-1} يمكن أن تكون قيمته T أو F ومرة أخرى نستخدم نظرية الاستنتاج والمبرهنة 10 بالإضافة إلى قاعدة الوضع وهكذا نستطيع

حذف A'_{k-1} كما هو الحال بالنسبة إلى A'_k . وبعد k من مثل هذه الخطوات نحصل في النهاية على α .

Consistency of system P

6.3 اتساق النسق P

نقول عن نسق ما أنه متسق إذا وفقط إذا كان من المستحيل البرهان على صيغة α وعلى نفيها $\neg \alpha$ معا فيه .
نسقنا P هو نسق متسق . وسنبرهن هذا بواسطة المبرهنة التالية :
مبرهنة : النسق P هو نسق متسق .

البرهان

نفرض أن P ليس متسق . إذن يمكننا برهان صيغة α ونفيها $\neg \alpha$ معا فيه ، أي أن α ونفي $\neg \alpha$ مبرهنتان في P . إذن حسب مبرهنة (صحة النسق) تكون α و $\neg \alpha$ صيغتان تكراريتان . وهذا مستحيل لأنه إذا كانت α تكرارية فإن $\neg \alpha$ متناقضة . إذن النسق P متسق .

7.3 أنساق صورية أخرى

بالإضافة إلى النسق الصوري الذي درسناها في هذا الفصل ، فإنه توجد أنساق صورية أخرى عديدة لا تقل أهمية عنه¹ . سنورد بعضا من هذه الأنساق باختصار وبدون برهان المبرهنات المعطاة .

1. نسق هلبيرت وأكرمان (1950)

(1) الرموز الأولية : \neg و \vee

¹ المرجع Mendelson.E- Introduction to mathematical logic, Chapman & Hall, London,1997.

يعطى التعريف التالي:

$$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta$$

الرمز \equiv الذي هو اختصار لكلمة (تعريف) يعني أن كل ما هو على يساره وعلى يمينه يمكن أن يعوض أحدهما الآخر في البرهان الصوري، أي أن أحدهما يكافئ الآخر وأن ما هو على اليسار هو اختصار لما هو على اليمين. (ب) قواعد الاشتقاق: الوضع.

(ج) أشكال البديهيات:

$(\alpha \vee \alpha) \rightarrow \alpha$	شكل البديهية A_1
$\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$	شكل البديهية A_2
$(\alpha \vee \beta) \rightarrow (\beta \vee \alpha)$	شكل البديهية A_3
$(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow (\alpha \vee \gamma))$	شكل البديهية A_4

المبرهنات

$$\alpha \rightarrow \beta \mid \neg (\gamma \vee \alpha) \rightarrow (\gamma \vee \beta) \quad (1)$$

$$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)) \quad (2)$$

$$\gamma \rightarrow \alpha, \alpha \rightarrow \beta \mid \neg \gamma \rightarrow \beta \quad (3)$$

$$\alpha \rightarrow \alpha \quad (4)$$

$$\neg \alpha \vee \alpha \quad (5)$$

$$\alpha \rightarrow \neg \neg \alpha \quad (6)$$

$$\neg \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \quad (7)$$

$$(\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \rightarrow ((\beta \vee (\alpha \vee \gamma)) \vee \alpha) \quad (8)$$

2. نسق كلين (1952)

(أ) الرموز الأولية : $\rightarrow, \vee, \wedge, \neg$

(ب) قواعد الاشتقاق : الوضع

(ج) اشكال البديهيات:

$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$	شكل البديهية A_1
$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$	شكل البديهية A_2
$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$	شكل البديهية A_3
$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$	شكل البديهية A_4
$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$	شكل البديهية A_5
$\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$	شكل البديهية A_6
$\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$	شكل البديهية A_7
$(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma)$	شكل البديهية A_8
$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha)$	شكل البديهية A_9
$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$	شكل البديهية A_{10}

توجد أنساق تتكون مجموعة بديهياتها من بديهية واحدة فقط وهي عديدة، نورد منها ما يلي:

3. نسق ميريديث (1953)

(أ) الرموز الأولية : \rightarrow, \neg

(ب) قواعد الاشتقاق : الوضع

(ج) شكل البديهية:

$$(((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg \gamma \rightarrow \neg \delta)) \rightarrow \gamma) \rightarrow \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\delta \rightarrow \alpha))$$

4. نسق نيكود (1917)

(أ) الرموز الأولية : |

(ب) قواعد الاشتقاق : من $\alpha | (\beta | \gamma)$ و α نشق γ

(ج) شكل البديهية:

$$.(\alpha | (\beta | \gamma)) | ((\delta | (\delta | \delta)) | ((\varphi | \beta) | ((\alpha | \varphi) | (\alpha | \varphi))))$$

8.3 تمارين

(أ) برهن في النسق P أن :

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \quad | \quad \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$$

حيث α, β, γ أية صيغ من P .

(ب) برهن الصيغ التالية في النسق P :

$$\frac{}{| \quad p} ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

(ج) خذ نسق لوكانتشفيفج L والذي يمتلك نفس مكونات نسقنا P ، ما عدا

أشكال البديهيات التالية :

شكل البديهية A_1

$$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

شكل البديهية A_2

$$(\bigwedge \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$$

شكل البديهية A_3

$$\alpha \rightarrow (\bigwedge \alpha \rightarrow \beta)$$

برهن كل من المبرهانت التالية في النسق L :

$$\frac{}{\vdash_L ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow \delta \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \delta)} \quad (1)$$

$$\frac{}{\vdash_L (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\delta \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma))))} \quad (2)$$

$$\frac{}{\vdash_L (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta))} \quad (3)$$

$$\frac{}{\vdash_L ((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)} \quad (4)$$

$$\frac{}{\vdash_L (\alpha \rightarrow (((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha))} \quad (5)$$

$$\frac{}{\vdash_L (\beta \rightarrow (((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha))} \quad (6)$$

$$\frac{}{\vdash_L \alpha \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)} \quad (7)$$

(د) خذ نسق راسل R أدناه.

1) الرموز الأولية : \neg, \vee

2) قواعد الاشتقاق : الوضع

التعاريف

تعريف₁

$$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta$$

تعريف₂

$$\alpha \wedge \beta \equiv \neg (\neg \alpha \vee \neg \beta)$$

تعريف₃

$$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$$

3) أشكال البديهيات :

$$(\alpha \vee \alpha) \rightarrow \alpha$$

شكل بديهية A_1

$$\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$$

شكل بديهية A_2

$$(\alpha \vee \beta) \rightarrow (\beta \vee \alpha)$$

شكل بديهية A_3

$$(\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \rightarrow (\beta \vee (\alpha \vee \gamma))$$

شكل بديهية A_4

$$(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow (\alpha \vee \gamma))$$

شكل بديهية A_5

برهن كل من المبرهنات التالية في النسق R :

$$\frac{}{\vdash_R (\alpha \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha} \quad (1)$$

$$\frac{}{\vdash_R \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)} \quad (2)$$

$$\frac{}{\vdash_R (\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \neg \alpha)} \quad (3)$$

$$\frac{}{\vdash_R (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))} \quad (4)$$

$$\frac{}{\vdash_R (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))} \quad (5)$$

$$\frac{}{\vdash_R (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))} \quad (6)$$

$$\frac{}{\vdash_R \alpha \rightarrow (\alpha \vee \alpha)} \quad (7)$$

$$\frac{}{\vdash_R \alpha \rightarrow \alpha} \quad (8)$$

$$\frac{}{\vdash_R \neg \alpha \vee \alpha} \quad (9)$$

$$\frac{}{\vdash_R \alpha \vee \neg \alpha} \quad (10)$$

$$\frac{}{\vdash_R \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha} \quad (11)$$

(هـ) برهن استقلال أشكال بديهيات النسق R .

(و) خذ نسق روصر R_0 أدناه.

(1) الرموز الأولية : \wedge, \neg

(2) قواعد الاشتقاق : الوضع

(3) أشكال البديهيات :

$\alpha \rightarrow (\alpha \wedge \alpha)$ شكل بديهية A_1

$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$ شكل بديهية A_2

$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow \neg(\gamma \wedge \alpha))$ شكل بديهية A_3

برهن كل من البمرهئات التالية في النسق R_0 :

$$\frac{}{\vdash_{R_0} \neg(\neg\alpha \wedge \alpha)} \quad (1)$$

$$\frac{}{\vdash_{R_0} \neg\neg\alpha \rightarrow \alpha} \quad (2)$$

$$\frac{}{\vdash_{R_0} \neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \neg\beta)} \quad (3)$$

$$\frac{}{\vdash_{R_0} \alpha \rightarrow \neg\neg\alpha} \quad (4)$$

$$\frac{}{\vdash_{R_0} (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \neg\beta)} \quad (5)$$

(ز) برهن استقلال الأشكال البديهية لنسق هلبرت وأكرمان.

الفصل الرابع

لغة ودلالة حساب المحمولات Language and Semantics of predicate calculus

4. 1 ضرورة توسيع لغة حساب القضايا

نستطيع أن نرى بسهولة، أنه في اشتقاق قضايا معينة من قضايا أخرى، أخذين بعين الاعتبار التركيب الداخلي للقضايا الذرية، فإن وسائل حساب القضايا تكون غير كافية لتبيان صحة هذا الاشتقاق. لناخذ المثال التالي.

مثال: إن صحة الاشتقاق

M_1 بعض الثعابين تكون مؤذية

M_2 كل مؤذي يكون عشبي

إن، بعض الثعابين تكون عشبية N

لا يمكن إثباته بوسائل حساب القضايا وذلك لأن المقدمات والنتيجة يتم التعامل معها على أنها وحدات غير قابلة للتجزئة وبدون الأخذ بنظر الاعتبار التركيب الداخلي لها. إن صورة هذا الاشتقاق بوسائل حساب القضايا هي

M_1

M_2

N إذن

أي أنه من M_1 و M_2 تنتج N . ولكن كيف لنا أن نعرف أن N تنتج أولا تنتج من M_1 و M_2 فعلا؟ وحيث أن تركيب المقدمات والنتيجة ليس ظاهرا في صورة الاستقاق هذه. إن تفسير هذا هو أن حساب القضايا، هنا، لا يحل القضايا الذرية بالرغم من أن القضايا الذرية ليست هي أبسط عناصر استدلالنا، لأنها تمتلك تركيبا داخليا يلعب دورا هاما في هذه الاستدلالات. أي أن صحة الحجة في المثال أعلاه تعتمد على معنى الكلمتين (بعض) و(كل) وعلى الكيفية التي ارتبطت بهما الكلمات (ثعبان)، (مؤذي)، (عشبي). نستطيع بسهولة إعطاء مثال-ضاد للاستقاق أعلاه وذلك بأخذ N كاذبة، بينما تكون كل من M_1 و M_2 صادقتين، وهكذا تكون الحجة خاطئة.

إن التركيب الداخلي للقضايا الثلاثة في المثال أعلاه تكون بين أشياء تمثل مجموعات داخل القضايا نفسها. فصورة الحجة، في المثال، يمكن توضيحها كالتالي.

بعض K تكون L

كل L تكون M

إذن بعض K تكون M

حيث K ، L ، M تمثل مجموعة من الأشياء: مجموعة كل الثعابين، مجموعة كل المؤذين ومجموعة كل العشبيين على الترتيب. سنرى لاحقا أن هذه الحجة صحيحة.

إن هذا القصور في لغة حساب هذه القضايا يدعونا إلى توسيعها إلى لغة أخرى نستطيع بواسطتها التدقيق في تركيب القضايا الذرية، وعلى وجه

التحديد تحليلها إلى ما نسميه حد ومحمول. هذه اللغة الجديدة تسمى لغة حساب المحمولات والتي تكون لغة حساب القضايا جزءا منها.

4. 2 المحمولات Predicates

في المنطق التقليدي يتم القيام بتحليل القضية الذرية إلى حد ومحمول حتى يظهر تركيبها الداخلي. فمثلا في القضية (الكندي فيلسوف عربي) يكون (الكندي) هو الحد و(فيلسوف عربي) هو المحمول. القضية هنا تؤكد بأن الكندي (يمتلك صفة) أنه (فيلسوف عربي).

إن هذا التحليل يمكن أن يكون ممكنا وكافيا فقط في الحالة التي تعكس فيها القضية صفة الحد، أما إذا كانت للقضية الذرية تعكس العلاقة بين الحدود فعندها لا يكون هذا التحليل مناسباً، حيث لا يمكن وصف القضية الذرية على الشكل: x يكون P ، حيث x الحد و P المحمول. هذا يحدث مثلا في القضية التالية: الجزائر أكبر مساحة من تونس.

في هذه الفقرة سنعالج المحمول على أنه دالة قضائية (تسمى أيضا دالة منطقية) بمتغير أو متغيرين أو أكثر بالاعتماد على ما تعكسه القضية من صفة لحد أو علاقة بين حدين أو أكثر. سميت دالة قضائية وذلك لتفريقها عن الدوال المستخدمة في الجبر، مثلا: الدوال العددية وعن الدوال المستخدمة في حساب القضايا والتي هي دوال صدق كما مر بنا في الفصل الأول.

إن هذه المعالجة لمحمولات تكون مناسبة عندما تعكس القضية صفة أو علاقة بين الحدود. سنرمز للمحمولات بالحروف الكبيرة مع فراغ واحد أو أكثر أو نرمز لها بالحروف الكبيرة مع متغير واحد أو أكثر لتشمل هذا

الفراغ. لنأخذ المثال: x عدد زوجي أو (...عدد زوجي). هذه ليست قضية لأنه لا يمكن القول أنها صادقة أو كاذبة. إنها دالة قضائية وتصبح هذه القضية صادقة أو كاذبة عندما يتم تعويض المتغير بعدد طبيعي أو نستبدل النقاط بعدد طبيعي. هذه الدالة القضائية تسمى أيضا محمولا أحاديا ويرمز له بواسطة P_x وذلك باستخدام رمز الدالة P والمتغير x المعروف على مجموعة الأعداد الطبيعية. وهكذا، فإننا بواسطة P_6 نرمز إلى القضية الصادقة (6 عدد زوجي). ونرمز بواسطة P_9 إلى القضية الكاذبة (9 عدد زوجي). إن المحمول P_x يصبح قضية صادقة أو كاذبة بالاعتماد على القيمة المعوض بها المتغير. مجموعة تعريف هذه الدالة القضائية (قيم x في P_x) هي مجموعة الأعداد الطبيعية N أما مستقر الدالة فهي المجموعة $\{T, F\}$. رمزيا نكتب الدالة هكذا :

بشكل عام الدالة القضائية أو المحمول P_x يجزئ مجموعة التعريف M إلى مجموعتين جزئيتين، بحيث أن كل عنصر a ينتمي إلى إحدى المجموعتين الجزئيتين تكون P_a قضية صادقة. وكل عنصر b ينتمي إلى المجموعة الثانية تكون P_b قضية كاذبة. إن عناصر المجموعة الجزئية للمجموعة M والتي نحصل بواسطتها من الدالة القضائية P_x على قضية صادقة تسمى مجموعة صدق هذه الدالة. مجموعة صدق الدالة هي المجموعة التي تهمننا عند دراسة أية دالة قضائية.

مثال

ليكن P_x رمزا للمحمول: (x عاصمة اليمن). إن صناء P يرمز إلى القضية الصادقة (صناء عاصمة اليمن)، أما طربس P فيرمز إلى القضية الكاذبة (طرابلس عاصمة اليمن). إن مجموعة تعريف هذه الدالة هي مجموعة مدن، أو إن قيم x في P_x تكون مدن. أما مجموعة صدق الدالة فتتكون من مدينة واحدة-صناء.

بشكل عام، إن مجموعة تعريف المحمول (الدالة القضائية) P_x هي المجموعة التي يمكننا اختيار عنصر منها لتعويض x . غالبا لا تذكر هذه المجموعة عندما تكون واضحة من طبيعة المحمول

في المثالين السابقين كان المحمول أحاديا وهو يعكس صفة لحد. وبتعميم مفهوم هذا المحمول نحصل على محمول (متعدد المواضع) وهو الذي يعكس عادة علاقة بين الحدود. كل علاقة هي مجموعة من الأزواج المرتبة. العلاقات: (أكبر سنا من)، (يساوي)، (أصغر من) تمثل محمولات ثنائية. ومثلا العلاقة (المحمول) $x < y$ المعرفة على المجموعة M^2 ، حيث $M = \{1, 2, 3\}$ هي مجموعة كل الأزواج المرتبة من الأعداد الطبيعية التي تكون المركبة الأولى لكل زوج أصغر من المركبة الثانية من الزوج نفسه، أي أنها المجموعة $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$.

أمثلة

لنجد الحد (أو الحدود) والمحول في كل من القضايا الذرية التالية :

(1) احمد يذهب إلى المكتبة.

الحد : أحمد، المحمول : يذهب إلى المكتبة.

(2) أكبر كرة في حانوت علي هي حمراء.

الحد : أكبر كرة في حانوت علي، المحمول : هي حمراء.

(3) هو يكون رياضي.

الحد : هو، المحمول : رياضي.

(4) x عدد طبيعي.

الحد : x ، المحمول : عدد طبيعي.

(5) مشتقة الدالة f معرفة.

الحد : مشتقة الدالة f ، المحمول : معرفة.

$$(6) 2 < 5$$

الحدود : 5 و 2، المحمول : <

الأسماء، كما في (1) والضمانر، كما في (3)، والمتغيرات كما في (4)

وكذلك الأوصاف، كما في (2) والدوال، كما في (5) والثوابت كما في (6)

تسمى حدودا. وبما أننا عاملنا الضمير معاملة المتغير والأسماء معاملة

الثوابت فيمكننا إعطاء تعريفا أكثر دقة للحد وهو : الثوابت والمتغيرات

والدوال تسمى حدودا.

في المثال (1) يمتلك أحمد صفة أنه (يذهب إلى المكتبة). وفي (2)

نجد أن أكبر كرة في حانوت علي تمتلك صفة أنها حمراء. كذلك نجد

الصفات : رياضي، عدد طبيعي، معرفة، وهذه كلها محمولات أحادية. أما

العلاقة $<$ في (6) فتمثل محمولا ثنائيا يربط الحدين 2 و 3. ويمكن تطبيق

محمولات أخرى على حدين أو أكثر مثل : أكبر سنا من، أنكى من، وهذان

محمولان ثنائيان. أما العلاقة (بين) فتمثل محمولا ثلاثيا لأنه يربط ثلاثة حدود مثل : تونس بين الجزائر وليبيا، وكذا النقطة A بين النقطتين B و C.

4.3 العمليات على المحمولات Operations on Predicates

لقد بينا في الفقرة السابقة بأن المحمولات هي دوال قضائية وأنها تأخذ قيم الصدق T وقيم الكذب F وهكذا يمكننا تطبيق العمليات التي استخدمناها في حساب القضايا: \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow على المحمولات وبذلك نكون من المحمولات الذرية (وهي المحمولات التي لا يمكن تجزئتها إلى محمولات أخرى) محمولات أخرى مركبة.

1. النفي

ليكن P_x محمولا مجموعة تعريفه M (نقول أيضا معرفة على M). إذن نفي P_x ونرمز له $\neg P_x$ يصبح قضية صادقة من أجل قيم x من M التي يصبح من أجلها P_x قضية كاذبة. إذن تكون مجموعة قيم صدق $\neg P_x$ متممة (مكملة) مجموعة صدق P_x بالنسبة إلى المجموعة M. أي أن

$$\{x : \neg P_x\} = \overline{\{x : P_x\}}$$

2. الوصل

ليكن P_x , Q_x محمولين معرفين على المجموعة M. يمكننا تعريف الوصل $P_x \wedge Q_x$ المعرف على M. الوصل $P_x \wedge Q_x$ يصبح قضية صادقة لكل قيم x من M التي يصبح من أجلها كل من المحمولين P_x و Q_x قضية صادقة أي أن

$$\{x : P_x \wedge Q_x\} = \{x : P_x\} \cap \{x : Q_x\}$$

مجموعة قيم صدق تعريف الوصل $P_x \wedge Q_x$ هي تقاطع مجموعتي صدق المحمولين P_x و Q_x .

3. الفصل

ليكن P_x ، Q_x محمولين معرفين على المجموعة M . يمكننا تعريف الفصل $P_x \vee Q_x$ المعرف على M . الفصل $P_x \vee Q_x$ يصبح قضية صادقة لكل قيم x من M التي يصبح من أجلها على الأقل أحد المحمولين P_x و Q_x قضية صادقة أي أن

$$\{x : P_x \vee Q_x\} = \{x : P_x\} \cup \{x : Q_x\}$$

4. الاستلزام

ليكن P_x ، Q_x محمولين معرفين على المجموعة M . يمكننا تعريف الاستلزام $P_x \rightarrow Q_x$ المعرف على M . الاستلزام $P_x \rightarrow Q_x$ يصبح قضية كاذبة لكل قيم x من M التي يصبح من أجلها P_x قضية صادقة و Q_x يصبح قضية كاذبة. جميع قيم x الأخرى من M يصبح من أجلها $P_x \rightarrow Q_x$ قضية صادقة. المحمول $\neg P_x \vee Q_x$ يأخذ نفس قيم الصدق من أجل قيم x هذه (المحمول $\neg P_x \vee Q_x$ يصبح قضية كاذبة لقيم x التي من أجلها P_x صادقة و Q_x وكاذبة ويصبح قضية صادقة من أجل القيم الباقية إلى x من M). وهكذا يكون

$$(P_x \rightarrow Q_x) \Leftrightarrow (\neg P_x \vee Q_x)$$

و

$$\begin{aligned}\{x : P_x \rightarrow Q_x\} &= \{x : \neg P_x \vee Q_x\} = \{x : \neg P_x\} \cup \{x : Q_x\} \\ &= \overline{\{x : P_x\}} \cup \{x : Q_x\}\end{aligned}$$

5. الاستلزام الثنائي

ليكن P_x ، Q_x محمولين معرفين على المجموعة M . يمكننا تعريف الاستلزام الثنائي $P_x \leftrightarrow Q_x$ المعرف على M . الاستلزام الثنائي $P_x \leftrightarrow Q_x$ يصبح قضية صادقة لكل قيم x من M التي يصبح من أجلها P_x و Q_x كليهما قضيتين صادقتين أو يصبح كليهما قضيتين كاذبتين. بما أن

$$(P_x \leftrightarrow Q_x) \Leftrightarrow (P_x \rightarrow Q_x) \wedge (Q_x \rightarrow P_x)$$

إذن نحصل على :

$$(P_x \leftrightarrow Q_x) \Leftrightarrow (\neg P_x \vee Q_x) \wedge (\neg Q_x \vee P_x)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P_x \wedge \neg Q_x) \vee (P_x \wedge Q_x)$$

وبالتالي يكون :

$$\begin{aligned}\{x : P_x \leftrightarrow Q_x\} &= \overline{(\{x : P_x\} \cup \{x : Q_x\})} \cap (\{x : Q_x\} \cup \{x : P_x\}) \\ &= (\overline{\{x : P_x\}} \cap \overline{\{x : Q_x\}}) \cup (\{x : P_x\} \cap \{x : Q_x\})\end{aligned}$$

Quantifiers

4. 4 الكمّمات

سنقوم بإجراء عمليتين على المحمولات حيث نحولها إلى قضايا. العملية الأولى هي للتكميم الكلي (الشمولي) وعملية التكميم الوجودي (الجزئي). لناخذ المحمول P_x . من الممكن أن تمتلك الصفة P جميع العناصر

التي تنتمي إلى المجموعة المعرف عليها هذا المحمول أو على الأقل بعض هذه العناصر.

(1) إذا كانت الصفة P تمتلكها جميع العناصر التي تنتمي إلى المجموعة المعرف عليها P ، فإن القضية لكل x ، P_x تكون صادقة.

(2) إذا كانت الصفة P يمتلكها بعض العناصر التي تنتمي إلى المجموعة المعرف عليها P ، فإن القضية بعض x ، P_x تكون صادقة.

يرمز للتعبير (لكل x)، (مهمل x)، (جميع x)، (لأي x) بواسطة: $(\forall x)$ ويسمى المكتم الكلي. ويرمز للتعبير (بعض x)، (يوجد x)، (يوجد على الأقل x) بواسطة: $(\exists x)$ ويسمى المكتم الوجودي. إن تركيب قضية المكتم الكلي تكون عادة على الشكل $(\forall x) (\dots \rightarrow \dots)$ ، أما تركيب قضية المكتم الوجودي فتكون عادة على الشكل $(\exists x) (\dots \wedge \dots)$.

إذا تكونت مجموعة التعريف M للمحمول P_x من عنصر واحد a ، أي أن $M = \{a\}$ فإن $(\forall x) P_x$ يكافئ P_a ، أي أن:

$$(\forall x) P_x \Leftrightarrow P_a$$

أما إذا كانت $M = \{a_1, a_2\}$ فإن القضية $(\forall x) P_x$ تكافئ $P_{a1} \wedge P_{a2}$ ، أو أن:

$$(\forall x) P_x \Leftrightarrow P_{a1} \wedge P_{a2}$$

إذا كانت M نهائية وتتكون من k من العناصر، أي أن:

$$M = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \text{ فإن}$$

$$(\forall x) P_x \Leftrightarrow P_{a1} \wedge P_{a2} \wedge \dots \wedge P_{ak}$$

وباختصار نكتب:

$$(\forall x)P_x \Leftrightarrow \bigwedge_{i=1}^k P_{a_i} \quad (1)$$

إذا تكونت مجموعة التعريف M للمحمول P_x من عنصر واحد a ، أي أن $M = \{a\}$ فإن القضية $(\exists x)P_x$ تكافئ P_a ، أي أن:

$$(\exists x)P_x \Leftrightarrow P_a$$

أما إذا كانت $M = \{a_1, a_2\}$ ، فإن القضية $(\exists x)P_x$ تكافئ $P_{a_1} \vee P_{a_2}$. وإذا كانت M نهائية وتتكون من k من العناصر، أي أن: $M = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ فإن

$$(\exists x)P_x \Leftrightarrow P_{a_1} \vee P_{a_2} \vee \dots \vee P_{a_k}$$

وباختصار نكتب :

$$(\exists x)P_x \Leftrightarrow \bigvee_{i=1}^k P_{a_i} \quad (2)$$

4. 5 اللغة الرمزية والترجمة لحساب المحمولات

لقد بيّنا في بداية هذا الفصل الحاجة لتوسيع حساب القضايا إلى حساب المحمولات. وبعبارة أخرى فإن حساب المحمولات يمثل توسيعاً لحساب القضايا. وبهذا تكون لغة حساب القضايا جزءاً من لغة حساب المحمولات. وعليه، فإن هذه الأخيرة ستشمل رموزاً جديدة بالإضافة إلى رموز لغة حساب القضايا. وهكذا فاللغة الرمزية لحساب المحمولات تتكون من:

(1) الحروف الكبيرة A, B, C, \dots وهذه الحروف مع دلالتها $A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots$ للتعبير عن متغيرات المحمولات.

(2) الحروف f, g, h, \dots وهذه الحروف ودلالتها للتعبير عن الدوال.

(3) رموز الروابط $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.

- (4) الأقواس (،) وهي قوس الإغلاق وقوس الفتح على الترتيب.
- (5) الحروف الصغيرة a, b, c, \dots وهذه الحروف ودلائلها $a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots$ للتعبير عن الحدود التي هي ثابت والحروف الصغيرة x, y, z للتعبير عن الحدود التي هي متغيرات.
- (6) المكمان \exists, \forall .

إن الترجمة من اللغة العربية العادية إلى لغة حساب المحمولات لا تخضع لقواعد معينة وإنما يتوجب علينا فهم معنى القضية باللغة العربية ومن ثم نعيد التعبير عن هذا المعنى باستخدام رموز حساب المحمولات. ولتوضيح كيفية القيام بهذه الترجمة يجب أولاً تعيين الحدود والمحمولات. وكما مر بنا سنقوم بترميز الحدود باستخدام الحروف الصغيرة وبترميز المحمولات بالرموز الكبيرة، وحيث نكتب رمز المحمول على يسار رمز الحد أو الحدود. الآن سنعطي أمثلة عديدة ومختلفة لممارسة الترجمة إلى لغة حساب المحمولات.

(1) أحمد يعمل محامياً.

الحد: أحمد- a ، المحمول: x يعمل محامياً- M_x .

الترجمة: M_a .

(2) أحمد لا يعمل محامياً.

الترجمة: $\neg M_a$ (باستخدام نفس الرموز في (1)).

(3) هو يعمل محامياً.

الحد: هو- x ، المحمول: x يعمل محامياً- M_x .

الترجمة: M_x .

(4) x عدد زوجي.

الحد: $x-x$ ، المحمول: x عدد زوجي- E_x .

الترجمة: E_x .

(5) أحمد وعلي محاميان.

الحد الأول: أحمد- a ، الحد الثاني: علي- b ، المحمول: x محامي- M_x .

الترجمة: $M_a \wedge M_b$.

(6) أحمد يكون محاميا أو رياضيا.

الحد: أحمد- a ، المحمول الأول: x يكون محاميا- M_x ، المحمول الثاني: x

يكون رياضيا- N_x .

الترجمة: $M_a \vee N_a$.

(7) إذا كان سالم محاميا فإنه لن يكون طبييا.

الحد: سالم- a ، المحمول الأول: x محاميا- M_x ، المحمول الثاني: x طبييا-

R_x .

الترجمة: $M_a \rightarrow R_a$

(8) يكون سالم محترما إذا فقط إذا كان صادقا.

الحد: سالم- a ، المحمول الأول: x يكون محترما- L_x ، المحمول الثاني: x

يكون صادقا- R_x .

الترجمة: $L_a \leftrightarrow R_a$.

(9) $x > y$

الحد الأول: x ، الحد الثاني: y ، المحمول: $C_{xy} - x > y$.
الترجمة: C_{xy} .

(10) كل المعادن ناقلة للحرارة.

كما ذكرنا سابقا يمكن ان نكتب هذه القضية على الشكل:
كل N تكون L

وبما أنه لم يذكر اسم لمعدن معين، فسنستخدم المتغير x ليعبر عن أي معدن،
وبذلك يمكننا كتابة القضية كما يلي:

كل x ، إذا كان x معدن فإن x يكون ناقلا للحرارة.

والآن عوضا عن (كل x) نكتب الرمز $(\forall x)$. المحمول الأول: x يكون
معدن- L_x ، المحمول الثاني: x ناقلا للحرارة- Z_x .

الترجمة: $(\forall x) (L_x \rightarrow Z_x)$

(11) بعض التجار جشعون.

يمكننا أن نكتب هذه القضية على الشكل:

بعض C يكون G .

بما أنه لم يذكر اسم لتاجر معين، فسنستخدم المتغير x ليعبر عن أي تاجر.
وبذلك يمكننا كتابة القضية كما يلي:

بعض x ، x يكون C_x و x يكون G_x (حيث C_x هو المحمول: x يكون تاجر،
 G_x هو المحمول: x يكون جشع).

والآن عوضا عن (بعض x) نكتب الرمز $(\exists x)$.

الترجمة: $(\exists x) (C_x \wedge G_x)$.

(12) لا دلفين يكون سمكا.

هذه القضية يمكن ترجمتها بإحدى القضيتين التاليتين:

(1) كل x ، إذا كان x دلفين فإن x لا يكون سمك.

إذا رمزنا للمحمول: x يكون دلفين بواسطة D_x ورمزنا للمحمول x يكون

سمكا بواسطة F_x ، نستطيع بذلك ترجمة القضية هكذا:

الترجمة: $(\forall x) (D_x \rightarrow \neg F_x)$

(2) لا يوجد x ، بحيث أن x يكون دلفين و x يكون سمك.

الترجمة: $\neg(\exists x) (D_x \wedge F_x)$

إن هذا المثال يقودنا إلى توضيح العلاقة بين المكمنين الكلي والوجودي كما

يلي : إذا قلنا (ليست كل الطيور تطير) فمن المعروف أن هذه القضية صادقة

وذلك لوجود طيور مثل : النعامة و طائر البطريق لا يطيران، أي أننا نقرر

صدق القضية (يوجد طير لا يطير). سنترجم هتين القضيتين المتكافئتين :

(1) $\neg(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$

(2) $(\exists x) (K_x \wedge \neg L_x)$

حيث K_x : x طير، L_x : x هي يطير.

وللمقارنة بينهما سنحول الأولى إلى :

(3) $\neg(\forall x) (\neg K_x \vee L_x)$

وذلك بتطبيق قاعدة الاستلزام على الصيغة الشرطية في (1). الآن وبتطبيق

قانون دي مورغان نحصل على :

(4) $\neg(\forall x) \neg(K_x \wedge \neg L_x)$

وهذه الأخيرة تشبه (2) ولكن مع $\lceil (\forall x) \lceil \alpha \rceil$ عوضا عن $(\exists x)$ ، أي أن

$$\lceil (\forall x) \alpha \rceil \Leftrightarrow (\exists x) \lceil \alpha \rceil (1)$$

حيث α أية صيغة.

كذلك فإن :

$$\lceil (\exists x) \alpha \rceil \Leftrightarrow (\forall x) \lceil \alpha \rceil (2)$$

$$(\forall x) \alpha \Leftrightarrow \lceil (\exists x) \lceil \alpha \rceil \rceil (3)$$

$$(\exists x) \alpha \Leftrightarrow \lceil (\forall x) \lceil \alpha \rceil \rceil (4)$$

(13) جميع الطلبة الذين يمارسون الرياضة يكونون أقوياء البنية.

يمكننا كتابة القضية كما يلي:

مهما يكن x ، إذا x طالب و x يمارس الرياضة فإن x يكون قوي البنية.

$$\text{الترجمة: } (\forall x) ((S_x \wedge R_x) \rightarrow H_x)$$

حيث S_x : x يكون طالب، R_x : x يمارس الرياضة، H_x : x قوي البنية. ويمكن

$$\text{كتابة هذه القضية كالتالي: } (\forall x) (S_x \rightarrow (R_x \rightarrow H_x))$$

استخدمنا هنا قاعدة (الاستيراد-التصدير).

(14) ليس كل ما نفضله نحصل عليه. ليكن: x يكون شخصا- P_x ، x يفضل

$$L_{xy}$$
، x يحصل على y - R_{xy} . يمكننا كتابة القضية كما يلي:

ليس كل x ، إذا كان x شخصا، فإنه لكل شيء y إذا كان x يفضل y فإن x

يحصل على y .

$$\text{الترجمة: } \lceil (\forall x) (P_x \rightarrow (\forall y) (L_{xy} \rightarrow R_{xy})) \rceil$$

(15) مشتقة الدالة f معرفة.

الحدود :

$f : f$ ، $g(x) : g(x)$ مشتقة x

المحمولات :

$Kx : x$ معرف

الترجمة : $K_{g(n)}$

(16) أكبر كرة في حانوت علي حمراء

الحدود :

أكبر كرة في حانوت علي : a

المحمولات :

$K_x : x$ حمراء

الترجمة :

K_a

إن المكمم الجزئي \exists يعني، في حساب المحمولات، أنه يوجد على الأقل واحد يمتلك الصفة K . ولكن، كيف يمكننا التعبير عن (على الأقل اثنين يمتلكان الصفة K) ؟. يمكننا استخدام مكممين جزئيين، ولكن هذا لا يكفي لأن $(\exists x)(\exists y)(Kx \wedge Ky)$ لا تستبعد إمكانية أن يكون x و y يمثلان نفس الشيء. للقول أنه يوجد على الأقل اثنين، نحن نحتاج إلى القول أنه يوجد شيء x وشيء آخر مختلف y والاثنان يمتلكان الصفة K . نستطيع أن نقول أن x يختلف عن y بواسطة كتابة $x \neq y$. وبالتالي، فإن الترجمة الصحيحة

تصبح $(\exists x)(\exists y)(Kx \wedge Ky \wedge x \neq y)$. وبشكل مماثل نعبر عن وجود على الأقل ثلاثة تمتلك الصفة K :

$$(\exists x)(\exists y)(\exists z)(Kx \wedge Ky \wedge Kz \wedge x \neq y \wedge y \neq z \wedge x \neq z)$$

وهكذا.

يمكننا أيضا ترجمة قضايا تحوي (على الأكثر n). فمثلا، إذا أردنا القول أنه يوجد فرد خارق للقوة على الأكثر وهذا ينص على عدم وجود أكثر من فرد خارق للقوة. وبالتالي فهو نفي إلى : يوجد اثنان خارقا للقوة على الأقل، وهكذا يمكننا أن نقوم بنفي صيغة من النوع الذي مر بنا أعلاه فنحصل على :

$$\neg(\exists x)(\exists y)((Kx \wedge Ky) \wedge x \neq y)$$

وهذه تكافئ :

$$(\forall x)(\forall y)((Kx \wedge Ky) \rightarrow x = y)$$

والتي تنص على أنه : من أجل كل x وكل y، إذا كان x وy خارقا للقوة فإن x هو y. إنها تنص على أن جميع خارقي القوة هم الفرد نفسه تماما. ولكن هذا يعني أنه يوجد على الأكثر فرد خارق للقوة.

وبالمثل نعبر عن القضية : يوجد على الأكثر اثنين خارقي القوة وذلك باعتبارها نفي إلى يوجد على الأقل ثلاثة خارقي القوة، فنحصل على :

$$\neg(\exists x)(\exists y)(\exists z)(Kx \wedge Ky \wedge Kz \wedge x \neq y \wedge y \neq z \wedge x \neq z)$$

وهذه تكافئ :

$$\neg(\forall x)(\forall y)(\forall z)((Kx \wedge Ky \wedge Kz) \rightarrow x = y \vee y = z \vee y = z)$$

والتي تنص على أنه، إذا كان x و y و z جميعهم خارجي القوة فإن اثنين منهم يجب أن يكونا الفرد نفسه.

كذلك، يمكننا ترجمة قضايا تحوي (n تماما، $n = 0, 1, \dots$). وبما أن القضية: يوجد n تماما يمتلك الصفة K ، مكافئة إلى وصل يوجد على الأقل n يمتلك الصفة K ويوجد على الأكثر n يمتلك الصفة K ، فيمكننا القيام بالترجمة، وذلك بربط الترجمتين المذكورتين أعلاه. ولكن، هنالك طريقة أسهل، فإذا أردنا القول بوجود قمر واحد تماما، فإننا نقول بأنه يوجد قمر وأي شيء يكون قمر يكون مطابقا له. وإذا أردنا القول بوجود رياضيين اثنين عربيين ممتازين، فإننا نقول بأنه يوجد على الأكثر اثنين وكل رياضي عربي ممتاز آخر يجب أن يكون مطابق إلى الأول أو الثاني.

سندرس أدناه الترجمات من هذا النوع حسب قيم n :

$$n = 0 \quad (1) \quad (\forall x) \neg Kx$$

$$n = 1 \quad (2) \quad (\exists x) (\forall y) ((Kx \wedge Ky) \rightarrow x = y)$$

$$n = 2 \quad (3) \quad (\exists x) (\exists y) (\forall z) (Kx \wedge Ky \wedge x \neq y \wedge (Kz \rightarrow (z = x \vee z = y)))$$

وهكذا.

4. 6 قواعد بناء الصيغ

تعريف: إذا كان P محمولا ذو n موضع وكانت a_1, a_2, \dots, a_n هي n

من الحدود، فإن $P_{a_1 a_2 \dots a_n}$ يسمى صيغة ذرية.

مثال: البصرة تقع إلى الجنوب من بغداد

الحدود : البصرة- b ، بغداد- d .

المحمول: x إلى الجنوب من y : P_{xy} .

الترجمة: P_{bf} . هذه صيغة ذرية.

سنبنى الآن الصيغ في حساب المحمولات حسب القواعد الأربعة التالية:

(1) الصيغة الذرية تكون صيغة.

(2) إذا كانت α_1, α_2 صيغتان فإن:

$\neg \alpha_1, (\alpha_1 \wedge \alpha_2), (\alpha_1 \vee \alpha_2), (\alpha_1 \rightarrow \alpha_2), (\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2)$ تكون صيغ.

(3) إذا كان x متغير و α صيغة فإن:

$(\forall x) \alpha, (\exists x) \alpha$

تكون صيغتان.

(4) أي تتابع آخر من الرموز لا يكون صيغة.

الكثير من المناطقة يستخدمون مصطلح (الصيغة الجيدة التكوين) مقابل

(الصيغة) الذي استخدمناه نحن من أجل الاختصار.

4.7 شجرة الصيغة

لقد حصلنا على الصيغ انطلاقاً من الصيغة الذرية وهكذا نستطيع إنشاء

شجرة الصيغة التي تبين كيفية الحصول على الصيغة انطلاقاً من الصيغة


الذرية التي تقع على مستوى (1). كل مستوى أعلى من (1) يتم الحصول

عليه من المستويات التي تسبقه بواسطة الجزء (2) أو (3) من قواعد بناء

الصيغ أعلاه.

مثال: شجرة الصيغة $(\exists x) (M_x \wedge (\forall y) (L_y \rightarrow K_{xy}))$

تكون كما يلي:



8.4 المتغيرات الحرة والمتغيرات المقيدة Free and Bound Variables

ذكرنا سابقا بأن تكميم المحمولات يحولها إلى قضايا. إن أدوات التكميم \exists ، \forall تؤثر على متغيرات المحمولات.

تعريف: نطاق مكمم في صيغة ما هو المكمم نفسه مع أقصر صيغة تلي المكمم مباشرة.

أمثلة على نطاق المكمم $(\forall x)$

$$(\forall x) (M_x \rightarrow (\forall y)(R_y \rightarrow \neg H_{xy})) \quad (1)$$

$$(\forall x) R_x \rightarrow (\forall y)(R_y \rightarrow M_{xy}) \quad (2)$$

نطاق المكمم الكلي في (1) هو (1) كلها، أما النطاق في (2) فهو $(\forall x) R_x$.

تعريف: يسمى المتغير x في صيغة ما مقيدا إذا وفقط إذا كان ضمن نطاق المكتم ($\forall x$) أو ($\exists x$) وإذا لم يكن كذلك في حالة واحدة على الأقل فيسمى المتغير x حرا.

المتغيران x و y في المثال (1) مقيدان. المتغير x مقيد وحر في المثال (2)، أما المتغير y فمقيد.

مثال

(1) المتغير x في $(\exists x) P_{xy}$ مقيد أما y فحر.

(2) في الصيغة $(\forall x) (x > y) \vee (\exists x) (x < 1)$ المتغير x مقيد لأنه مرة ضمن نطاق المكتم ($\forall x$) ومرة ضمن نطاق المكتم ($\exists x$).

تعريف: تسمى الصيغة قضية إذا لم تمتلك أية متغيرات حرة.

9.4 دلالة حساب المحمولات

إن دلالة حساب المحمولات معنية بكيفية بلوغ الصيغ - كما في حساب القضايا - قيم صدقها بالاعتماد على دلالة أجزائها المركبة لها. ولكن، بما أن هذه الأجزاء يمكن أن تكون متغيرات محمولات، ثوابت أو متغيرات، فإننا لن نكون قادرين، هنا، على أن نقيد أنفسنا بقيم صدق عندما يتعلق الأمر باللغات التفسيرية لحساب المحمولات. الصيغ هنا يجب أن تزول إلى تفسيرات متغيرات المحمولات والثوابت وأي شيء آخر يظهر في هذه الصيغ.

1.9.4 تفسير الصيغ في حساب المحمولات

أولا : تفسير الصيغ ذات المتغيرات المقيدة

لنأخذ الصيغة الوجودية :

$$(1) \quad (\exists x) (K_x \wedge L_{x,a})$$

لا يمكننا القول بصدق أو كذب هذه الصيغة قبل أن نفسر رموزها.

هنا يجب :

(1) تفسير مجموعة القيم التي يأخذها المتغير x ، وسنسميها المجموعة الشاملة. وبما أن الصيغة الوجودية تعني بالنسبة لنا أنه يوجد شيء ما، فإننا بواسطة تفسير المجموعة الشاملة إنما نفسر ماذا يمكن أن يعني هذا الشيء : أعداد، بشر، أشجار، دوال، أطباء، وهكذا.

(2) تفسير ماذا تعني رموز الممولات، الثوابت، رموز الدوال (إن وجدت) في المجموعة الشاملة. وهكذا فإن تفسير الصيغة (1) يكون على الشكل :

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, a_1)$$

حيث أن M_1 هي المجموعة الشاملة (مجموعة غير خالية)،

K_1, L_1, a_1 هي تفسيرات إلى K, L, a على الترتيب .

الآن ليكن M_1 هو مجموعة الأعداد الحقيقية R ، $K_1 x : x$ عدد صحيح، $L_1 xy$:

$x > y$ ، $a_1 : 0$. وهكذا فإن تفسير الصيغة (1) في O_1 يكون القضية :

(2) بعض الأعداد الحقيقية تكون صحيحة وموجبة.

من الواضح أن القضية (2) صادقة في O_1 (خذ مثلا 5 عدد حقيقي صحيح

وموجب). ولكننا إذا أخذنا تفسير آخر :

$$O_2 = (M_1, K_2, L_1, a_1)$$

نلاحظ أن المجموعة الشاملة M_1 ، وكذلك L_1 ، a_1 بقيت على حالها بينما غيرنا K_1 إلى K_2 حيث أن K_2x : x سالب. وإذن تفسير الصيغة (1) في O_2 يكون القضية :

(3) بعض الأعداد الحقيقية تكون سالبة وموجبة.

من الواضح أن (3) هنا كاذبة.

إن تفسير صيغة في حساب المجموعات هو تعميم لتعيين قيم الصدق للمتغيرات القضاية للصيغة في حساب القضايا. لناخذ الصيغة الكلية (المكتمة كليا) التالية :

$$(4) (\forall x) ((Kx \wedge Lx) \rightarrow Nxf(a))$$

تفسير الصيغة (4) يأخذ الشكل التالي :

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, N_1, f_1, a_1)$$

(f_1 هو تفسير للدالة f). لناخذ التفسيرات التالية :

M_1 : مجموعة الأعداد الصحيحة

K_1x : x موجب

L_1x : x زوج

N_1xy : $y < x$

a_1 : 0

$f_1(x)$: $x + 1$

وإذن، فإن تفسير الصيغة (4) في O_1 يصبح القضية :

(5) كل عدد صحيح زوجي موجب يكون أكبر من 1

و من الواضح أن (5) هنا صادقة.

سنستبدل O_1 بتفسير آخر O_2 حيث

$$O_2 = (M_1, K_1, L_1, N_1, f_1, a_2)$$

نلاحظ أن الفرق بين O_1 و O_2 هو التغيير من a_1 إلى a_2 فقط، وليكن a_2 :

6. الآن يصبح تفسير (4) في O_2 القضية :

(6) كل عدد صحيح زوجي موجب يكون أكبر من 7

ومن الواضح أن (6) هنا كاذبة.

ثانيا : تفسير الصيغ ذات المتغيرات الحرة

لنأخذ الصيغة :

$$(7) K_{xa} \rightarrow (\exists y) L_{f(x,y)b}$$

المتغير x في هذه الصيغة حر. إن تفسير الصيغة (7) يكون على

الشكل التالي :

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, N_1, f_1, a_1, b_1)$$

نلاحظ أن L_1 ، K_1 ، M_1 محمولين ثنائيين على M_1 ، f_1 دالة ذات

متغيرين (أي أن $f_1 : M_1 \times M_1 \rightarrow M_1$) والثابتين a_1 و b_1

عنصرين من M_1 . سنعطي الآن تفسيرا إلى (7).

لتكن M_1 هي مجموعة الأعداد الحقيقية R ، $K_{1,xy} : x < y$ ، $L_{1,xy} : x = y$:

$$.1 = b_1 , 2 = a_1 , f_1(x,y) = x \cdot y , x = y$$

إذا قمنا بتفسير الصيغة (7) بدون إعطاء أي تفسير إلى x فإنها تؤول

إلى ما يلي :

(8) إذا كانت $x > 2$ فإنه يوجد حقيقي y بحيث أن $x \cdot y = 1$.

أو أن

(9) إذا كنت $x > 2$ فإن x تمتلك نظير ضربى.

(8) (والمكافئة لها (9)) تكون صادقة أحيانا وكاذبة أحيانا أخرى. فإذا كانت

$x = 4$ فإن (8) تكون صادقة لأنه يوجد عدد حقيقي $y = -\frac{1}{4}$ حيث أن x

$y = 1$ و (8) صادقة أيضا عندما $x = 3$ لأنه في هذه الحالة يكون مقدم

(8) كاذبا. ولكن إذا كانت $x = 0$ فإن (8) تكون كاذبة لأن مقدمها يكون

صادقا بينما تاليها كاذبا لعدم وجود عدد حقيقي y بحيث أن $y = 1 \cdot 0$.

سنعطي الآن التعريف التالي :

ليكن O_1 تفسيراً للصيغة α ولنكن α ذات n من المتغيرات الحرة

x_1, x_2, \dots, x_n ولنكن $a_1 = (a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ نونية مرتبة تنتمي إلى المجموعة

الشاملة M_1 للتفسير O_1 . نقول أن a_1 تحقق α إذا آلت α إلى قضية صادقة

في O_1 كلما فسرت α في O_1 وذلك بتفسير كل متغير حر x_i على أنه a'_i .

إن كل مما يأتي هو تفسير للصيغة (7) في O_1 :

(1) إذا كنت $2 < 4$ فإنه يوجد عدد حقيقي y بحيث أن $1 = y \cdot 4$

(2) إذا كنت $2 < 3$ فإنه يوجد عدد حقيقي y بحيث أن $1 = y \cdot 3$

(3) إذا كنت $2 < 0$ فإنه يوجد عدد حقيقي y بحيث أن $1 = y \cdot 0$

وكما ذكرنا أعلاه فإن (1) و (2) صادقتين، أما (3) فكاذبة. هنا نقول أن 4- تحقق الصيغة (7) في O_1 وكذلك بالنسبة 3، أما 0 فلا يحقق الصيغة (7) في O_1 .

التفسيرات التي مرت بنا لحد الآن كانت عددية، أي أن مداها مجموعة عددية. ولكنه ليس من الضروري أن يكون التفسير عددياً. سوف نقوم بإنشاء تفسيرات تكون مشابهة إلى جداول الصدق في حساب القضايا. لنفرض أننا نريد إيجاد تفسير تكون فيه الصيغتين

$$(1) \quad (\exists x) (K_x \wedge L_x)$$

$$(2) \quad (\exists x) (L_x \wedge N_x)$$

صادقتين، أما الصيغة

$$(3) \quad (\exists x) (K_x \wedge N_x)$$

فكاذبة.

حتى تكون (3) كاذبة في التفسير $O_1 = (M_1, K_1, L_1, N_1)$ ، فإنه يجب أن لا يوجد عنصر a_1 في M_1 بحيث يمتلك الصفة K_1 ويمتلك الصفة N_1 .

وحتى تكون كل من (1) و (2) صادقة فإنه لا يجب أن لا تكون أي من K_1 ، L_1 ، N_1 خالية (أي يجب أن توجد عناصر تنتمي إلى M_1 وتمتلك الصفات K_1 ، L_1 ، N_1). وهكذا فإن M_1 يمتلك عنصرين على الأقل.

ليكن $\{a_1, b_1\} = M_1$ ، $\{a_1\} = K_1$ ، $\{a_1, b_1\} = L_1$ ، $\{b_1\} = N_1$.

هذه الحالة يمكن وضعها على شكل جدول صدق كما يلي :

$$M_1 = \{ a_1, b_1 \}$$

	K_1	L_1	N_1
a_1	T	T	F
b_1	F	T	T

الشكل (1)

نلاحظ من الجدول أن الصيغة (1) صادقة في O_1 لأن $K_1 a_1$ و $L_1 a_1$ صادقتين. الصيغة (2) صادقة في O_1 لأن $L_1 b_1$ و $N_1 b_1$ صادقتين. ولكن الصيغة (3) كاذبة لعدم وجود $x \in M_1$ بحيث أن كل من $K_1 x$ و $M_1 x$ صادقة.

2.9.4 صدق وكذب الصيغ في حساب المحمولات

الصيغة α في حساب المحمولات تكون صادقة أو كاذبة في تفسير O_1 إلى α . ولقد قمنا في الفقرة السابقة بتوضيح كيفية تحديد صدق أو كذب الصيغ في حساب المحمولات بواسطة الأمثلة وسنقوم الآن بإعطاء تعريف التحقق¹ وكذا تعريف صدق وكذب الصيغ.

لقد مرت بنا قواعد بناء الصيغ في حساب المحمولات وهنا نذكر بأن هذه الصيغ إما أن تكون صيغ زرية، أي تتكون من متغير محمول وحدود، أو أن تكون صيغة مركبة بواسطة استخدام الروابط، أو صيغا مكمنة باستخدام المكممين بالطريقة الذي ذكرناها.

¹ - Satisfaction

أولاً : الصيغة α ذرية.

إن α ستأخذ الشكل : $Kt_1t_2\dots t_n$ حيث t_1, t_2, \dots, t_n هي n من الحدود. وليكن K_1 هو تفسير K في O_1 ولتكن t'_1, t'_2, \dots, t'_n هي تفسيرات t_1, t_2, \dots, t_n على الترتيب. إذن النونية المرتبة $a_1 = (t'_1, t'_2, \dots, t'_n)$ تحقق α في O_1 إذا وفقط إذا كان كل من t'_1, t'_2, \dots, t'_m يمتلك الصفة K_1 . في حالة عدم امتلاك α لأية متغيرات حرة، أي في حالة كون α قضية فإن تفسير α لا يعتمد على a_1 . وهكذا، فإما أن كل نونية مرتبة تحقق α أو عدم وجود نونية مرتبة تحقق α .

ثانياً : الصيغة α مركبة من الصيغتين β و γ باستخدام الروابط.

لتكن $a_1 = (a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ نونية مرتبة تنتمي إلى المجموعة M_1 الشاملة للتفسير O_1 . عندنا الحالات التالية :

1. α هي β

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a_1 لا تحقق β في O_1 .

2. α هي $\beta \vee \gamma$

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a_1 تحقق β في O_1

أو a_1 تحقق γ في O_1 .

3. α هي $\beta \wedge \gamma$

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a_1 تحقق β في O_1

و a_1 تحقق γ في O_1 .

4. α هي $\beta \rightarrow \gamma$

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a_1 لا تحقق β في O_1 أو a_1 تحقق γ في O_1 .

5. α هي $\beta \leftrightarrow \gamma$

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a_1 تحقق β و γ في O_1 أو a_1 لا تحقق β ولا تحقق γ في O_1 .

مثال

في التفسير المعرف في الشكل (2)، (a_1, c_1) تحقق Lxy ، (b_1, c_1) تحقق $Kx \vee Lxy$ ، (a_1, c_1, b_1) تحقق $Kx \rightarrow Lyz$ و (a_1, c_1, b_1) تحقق $Kx \leftrightarrow (Ky \vee Lxz)$.

ثالثاً : α هي $(\forall x) \beta$ أو $(\exists x) \beta$

لتكن $a'_1 = (a_1, a_2, \dots, a_n, b_1)$. (الصيغة β يمكن أن تمتلك x كمتغير حر . b_1 تعوض x في التفسير أدناه)

1. α هي $(\forall x) \beta$

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a'_1 تحقق β من أجل جميع $b_1 \in M_1$.

2. α هي $(\exists x) \beta$

a_1 تحقق α في التفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت a'_1 تحقق β من أجل بعض $b_1 \in M_1$.

تعريف (1)

لتكن α صيغة ذات n من المتغيرات الحرة على الأكثر، O_1 تفسير الصيغة α و M_1 هو المجموعة الشاملة إلى O_1 .

1. α تكون صادقة في O_1 إذا وفقط إذا كانت كل نونية مرتبة من العناصر المنتمية إلى M_1 تحقق α .

2. α تكون كاذبة في O_1 إذا وفقط إذا لم توجد نونية مرتبة من العناصر المنتمية إلى M_1 تحقق α .

تعريف (2)

الصيغة α تكون صحيحة كلياً¹ إذا كانت α صادقة في كل تفسير لها.
الصيغ الصحيحة في حساب المحمولات تقابل الصيغ التكرارية في حساب القضايا، الصيغ التالية هي صحيحة :

$$(\forall x)(Kx \rightarrow Lx) \rightarrow ((\exists x) Kx \rightarrow (\exists x) Lx), (\forall x)(Kx \vee \neg Kx)$$

سنعطي أمثلة توضيحية إضافية حول صدق الصيغ حيث التفسير هو نفسه كما في الشكل (2) أعلاه.

مثال (1) لناخذ الصيغة

$$(1) (\forall x)(Kx \rightarrow \neg L_{x(c)})$$

نعلم أن الصيغ المكتملة كلياً تكون صادقة في تفسير O_1 إذا وفقط إذا كانت صادقة من أجل كل العناصر x المنتمية إلى المجموعة الشاملة M_1 .
هنا عندنا 3 حالات : x هي a_1 ، b_1 أو c_1 .

¹ - Universally valid

$$a_1 = x \quad 1.$$

بما أن $L_1 a_1 a_1$ كاذبة ($a = f_1(c_1)$)، إذن $L a a$ تكون صادقة. وإذن عندما $a_1 = x$ فإن الصيغة التالية صادقة :

$$(2) \quad (Kx \rightarrow \neg L_{x f(c)})$$

$$b_1 = x \quad 2.$$

هنا الصيغة (2) تكون صادقة أيضا ذلك أن مقدمها $K_1 b_1$ يكون كاذب.

$$c_1 = x \quad 3.$$

هذه الحالة مشابهة للحالة 1 ذلك أن $L_1 c_1 a_1$ كاذبة وبالتالي تكون الصيغة (2) صادقة.

إذن الصيغة (1) صادقة في O_1 .

نستطيع الآن إعطاء التلخيص أدناه.

الصيغ المكممة كليا $\alpha (\forall x)$ تكون صادقة في تفسير O_1 إلى α إذا فقط إذا كانت α صادقة من أجل كل تفسير إلى x في O_1 .

الصيغة $\alpha (\forall x)$ تكون كاذبة في تفسير O_1 إلى α إذا فقط إذا كانت α كاذبة في تفسير O_1 من أجل تفسير ما إلى x في O_1 .

الصيغة المكممة وجوديا $\alpha (\exists x)$ تكون صادقة في تفسير O_1 إلى α إذا فقط إذا كانت α صادقة في O_1 من أجل تفسير ما إلى x في O_1 .

الصيغة المكممة وجوديا $\alpha (\exists x)$ تكون كاذبة في تفسير O_1 إلى α إذا فقط إذا كانت α كاذبة في كل تفسير إلى x في O_1 .

10.4 تمارين

- (i) ترجم إلى لغة حساب المحمولات كلا من القضايا التالية.
- (1) جميع الطلبة يتقدمون إلى الامتحانات.
- (2) بعض الأحياء نباتات وبعض النباتات مفيدة.
- (3) ليست كل المعادن ثمينة.
- (4) إذا كان بعض الطلبة أكبر سنا من أحمد فإن أحمد أكبر سنا من سالم.
- (5) بعض الأطفال الذين يذهبون إلى مدارسهم يكونون مرفوقين بأمهاتهم.
- (6) كل طبيب أكبر سنا من علي يكون أيضا أكبر سنا من بعض المرضى.
- (7) جميع الأبقار ثدييات.
- (8) ليس كل الطلبة يحتاجون إلى الراحة.
- (9) بعض النباتات ليست سامة.
- (10) بعض الطلبة يفضلون المنطق وبعض الطلبة يفضلون التاريخ.
- (11) كل طالب أكبر سنا من كريم يكون أكبر سنا من فائزة أيضا.
- (12) لا أحد أطول من نفسه.
- (13) أي طالب يحترم كل أستاذ يحترم نفسه أيضا.
- (14) بعض أصدقاء حامد فوضيون.
- (15) إذا كان بعضهم أكبر سنا من أحمد فإن جميع الطلبة أكبر سنا من علي.
- (16) سالم يحب كل شيء.
- (17) كل شيء يحب نفسه.
- (18) بعض الأشياء تحب نفسها.

- (19) إذا كان سالم يحب نفسه فإنه يحب بعض الأشياء.
- (20) إذا كان سالم لا يحب نفسه فإنه لا يحب أي شيء.
- (21) بعض الأعداد الصحيحة تكون من مضاعفات العدد 5.
- (22) كل عدد صحيح له نظير جمعي.

(ب) تَرجم كل من الصيغ التالية إلى اللغة العادية باستخدام تفسيرات الحدود والمحمولات المذكورة أدناه.

الحدود: a- أحمد، b- باسم.

المحمولات:

$x-M_{xy}$ مسألة في الامتحان y .

$x-I_x$ امتحان.

$x-R_x$ رجل.

$x-N_x$ امرأة.

$x-T_{xy}$ يحل y .

$$(1) (\exists x)(\exists y)(I_x \wedge M_{yx} \wedge T_{by}) \rightarrow (\exists z)(\exists u)(I_z \wedge M_{uz} \wedge T_{au})$$

$$(2) (\exists x)((R_x \wedge (\exists y)(\forall z)(I_z \wedge M_{yz} \rightarrow T_{xy}))$$

(ج) أنشئ شجرة كل صيغة مما يأتي مبينًا من الصيغ الذرية.

$$(1) (\forall x)(M_x \rightarrow (\exists y)(R_x \rightarrow L_{xy}))$$

$$(2) (\forall x)((\exists y)((M_{xy} \wedge K_{xyx}) \rightarrow (M_{nx} \wedge S_{nbx})))$$

$$(3) (\exists x)((\forall y)(L_x \wedge L_y \rightarrow R_{xy}) \wedge (L_x \vee R_{xy}))$$

(د) في كل من الصيغ التالية ضع خطًا تحت المتغيرات الحرة.

$$(\forall x) R_{xx} \wedge (M_x \vee L_{xy}) \quad (1)$$

$$(\exists x) (M_{xy} \wedge R_{ax} \wedge L_{ay}) \quad (2)$$

$$(\forall y) ((\exists x) M_{xy} \rightarrow L_{xy}) \quad (3)$$

$$M_x \vee L_{xy} \rightarrow (\exists x) (R_x \wedge M_x) \quad (4)$$

$$(\forall x) P_{xa} \rightarrow Q_{xa} \quad (5)$$

$$(P_x \wedge Q_{xy}) \rightarrow (\forall x) (R_x \rightarrow P_x) \quad (6)$$

(ه) جد لكل من الصيغ التالية تفسيرا تكون فيه الصيغة صادقة وتفسير آخر تكون فيه كاذبة :

$$(\forall x) ((K_x \wedge L_x) \rightarrow M_x) \quad (1)$$

$$K_a \wedge (\exists x) (K_x \wedge \neg L_x b) \quad (2)$$

$$(\exists x) (K_a \wedge \neg L_x) \wedge (\forall y) (N_{xy} \rightarrow \neg O_{xy}) \quad (3)$$

$$(\forall y) (K_x \rightarrow L_{xa}) \rightarrow (\exists y) (K_y \wedge N_y \wedge \neg L_{xy}) \quad (4)$$

$$(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \vee R_{yx}) \wedge (\forall x) (\exists y) R_{xy} \wedge (\forall y) (\exists x) \neg R_{xy} \quad (5)$$

(و) جد لكل من المجموعات الصيغ التالية تفسيرا تكون فيه الصيغة الأخيرة كاذبة وبقية الصيغ صادقة :

$$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x), (\exists y) (K_x \wedge L_x) \quad (1)$$

$$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x), \neg K_a, \neg L_a \quad (2)$$

$$(\forall x)(K_x \rightarrow \neg L_{x,b}), (\forall x)(\exists y)L_{x,y}, (\exists y)\neg L_{x,b} \quad (.$$

$$(\forall x)(\forall y)((K_x \wedge K_y) \rightarrow K f(x,y)) \quad (4$$

$$(\exists x)(K_x \wedge \neg L_x)$$

$$(\forall x)(K_x \rightarrow (\exists y)(K_y \wedge \neg L f(x,y)))$$

الفصل الخامس

Natural Deduction of الاستنتاج الطبيعي لحساب Predicate Calculus المحمولات

1.5 البراهين الصورية في حساب المحمولات

يمكن بسهولة توسيع الاستنتاج الطبيعي لحساب القضايا إلى الاستنتاج الطبيعي لحساب المحمولات. فجميع قواعد الاشتقاق في الأول تطبق في الثاني. ولكنه من أجل التعامل مع المكممين، يتم إدخال 4 قواعد اشتقاق جديدة، كما أن تعريف البرهان الصوري الذي مر بنا يصح في الاستنتاج الطبيعي أيضا.

قبل أن نعطي القواعد الأربعة الجديدة سنتوقف عند التعريف التالي:

إذا كانت α صيغة، x متغير، a حد فإن $\alpha(a/x)$ تكون صيغة ناتجة من α وذلك باستبدال كل ظهور حر للمتغير x بواسطة a .

مثال 1: لتكن α هي الصيغة $(\forall y)(M_x \rightarrow L_{xy})$. سنجد الصيغ الناتجة من α بواسطة الاستبدالات التالية: 1. $\alpha(a/x)$ ، 2. $\alpha(x/x)$.

الحل: 1. $(\forall y)(M_a \rightarrow L_{ay})$ ، 2. $(\forall y)(M_x \rightarrow L_{xy})$.

مثال 2: لتكن α هي الصيغة $(\exists y)(y > x)$. سنورد أدناه بعض الحدود ويقابل كل حد نتيجة استبدال المتغير x بهذه الحدود.

$\alpha(2/x)$ $(\exists y)(y > 2)$ 2

z	$(\exists y) (y > z)$	$\alpha (z/x)$
$2z$	$(\exists y) (y > 2z)$	$\alpha (2z/x)$
$z + 2$	$(\exists y) (y > z + 2)$	$\alpha (z + 2/x)$
$x + z$	$(\exists y) (y > x + z)$	$\alpha (x + z/x)$
y	$(\exists y) (y > y)$	$\alpha (y/x)$

الصيغة $\alpha(2/x)$ تنص على أنه يوجد عدد أكبر من 2 و $\alpha(z/x)$ تنص على أنه يوجد عدد أكبر من z . ولكن $\alpha(y/x)$ تنص أنه يوجد عدد أكبر من نفسه. عندما يتم استبدال المتغير x بواسطة y فإن y يصبح ضمن نطاق الكمم $(\exists y)$ ويصبح مقيد. وبالتالي فإن الصيغة $\alpha(y/x)$ لا تقول عن y نفس ما تقوله α عن x . هذا النوع من الاستبدال لا يستخدم في حساب المحمولات ويمكن أن يقود إلى الخطأ. الاستبدال الصحيح يكون حسب التعريف أدناه.

ليكن x ، y متغيران، α صيغة، يستبدل x بواسطة y إذا وفقط إذا أصبح كل ظهور حر للمتغير x في α ظهور حر للمتغير y في $\alpha(y/x)$. في الصيغة α ، المثال 2، لا يمكن استبدال x بواسطة y ، ولكن يمكن استبدال x بواسطة أي متغير آخر عدا y .

مثال 3 : لتكن α هي الصيغة :

$$(\forall y) (x < y) \vee (\exists z) (y = z)$$

أي من الاستبدالات التالية صحيحة إلى x : $x_1, y, z, 2x, x+y, 3+y$ ؟

الجواب :

$$x_1, z, 2x$$

1. قاعدة التكميم الكلي (تك.ك) Universal Quantification
(إضافة المكمم الكلي) (Adding a Universal Quantifier)

قاعدة التكميم الكلي (تك.ك)
 إذا كانت α صيغة، a حد، x متغير فإن $(\forall x)\alpha$ تستق من $\alpha(a/x)$.
 a يجب أن يكون عنصرا عشوائيا من مجموعة تعريف¹ المتغير x .

رمزيا نكتب: $(\forall x)\alpha \vdash \alpha(a/x)$

تخطيط القاعدة (تك.ك)

$$\frac{\alpha(a/x)}{(\forall x)\alpha}$$

إن فكرة هذه القاعدة هي أنه إذا كانت α صادقة من أجل a ، حيث أن a عنصرا عشوائيا من مجموعة التعريف، فإن α تكون صادقة من أجل كل عنصر من مجموعة التعريف. والتسمية (إضافة المكمم الكلي) تبين أن ما نفعله عند استخدام هذه القاعدة هو إضافة المكمم الكلي واستبدال الحد العشوائي بالمتغير.

2. قاعدة التكميم الوجودي (تك.و) Rule of Existential Quantification
(إضافة المكمم الوجودي) (Adding a Existential Quantifier)

¹ - مجموعة تعريف x هي المجموعة التي نختار منها الأشياء لاستبدال x بواسطتها.

قاعدة التكميم الوجودي (تك.و)

إذا كانت α صيغة، a حد، x متغير فإن $(\exists x)\alpha$ تُشتق من $\alpha(a/x)$.

رمزيا نكتب: $(\exists x)\alpha \mid \alpha(a/x)$

تخطيط القاعدة (تك.و): $\frac{\alpha(a/x)}{(\exists x)\alpha}$

إن فكرة هذه القاعدة هي أنه إذا كانت α صادقة من أجل a من مجموعة التعريف، فإنه يوجد x الذي من أجله تكون α صادقة. والتسمية (إضافة المكمم الوجودي) تبين أن ما نفعله عند استخدام هذه القاعدة هو إضافة المكمم الوجودي واستبدال الحد بالمتغير.

إن ما نحتاجه الآن، هو بعض قواعد تمكنا من اشتقاق صيغ غير مكمة من صيغ أخرى مكمة. ولهذا الغرض تتوفر لنا قاعدتين. الأولى تطبق على الصيغ المكمة كلياً وتسمى (التخصيص الكلي) والثانية تطبق على الصيغ المكمة جزئياً وتسمى (التمثيل الجزئي).

3. قاعدة التخصيص الكلي (تخ.ك) Rule of Universal Specification

(Elimination of Universal

Quantifier)

(حذف المكمم الكلي)

قاعدة التخصيص الكلي (تخ.ك)

إذا كانت α صيغة، a حد، x متغير فإن $\alpha(a/x)$ تُشتق من $(\forall x)\alpha$.

رمزيا نكتب: $(\forall x)\alpha \mid \alpha(a/x)$

تخطيط القاعدة (تخ.ك) $\frac{(\forall x)\alpha}{\alpha(a/x)}$

إن فكرة هذه القاعدة هي أنه إذا كانت α صادقة من أجل كل x من مجموعة التعريف، فإن $\alpha(a/x)$ تكون صادقة من أجل أي a من مجموعة تعريف x . والتسمية (حذف الكمم الكلي) تبين أن ما نفعله عند استخدام هذه القاعدة هو حذف الكمم الكلي واستبدال المتغير بأي حد. تسمى هذه القاعدة أيضا (التمثيل الكلي).

مثال 1 : كل الحيتان ثديية. لا واحد من الثدييات يكون سمك. إذن لا سمكة تكون حوت.

الحل: المحمولات الذرية

x يكون حوت: H_x ، x يكون ثديي: L_x ، x يكون سمك: S_x .

الترجمة

المقدمات $(\forall x)(H_x \rightarrow L_x), (\forall x)(L_x \rightarrow \neg S_x)$

النتيجة $(\forall x)(S_x \rightarrow \neg H_x)$

البرهان

{1}	1.	$(\forall x)(H_x \rightarrow L_x)$	م
{2}	2.	$(\forall x)(L_x \rightarrow \neg S_x)$	م
{1}	3.	$H_a \rightarrow L_a$	1, تخ.ك (a/x)
{1}	4.	$\neg L_a \rightarrow \neg H_a$	3, عكس النقيض
{2}	5.	$L_a \rightarrow \neg S_a$	2, تخ.ك (a/x)
{2}	6.	$S_a \rightarrow \neg L_a$	5, عكس النقيض
{1, 2}	7.	$S_a \rightarrow \neg H_a$	4, 6 القياس الشرطي
{1, 2}	8.	$(\forall x)(S_x \rightarrow \neg H_x)$	7, تك.ك

مثال 2 : كل الأسماك تتنفس بالغلاصم. السلحفاة لا تتنفس بالغلاصم. إذن، السلحفاة ليست سمكة.

الحل: المحمولات الذرية

x يكون سمكة: S_x ، x يتنفس بالغلاصم: H_x .

الحدود

السلحفاة: a.

الترجمة

$(\forall x) (S_x \rightarrow H_x), \lceil H_a$ المقدمات

$\lceil S_a$ النتيجة

البرهان

{1}	1.	$(\forall x) (S_x \rightarrow H_x)$	م
{2}	2.	$\lceil H_a$	م
{1}	3.	$S_a \rightarrow H_a$	تخ.ك (a/x) 1,
{1,2}	4.	$\lceil S_a$	نفي التالي 2, 3

مثال 3 : كل أساتذة الجامعة متقنون. ناصر أستاذ جامعة. إذن، يوجد أستاذ جامعة متقف.

الحل: المحمولات الذرية

x يكون أستاذ جامعة: P_x ، x يكون متقف: C_x .

الحد

ناصر: n.

الترجمة

$(\forall x) (P_x \rightarrow C_x), P_n$

المقدمات

$(\exists x) (P_x \wedge C_x)$

النتيجة

البرهان

{1}	1.	$(\forall x) (P_x \rightarrow C_x)$	م
{2}	2.	P_n	م
{1}	3.	$P_n \rightarrow C_n$	م, انتخ.ك (n / x)
{1, 2}	4.	C_n	2, 3 الوضع
{1, 2}	5.	$P_n \wedge C_n$	2, 4 العطف
{1, 2}	6.	$(\exists x) (P_x \wedge C_x)$	5, تك.و

**Rule of Existential Instantiation
(Elimination of Existential
Quantifier)**

4. قاعدة التمثيل الوجودي (تم.و)
(حذف الكمم الوجودي)

قاعدة التمثيل الوجودي (تم.و)

إذا كانت α صيغة، a حد، x متغير فإن $\alpha (a / x)$ تشتق من $(\exists x)\alpha$.

رمزيا نكتب: $(\exists x)\alpha \mid \alpha (a / x)$.

تخطيط القاعدة (تم.و):
$$\frac{(\exists x)\alpha}{\alpha(a/x)}$$

إن فكرة هذه القاعدة هي أنه إذا كانت $(\exists x)\alpha$ صادقة فإن $\alpha (a / x)$ تكون صادقة من أجل حد واحد على الأقل من مجموعة التعريف. والتسمية (حذف الكمم الوجودي) تبين أن ما نفعله عند استخدام هذه القاعدة هو حذف الكمم الوجودي واستبدال المتغير بحد.

مثال 1 : بعض الرياضيين أساتذة جامعة. كل أساتذة الجامعة متقنون. إذن،

بعض الرياضيين متقنين.

الحل: المحمولات الذرية

x رياضي: S_x ، x أستاذ جامعة: P_x ، x متقن: C_x .

الترجمة

المقدمات $(\exists x) (S_x \wedge P_x), (\forall x) (P_x \rightarrow C_x)$

النتيجة $(\exists x) (S_x \wedge C_x)$

البرهان

{1}	1.	$(\exists x) (S_x \wedge P_x)$	م
{2}	2.	$(\forall x) (P_x \rightarrow C_x)$	م
{1}	3.	$S_a \wedge P_a$	ا، تم. و
{1}	4.	P_a	1، التبسيط
{2}	.5	$P_a \rightarrow C_a$	2، (a / x) ك
{1, 2}	.6	C_a	4, 5 الوضع
{1}	7.	S_a	3، التبسيط
{1, 2}	8.	$S_a \wedge C_a$	6, 7 العطف
{1, 2}	9.	$(\exists x) (S_x \wedge C_x)$	8، ك. و

سنعطي الآن أمثلة عامة على البراهين الصورية لصحة صور الحجج

في حساب المحمولات.

مثال 2 : جميع الأفيال لبونة. بعض الأفيال مشاكسة. إذن، بعض اللبائن

مشاكسة.

المحمولات الذرية

x فيل : K_x ، x لبون : L_x ، x مشاكس : M_x

الترجمة

المقدمات $(\forall_x) (K_x \rightarrow L_x) , (\exists_x) (K_x \wedge M_x)$

النتيجة $(\exists_x) (L_x \wedge M_x)$

نستطيع أن نطبق قاعدة التخصيص الكلي على المقدمة الأولى وقاعدة التمثيل الوجودي على المقدمة الثانية، ولكننا هنا يجب أن نكون حذرين، فإذا طبقنا (تخ.ك) أولاً، فإننا نحصل على $L_a \rightarrow K_a$ ، حيث a عنصراً عشوئياً من مجموعة التعريف. ولكن لا يمكننا الافتراض أن هذا العنصر المعين a هو أيضاً عنصر تكون من أجله $M_a \wedge K_a$ قضية صادقة. إن المقدمة الثانية $(\exists_x) (K_x \wedge M_x)$ تضمن وجود على الأقل عنصر واحد من مجموعة التعريف يمتلك الصفتين التاليتين معا : يكون فيل ويكون مشاكس، ولكن لا يمكننا الافتراض أن a يمتلك هاتين الصفتين.

ومن أجل تجنب هذه المشكلة فإننا نقوم بتطبيق القاعدة تم.و أولاً. إن المقدمة $(\exists_x) (K_x \wedge M_x)$ تسمح باشتقاق $M_a \wedge K_a$ من أجل a من مجموعة التعريف. أما المقدمة $(\forall_x) (K_x \rightarrow L_x)$ فتسمح باستبدال قيم المتغير x في $K_x \rightarrow L_x$ بأي عنصر من مجموعة التعريف والحصول على قضية صادقة. وعلى وجه الخصوص يمكننا استبدال x بواسطة a والحصول على

$K_a \rightarrow L_a$. ولكن يجب أن نتذكر أن a ليس عنصر عشوائي، وإنما أحد (الأفيال المشاكسة).

البرهان

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | $(\forall_x) (K_x \rightarrow L_x)$ | م |
| 2. | $(\exists_x) (K_x \wedge M_x)$ | م |
| 3. | | تم، و 2، $K_a \wedge M_a$ |
| 4. | | تخ.ك، 1، $K_a \rightarrow L_a$ |
| 5. | K_a | التبسيط، 3 |
| 6. | M_a | التبسيط، 3 |
| 7. | L_a | الوضع 4,5 |
| 8. | | العطف 6,7، $L_a \wedge M_a$ |
| 9. | $(\exists_x) (L_x \wedge M_x)$ | ت.ك و 8 |

إن كون a ليس عنصر عشوائي من مجموعة التعريف لا يسمح لنا

بتطبيق ت.ك على $L_a \wedge M_a$ لاستنتاج $(\forall_x) (L_x \wedge M_x)$.

مثال 2

الأستاذة والأستاذات يحبون الطلاب. الأستاذ حافظ لا يحب سلمان. لا أستاذة تحب حميد. نوال أستاذة. إذن، لا سلمان يكون طالب ولا حميد يكون طالب.

الحل: المحمولات الذرية

x يكون أستاذ: P_x ، x تكون أستاذة: R_x ، x يكون طالب: S_x ، x يحب y : N_{xy}

الحدود

حافظ: h ، سلمان: m ، حميد: o ، نوال: r .

الترجمة

المقدمات

$(\forall x)((P_x \vee R_x) \rightarrow (\forall y)(S_y \rightarrow N_{xy})), P_h \wedge \neg N_{hm}, (\forall x)(R_x \rightarrow \neg N_{xo}), R_r$
 $\neg S_o \wedge \neg S_m$ النتيجة

البرهان

{1}	1.	$(\forall x)((P_x \vee R_x) \rightarrow (\forall y)(S_y \rightarrow N_{xy}))$	م
{2}	2.	$P_h \wedge \neg N_{hm}$	م
{3}	3.	$(\forall x)(R_x \rightarrow \neg N_{xo})$	م
{4}	4.	R_r	م
{3}	5.	$R_r \rightarrow \neg N_{ro}$	ك 3، (r / x) تخ.
{3, 4}	6.	$\neg N_{ro}$	4, 5 الوضع
{1}	7.	$((P_r \vee R_r) \rightarrow (\forall y)(S_y \rightarrow N_{ry}))$	ك 1، (r / x) تخ.
{4}	8.	$P_r \vee R_r$	4، الجمع
{1, 4}	9.	$(\forall y)(S_y \rightarrow N_{ry})$	7, 8 الوضع
{1, 4}	10.	$S_o \rightarrow N_{ro}$	ك 9، (o / y) تخ.
{1, 3, 4}	11.	$\neg S_o$	6, 10، كنفى التالي
{1}	12.	$((P_h \vee R_h) \rightarrow (\forall y)(S_y \rightarrow N_{hy}))$	ك 1، (h / x) تخ.
{2}	13.	$P_h \vee R_h$	2، الجمع
{1, 2}	14.	$(\forall y)(S_y \rightarrow N_{hy})$	12, 13 الوضع
{1, 2}	15.	$S_m \rightarrow N_{hm}$	ك 14، (m / y) تخ.
{1, 2}	16.	$\neg S_m$	2، 15، كنفى التالي
{1, 2, 3, 4}	17.	$\neg S_o \wedge \neg S_m$	11, 16 العطف

Proving Invalidity of **2. 5 البرهنة على خطأ صور الحجج**
 Argument Forms

(طريقة المثال-المضاد)

لقد استخدمنا طريقة المثال-المضاد في حساب القضايا للبرهنة على أن صورة حجة ما خاطئة. وكما نعلم فإن هذه الطريقة تقوم على إيجاد تعيين قيم صدق للمتغيرات القضائية بحيث تكون جميع المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. سوف نستخدم طريقة مشابهة تقوم على نفس المبدأ لبرهنة خطأ صورة حجة في حساب المحمولات، حيث تحوي مقدمات صورة الحجة ونتيجتها على الكممين \exists, \forall . الطريقة المشابهة تقوم على إيجاد مجموعة تحوي على قيمة واحدة على الأقل للمتغير تكون من أجلها صورة الحجة خاطئة، أي تكون جميع المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. أي أننا:

(1) نجد صورة الحجة الناتجة من تعويض المتغير بقيمة واحدة ولتكن t_1 ونحاول إثبات خطأ صورة الحجة في هذه الحالة. حسب تعريف الكممين يكون:

$$P_{t_1}, (\exists x) P_x \Leftrightarrow P_{t_1} (\forall x) P_x \Leftrightarrow$$

إذا لم نثبت خطأ صورة الحجة في هذه الحالة فننتقل إلى الحالة الثانية أدناه.

(2) نجد صورة الحجة الناتجة من تعويض المتغير في صورة الحجة المعطاة بقيمتين ولتكن t_1 و t_2 ونحاول إثبات خطأ صورة الحجة. في هذه الحالة وحسب تعريف الكممين يكون:

$$P_{t_1} \vee P_{t_2}, (\exists x) P_x \Leftrightarrow P_{t_1} \wedge P_{t_2} (\forall x) P_x \Leftrightarrow$$

وإذا لم نثبت خطأ صورة الحجة فننتقل إلى الحالة الثالثة أدناه.

(3) نجد صورة الحجة الناتجة من تعويض المتغير في صورة الحجة المعطاة بثلاثة قيم ولتكن t_1 و t_2 و t_3 ونحاول إثبات خطأ صورة الحجة. في هذه الحالة وحسب تعريف المكممين يكون:

$$P_{t_1} \vee P_{t_2} \vee P_{t_3}, (\exists x) P_x \Leftrightarrow P_{t_1} \wedge P_{t_2} \wedge P_{t_3} (\forall x) P_x \Leftrightarrow$$

(4) بشكل عام، إذا كان عدد قيم المتغير المأخوذة k ، أي t_1, t_2, \dots, t_k فإن يكون:

$$, P_{t_1} \wedge P_{t_2} \wedge \dots \wedge P_{t_k} (\forall x) P_x \Leftrightarrow$$

$$P_{t_1} \vee P_{t_2} \vee \dots \vee P_{t_k} (\exists x) P_x \Leftrightarrow$$

مثال: لنأخذ الحجة

كل الأبقار ثديية. كل الحيتان ثديية. إذن، كل الأبقار حيتان.
المحمولات الذرية

H_x : حوت x

T_x : ثديي x

C_x : بقرة x

الترجمة

($\forall x$) ($C_x \rightarrow T_x$), ($\forall x$) ($H_x \rightarrow T_x$) المقدمات

($\forall x$) ($C_x \rightarrow H_x$) النتيجة

سنحاول البرهان على خطأ صورة الحجة هذه باستخدام المثال-المضاد. ليكن t_1 هو قيمة المتغير الذي نحاول إثبات خطأ الحجة من أجله، وهكذا تكون:

المقدمات

$$H_{t_1} \rightarrow T_{t_1}, \alpha_2: C_{t_1} \rightarrow T_{t_1} \alpha_1:$$

النتيجة

$$C_{t_1} \rightarrow H_{t_1} \beta:$$

قبل أن نبدأ بالبرهنة على خطأ الحجة نشير إلى أنه يمكننا أن نستعيض عن القضية C_{t_1} بالرمز K و T_{t_1} بالرمز L و H_{t_1} بالرمز M وهكذا نستطيع إعادة كتابة صورة الحجة كما يلي:

$$\alpha_1: K \rightarrow L, \alpha_2: M \rightarrow L \quad \text{المقدمات}$$

$$\beta: K \rightarrow M \quad \text{النتيجة}$$

وبهذا حولنا صورة الحجة إلى لغة حساب القضايا. يمكننا استخدام ما كنا نستخدمه من أسلوب للبرهنة على خطئها.

الآن للبرهنة على خطأ صحة الحجة وباستخدام طريقة المثال-المضاد، نأخذ النتيجة $C_{t_1} \rightarrow H_{t_1}$ كاذبة. إذن، يجب أن تكون C_{t_1} صادقة و H_{t_1} كاذبة. حتى تكون α_1 صادقة وبما أن C_{t_1} صادقة فيجب أن تكون T_{t_1} صادقة. α_2 صادقة وذلك لأن H_{t_1} كاذبة و T_{t_1} صادقة. إذن السطر المطلوب هو:

C_{t_1}	T_{t_1}	H_{t_1}	α_1	α_2	β	$(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \beta$
T	T	F	T	T	F	F

العمود الأخير من الجدول يبين انه، من المقدمتين α_1 و α_2 لا تنتج النتيجة β . إذن، صورة الحجة هذه خاطئة وهكذا تكون الحجة الأصلية خاطئة.

يحدث أن تكون صورة حجة صحيحة في حساب المحمولات من أجل قيمة واحدة للمتغير، ولهذا علينا الانتقال إلى الحالة الثانية أي محاولة برهان خطئها من أجل قيمتين للمتغير كما هو في المثال أدناه.

مثال: لنأخذ الحجة التالية

كل الأبقار ثدييات. بعض الحيتان ثدييات. إذن، كل الأبقار حيتان.
سنجد صورة الحجة باستخدام نفس رموز المثال السابق.

$$(\forall x) (C_x \rightarrow T_x), (\exists x) (H_x \wedge T_x) \quad \text{المقدمات}$$

$$(\forall x) (C_x \rightarrow H_x) \quad \text{النتيجة}$$

عند التعويض بقيمة واحد t_1 للمتغير x تكون صورة الحجة هذه مكافئة إلى صورة حجة صادقة والتي مقدماتها الأولى $\alpha_1 : C_{t_1} \rightarrow T_{t_1}$ ومقدماتها الثانية $\alpha_2 : H_{t_1} \wedge T_{t_1}$ ونتيجتها: $C_{t_1} \rightarrow H_{t_1}$ وذلك لأنه إذا حاولنا إعطاء مثال-مضاد فسنصل إلى طريق مسدود كالتالي: نأخذ النتيجة: $C_{t_1} \rightarrow H_{t_1}$ كاذبة. إذن C_{t_1} يجب أن تكون صادقة و H_{t_1} يجب أن تكون كاذبة. حتى تكون α_1 صادقة، وبما أن C_{t_1} صادقة فيجب أن تكون T_{t_1} صادقة. حتى تكون α_2 صادقة فيجب أن تكون H_{t_1} صادقة و T_{t_1} صادقة. وهنا وصلنا إلى طريق مسدود (H_{t_1} يجب أن تكون كاذبة و H_{t_1} يجب أن تكون صادقة في نفس الوقت). وإذن صورة الحجة تكون صحيحة من أجل قيمة واحدة t_1 للمتغير x . ننتقل الآن إلى الحالة الثانية وهي التعويض بقيمتين للمتغير x . نحصل على صورة الحجة التي مقدماتها :

$$) H_{t_2} \wedge T_{t_2}) \vee (H_{t_1} \wedge T_{t_1}), \alpha_2: (C_{t_2} \rightarrow T_{t_2}) \wedge (C_{t_1} \rightarrow T_{t_1}) \alpha_1: ($$

وننتجتها :

$$) C_{t_2} \rightarrow H_{t_2}) \wedge (C_{t_1} \rightarrow H_{t_1}) \beta: ($$

سنبرهن خطأها وذلك بإعطاء مثال-مضاد كالتالي. نأخذ النتيجة كاذبة، إذن يجب أن تكون إحدى معطوفتيها على الأقل كاذبة. لنأخذ المعطوفة الأولى كاذبة. إذن يجب أن تكون C_{t_1} صادقة و H_{t_1} كاذبة. ولتكن C_{t_2} و H_{t_2} صادقتين. حتى تكون α_1 صادقة فيجب أن تكون كلتا معطوفتيها صادقتين. وبما أن C_{t_1} صادقة فيجب أن تكون T_{t_1} صادقة. وبما أن C_{t_2} صادقة فيجب أن تكون T_{t_2} صادقة. حتى تكون α_2 صادقة فيجب أن تكون إحدى مفصولتيها على الأقل صادقة. وبما أن H_{t_2} و T_{t_2} صادقتين فإن α_2 تكون صادقة. هكذا تكون صورة الحجة خاطئة. السطر المطلوب هو :

C_{t_1}	C_{t_2}	T_{t_1}	T_{t_2}	H_{t_1}	H_{t_2}	α_1	α_2	β	$(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \beta$
T	T	T	T	F	T	T	T	F	F

العمود الأخير من الجدول يبين انه، من المقدمتين α_1 و α_2 لا تنتج النتيجة β .

إذن، صورة الحجة هذه خاطئة وهكذا تكون الحجة الأصلية خاطئة.

إن طريقة المثال-المضاد للبرهنة على خطأ صور الحجج في حساب

المحمولات تكون عملية عندما تكون عدد قيم المتغير المأخوذة ليس أكثر من

ثلاثة. بالنسبة إلى صور الحجج التي تحوي على أكثر من مكتم واحد فيمكننا تكييف نفس الطريقة (المثال-المضاد) وبسهولة. المثال التالي يبين ذلك.

مثال

$$\alpha_1: (\exists x) (\forall y) (M_x \rightarrow L_x) \quad \text{المقدمات}$$

$$\alpha_2: (\forall y) (\exists z) (L_y \rightarrow N_z)$$

$$\beta: (\forall x) (\exists z) (M_x \rightarrow N_z) \quad \text{النتيجة}$$

سنحاول البرهان على خطأ صورة الحجة بواسطة المثال-المضاد. صورة الحجة هذه تؤول إلى صورة صحيحة عند التعويض بقيمة واحدة t_1 للمتغير x وهي صورة الحجة التالية:

$$L_{t_2} \rightarrow N_{t_2}, M_{t_1} \rightarrow L_{t_1} \quad \text{المقدمات}$$

$$M_{t_1} \rightarrow N_{t_1} \quad \text{النتيجة}$$

صورة الحجة الأصلية تؤول إلى صورة حجة خاطئة عند التعويض بقيمتين t_1 و t_2 للمتغير x والتي مقدماتها :

$$((M_{t_2} \rightarrow L_{t_2}) \wedge (M_{t_2} \rightarrow L_{t_1})) \vee ((M_{t_1} \rightarrow L_{t_2}) \wedge (M_{t_1} \rightarrow L_{t_1})) \alpha_1: (($$

$$)) L_{t_2} \rightarrow N_{t_2}) \wedge (L_{t_2} \rightarrow N_{t_1})) \wedge (L_{t_1} \rightarrow N_{t_2}) \vee (L_{t_1} \rightarrow N_{t_1}) \alpha_2: (($$

وننتيجتها :

$$)) M_{t_2} \rightarrow N_{t_2}) \wedge (M_{t_2} \rightarrow N_{t_1})) \wedge ((M_{t_1} \rightarrow N_{t_2}) \vee (M_{t_1} \rightarrow N_{t_1})) \beta: (($$

المثال-المضاد يوضحه السطر المطلوب التالي:

M_{t_1}	M_{t_2}	L_{t_1}	L_{t_2}	N_{t_1}	N_{t_2}	α_1	α_2	β	$(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \rightarrow \beta$
T	F	F	F	F	F	T	T	F	F

العمود الأخير من الجدول يبين انه، من المقدمتين α_1 و α_2 لا تنتج النتيجة β .
 إذن، صورة الحجة هذه خاطئة وهكذا تكون الحجة الأصلية خاطئة.

5.3 العلاقات Relations

عند تعرضنا لمفهوم المحمول (الفقرة 4.2) ذكرنا أن المحمول متعدد المواضيع (اثنان أو أكثر) يمثل علاقة والحقيقة أن العلاقات هذه من المواضيع الهامة في المنطق. سنقوم بدراسة العديد من خصائصها وسنتعامل مع العلاقات الثنائية أو المحمولات الثنائية.

لنكن R علاقة مجموعة تعريفها M :

1) العلاقة الانعكاسية Reflexive Relation

العلاقة R تسمى انعكاسية على M إذا وفقط إذا كانت $R_{xx} (\forall x)$
 علاقة المساواة (=) المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية تكون انعكاسية وذلك لأن كل عدد يساوي نفسه $(x = x)$.

2) العلاقة غير الانعكاسية Irreflexive Relation

العلاقة R تسمى غير انعكاسية على M إذا وفقط إذا كانت $\neg R_{xx} (\forall x)$
 علاقة (أكبر سنا من) غير انعكاسية وذلك لأن أي شخص ليس أكبر سنا من نفسه.

3) العلاقة المتماثلة Symetric Relation

العلاقة R تسمى متماثلة على M إذا وفقط إذا كانت $R_{xy} \rightarrow R_{yx} (\forall x) (\forall y)$

علاقة (معاصر إلى) تماثلية وذلك لأنه إذا كان x معاصر إلى y فإن y معاصر إلى x . علاقة (الأخوة) علاقة تماثلية أيضا وذلك لأنه إذا كان x أخ y فإن y أخ x .

4) العلاقة اللاتماثلية Asymmetric Relation

العلاقة R تسمى لاتماثلية على M إذا وفقط إذا كانت

$$(\forall x)(\forall y)(R_{xy} \rightarrow \neg R_{yx})$$

علاقة (أقصر من) المعرفة على مجموعة البشر لاتماثلية وذلك لأنه إذا كان x أقصر من y فإن y ليس أقصر من x .

5) العلاقة ضد تماثلية Antisymmetric Relation

العلاقة R تسمى ضد تماثلية على M إذا وفقط إذا كانت

$$(\forall x)(\forall y)((R_{xy} \wedge R_{yx}) \rightarrow x = y)$$

علاقة أصغر أو يساوي (\geq) المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية هي ضد تماثلية وذلك لأنه إذا كان العدد $x \geq y$ و $y \geq x$ فإن $x = y$.

6) العلاقة المتعدية Transitive Relation

العلاقة R تسمى متعدية على M إذا وفقط إذا كانت

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$$

علاقة (على يمين من) علاقة متعدية وذلك لأنه إذا كان x على يمين y و y على يمين z فإن x على يمين z .

7) علاقة التكافؤ Equivalence Relation

تسمى العلاقة R علاقة تكافؤ إذا وفقط إذا كان R انعكاسية، متماثلة ومتعدية على M. علاقة التساوي (=) المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية هي علاقة تكافؤ.

8) علاقة الترتيب الجزئي Partial Ordering Relation

تسمى العلاقة R علاقة ترتيب جزئي إذا وفقط إذا كانت انعكاسية وضد تماثلية ومتعدية على M. علاقة أصغر أو يساوي (\geq) هي علاقة ترتيب جزئي.

9) علاقة الترابط Connected Relation

العلاقة R تسمى علاقة مترابطة على M إذا وفقط إذا كانت

$$(\forall x)(\forall y)(R_{xy} \vee R_{yx} \vee x = y)$$

العلاقة أكبر من (<) المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية تكون علاقة مترابطة لأن كل عددين طبيعيين x و y، إما $x < y$ أو $y < x$ أو $x = y$.

مثال 1

برهن أن العلاقة اللاتماثلية تكون غير انعكاسية.

الترجمة

$$(\forall x)(\forall y)(R_{xy} \rightarrow \neg R_{yx})$$

المقدمات

$$(\forall x) \neg R_{xx}$$

النتيجة

البرهان

- | | | | |
|-----|----|--|-----------------|
| {1} | 1. | $(\forall x)(\forall y)(R_{xy} \rightarrow \neg R_{yx})$ | م |
| {1} | 2. | $(\forall y)(R_{ay} \rightarrow \neg R_{ya})$ | تخ.ك 1, (a / x) |
| {1} | 3. | $R_{aa} \rightarrow \neg R_{aa}$ | تخ.ك 2, (a / y) |

{1}	4.	$\lceil R_{aa} \vee \lceil R_{aa}$	3, الاستلزام
{1}	.5	$\lceil R_{aa}$	4, تحصيل حاصل
{1}	.6	$(\forall x) \lceil R_{xx}$	5, تك.ك

مثال 2 : برهن أن الحجة التالية صحيحة.

كل أب أكبر تجربة من كل ابن. أحمد ليس أكبر تجربة من علي الابن. إذن أحمد ليس أبا.

المحمولات الذرية: x يكون أب- F_x , x يكون ابن- S_x , x أكبر تجربة من y E_{xy} .

الحدود: أحمد- a , علي- b .

الترجمة

المقدمات $(\forall x)(\forall y)((F_x \wedge S_y) \rightarrow E_{xy}), \lceil E_{ab} \wedge S_b$
النتيجة $\lceil F_a$

البرهان

{1}	1.	$(\forall x)(\forall y)((F_x \wedge S_y) \rightarrow E_{xy})$	م
{2}	2.	$\lceil E_{ab} \wedge S_b$	م
{1}	3.	$(F_a \wedge S_b) \rightarrow E_{ab}$	تك.ك (a/x) (b/y) 1,
{2}	4.	$\lceil E_{ab}$	التبسيط 2,
{1,2}	5.	$\lceil (F_a \wedge S_b)$	نفي التالي 3, 4,
{1,2}	6.	$\lceil F_a \vee \lceil S_b$	دي مورغان 5,
{2}	7.	S_b	التبسيط 2,
{2}	8.	$\lceil \lceil S_b$	النفي المضاعف 7,
{1,2}	9.	$\lceil F_a$	قياس الفصل 6, 8

مثال 3

أعط برهانا سوريا للحجة التالية :

المقدمات العلاقة R متماثلة على M. العلاقة R متعدية على M.

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((R_{xy} \wedge R_{xz}) \rightarrow R_{yz}) \quad \text{النتيجة}$$

البرهان

{1}	1.	$(\forall x)(\forall y)(R_{xy} \rightarrow R_{yx})$	م
{2}	2.	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$	م
{3}	3.	$R_{xy} \wedge R_{xz}$	مقدمة (ب.ش) م
{1}	4.	$R_{xy} \rightarrow R_{yx}$	1, (x / x) (y / y) تخ.ك
{3}	.5	R_{xy}	3, التبسيط
{1}	.6	R_{yx}	4,5 الوضع
{2}	7.	$R_{uv} \wedge R_{vz} \rightarrow R_{uz}$	2, (u / x) (v / y) تخ.ك
{2}	8.	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((R_{uv} \wedge R_{vz}) \rightarrow R_{uz})$	7, تك.ك
{2}	9.	$(R_{yx} \wedge R_{xz}) \rightarrow R_{yz}$	8, (x/v) (y/u) (z/z) تخ.ك
{3}	10.	R_{xz}	3, التبسيط
{1,3}	11.	$R_{yx} \wedge R_{xz}$	6, 10 العطف
{1,2,3}	12.	R_{yz}	9, 11 الوضع
{1,2}	13.	$(R_{xy} \wedge R_{xz}) \rightarrow R_{yz}$	3, ب.ش
{1,2}	14.	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((R_{xy} \wedge R_{xz}) \rightarrow R_{yz})$	13, تك.ك

لاحظ أننا استخدمنا القاعدة (تخ.ك) مرتين على الخط 4 والخط 7 وثلاث مرات على الخط 9. أما القاعدة (تك.ك) فاستخدمناها ثلاث مرات على الخط

8 وثلاث مرات على الخط 14 ولقد أبقينا على المتغيرات أو استبدلناها بمتغيرات أخرى عندما استخدمنا القاعدة (تخ.ك).

مثال 4

أعط برهانا صوريا للحجة التالية

المقدمات: العلاقة R المعرفة على M هي علاقة تكافؤ.

$$(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{xz}) \quad \text{النتيجة}$$

البرهان

{1}	1.	$(\forall x) R_{xx}$	م
{2}	2.	$(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{yx})$	م
{3}	3.	$(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$	م
{4}	4.	R_{xy}	مقدمة ب.ش) م
{2}	.5	$R_{xy} \rightarrow R_{yx}$	2, (x/x), (y/y) تخ. ك
{2,4}	.6	R_{yx}	4,5 الوضع
{3}	7.	$(R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz}$	3, (x/x), (y/y), (z/z) تخ.ك
{2,4}	8.	$R_{xy} \wedge R_{yz}$	4,6 العطف
{2,3,4}	9.	R_{xz}	7, 8 الوضع
{2,3}	10.	$R_{xy} \rightarrow R_{xz}$	4, 9 ب.ش
{2,3}	11.	$(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{xz})$	10, تك.ك

5. 4 الهوية Identity

الهوية أو المساواة (=) هو مفهوم شائع يستخدم عادة لإثبات الشخصية ويعبر عنه في اللغة العربية بواسطة الكلمة (يكون). يستخدم في الرياضيات،

مثلا كعلاقة ثنائية بين الأعداد ولكنه يستخدم بشكل أوسع في المنطق حيث يمثل علاقة بين أي نوعين من الأشياء. إن استخدام رمز الهوية (=) كعلاقة في حساب المحمولات يعني إضافة صيغة ذرية جديدة نتيجة وضع الرمز (=) بين حدين، وهكذا فالصيغة الذرية هذه تكون على الشكل $a = b$.

أما فيما يخص دلالة الهوية ففي كل تفسير : $a = b$ تكون صادقة إذا وفقط إذا كان a و b يمثلان نفس العنصر في مجموعة التعريف. وبالتالي فإن دراسة (الهوية) تمثل توسيعا لحساب المحمولات. إن هذه الصيغة الذرية الجديدة تؤدي إلى إغناء حساب المحمولات بصيغ جديدة، حيث تمكنا الهوية من ترجمة أنواع مختلفة من البناءات اللغوية.

أمثلة

(1) كان ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية

تؤكد (كان) هنا بأن ابن النفيس هو ومكتشف الدورة الدموية لهما نفس الهوية. إذن يمكننا وضع علامة المساواة بين الحد (ابن النفيس) والوصف (مكتشف الدورة الدموية)، هكذا:

ابن النفيس = مكتشف الدورة الدموية

(2) أحمد يحب علي فقط

المحمولات الذرية: x يحب y - R_{xy} . الحدود: أحمد - a ، علي - b .

الترجمة: $R_{ab} \wedge (\forall x) (R_{ax} \rightarrow x = b)$

(3) أحمد فقط يكون عبّر البحر.

المحمولات الذرية: x عبّر البحر - R_x . الحدود: أحمد - a .

الترجمة: $R_a \wedge (\forall x) (R_x \rightarrow x = a)$

(4) يوجد شيء واحد على الأكثر.

الترجمة: $(\forall x) (\forall y) (y = x)$

(5) يوجد شيء واحد بالضبط.

الترجمة: $(\exists x) (\forall y) (y = x)$

5. 4. 1 قواعد اشتقاق علاقة الهوية

1. قاعدة الهوية :

من المقدمتين $x = y$ وصيغة α_x (α تحوي المتغير x) نستق صيغة α_y تكون بواسطة استبدال كل ظهور للمتغير x في المقدمة الثانية بواسطة

المتغير y . رمزيا نكتب α_y | α_x ، $x = y$.

$x = y$

$\frac{\alpha_x}{\alpha_y}$

مخطط قاعدة الهوية

مثال: لناخذ الحجة التالية

كان ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية. مكتشف الدورة الدموية كان عظيما.
إذن، ابن النفيس كان عظيما.

المحمولات الذرية: x عظيم - R_x . الحدود: ابن النفيس - n ، مكتشف الدورة الدموية - m .

الترجمة

$n = m, R_m$

المقدمات

R_n

النتيجة

البرهان

{1}	1.	$n = m$	م
{2}	2.	R_m	م
{1,2}	3.	R_n	1,2 الهوية

2. قاعدة نفي الهوية :

من المقدمتين α_x و α_y نستق الصيغة $\neg(x=y)$. رمزياً نكتب:

$$\alpha_x, \alpha_y \mid \neg(x=y)$$

α_x

$$\frac{\alpha_x, \neg(x=y)}{\neg(x=y)}$$

مخطط قاعدة نفي الهوية

نعتبر أن $x \neq y$ هي اختصار إلى $\neg(x=y)$. وكما استخدمنا في المثال أعلاه (الهوية) على الخط 3 كقاعدة اشتقاق فإننا سنستخدم هنا أيضا نفي الهوية كقاعدة اشتقاق في المثال أدناه.

مثال

الرجال الذين يقاومون المرض يكونون رياضيين. أحمد رجل يقاوم المرض.
هذا الرجل ليس رياضيا. إذن، هذا الرجل ليس أحمد.

الحل: المحمولات الذرية

K_x - يكون رجل -

L_x - يكون رياضي -

M_x - يقاوم المرض -

الحدود

هذا الرجل - m

أحمد - n

الترجمة

$(\forall x) ((K_x \wedge M_x) \rightarrow L_x), K_n \wedge M_n, \neg L_m$

المقدمات

$\neg(n = m)$

النتيجة

البرهان

{1}	1.	$(\forall x) (K_x \wedge M_x) \rightarrow L_x$	م
{2}	2.	$K_n \wedge M_n$	م
{3}	3.	$\neg L_m$	م
{1}	4.	$(K_n \wedge M_n) \rightarrow L_n$	(n / x), إتخذك
{1,2}	.5	L_n	2,4 الوضع
{1,2,3}	.6	$\neg(n = m)$	3,5 نفى الهوية

5. 5 تمارين

(أ) ترجم إلى لغة حساب المحمولات كلا من الحجج الصحيحة التالية وأعط برهاناً سورياً لها.

- (1) جميع المناطق فلاسفة. أحمد ليس فيلسوف. إذن، أحمد ليست منطقي.
- (2) كل شخص يسكن تونس أو طرابلس يكون جادا ومتحضرا. إذن، كل شخص يسكن طرابلس يكون جادا.
- (3) كل الحيوانات ذات الريش لا تنمو في الماء. توجد حيوانات تنمو في الماء وتعيش في البحر. إذن، توجد حيوانات تعيش في البحر وليست من ذوات الريش.

(4) كل فيزيائي يفضل كل كيميائي. لا فيزيائي يفضل أي فيلسوف. أحمد فيزيائي. إذن، لا فيلسوف يكون كيميائي.

(5) بعض الروايات الحديثة رائعة. كل شيء رائع يكون ممتع. لا شيء ممتع يكون سخيف. إذن بعض الروايات الحديثة ليست سخيفة.

(6) إذا كانت R علاقة تكافؤ على M فإذن

$$(\forall x) (\forall y) (\forall z) (R_{xy} \wedge R_{yz} \rightarrow R_{yz})$$

(ب) برهن خطأ كل من الحجج التالية.

(1) كل الأطباء كفوتين. أحمد كفاء. إذن، أحمد طبيب.

(2) كل هرة تكون كبيرة. بعض الثدييات تكون كبيرة. إذن، لا هرات تكون ثدييات.

(ج) أعط برهانا سوريا لكل من صور الحجج التالية.

(1) المقدمات

$$(\forall x) (R_x \rightarrow S_x)$$

$$(\forall x) ((R_x \wedge S_x) \rightarrow T_x)$$

النتيجة

$$(\forall x) (R_x \rightarrow T_x)$$

(2) المقدمات

$$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$$

$$(\forall x) (M_x \rightarrow L_x)$$

$$(\forall x) ((K_x \wedge M_x) \rightarrow L_x)$$

النتيجة

(3) المقدمات

$$(\forall x) (L_x \rightarrow \neg M_x)$$

$$(\exists x) (N_x \wedge M_x)$$

النتيجة

$$(\exists x) (N_x \wedge \neg L_x)$$

(4) المقدمات

$$(\forall x) ((K_x \wedge \neg M_x) \rightarrow \neg O_x)$$

$$(\forall x) ((K_x \wedge L_x) \rightarrow N_x)$$

$$(\forall x) (K_x \rightarrow (L_x \vee \neg M_x))$$

النتيجة

$$(\forall x) ((K_x \wedge O_x) \rightarrow N_x)$$

(5) المقدمات

$$(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{yx})$$

$$(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$$

$$(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{xx})$$

النتيجة

(6) المقدمات

$$(\forall x) (K_x \rightarrow (\forall y) (L_y \wedge M_y) \rightarrow R_{xy})$$

$$(\forall x) (M_x \rightarrow L_x)$$

$$K_n \wedge L_m$$

$$(\forall x) (K_x \rightarrow \neg R_{xm})$$

النتيجة

$$\neg M_m$$

(7) المقدمات

$$\begin{aligned} & (\forall x) (L_x \rightarrow M_x) \\ & (\forall x) (L_x \rightarrow \neg M_x) \\ & K_a \end{aligned}$$

النتيجة

$$M_a \wedge \neg M_a$$

(د) برهن خطأ كل من صور الحجج التالية :

(1) المقدمات:

$$\begin{aligned} & (\forall x) (K_x \rightarrow L_x) \\ & (\forall x) (M_x \rightarrow N_x) \\ & (\forall x) (\neg L_x \rightarrow \neg N_x) \end{aligned}$$

النتيجة

$$(\forall x) (M_x \rightarrow K_x)$$

(2) المقدمات

$$\begin{aligned} & (\forall x) (K_x \rightarrow \neg L_x) \\ & (\forall x) (M_x \rightarrow \neg N_x) \\ & (\forall x) (\neg K_x \rightarrow N_x) \end{aligned}$$

النتيجة

$$(\forall x) (M_x \rightarrow \neg K_x)$$

(3) المقدمات

$$\begin{aligned} & (\forall x) (K_x \rightarrow \neg L_x) \\ & (\forall x) (M_x \rightarrow \neg L_x) \end{aligned}$$

النتيجة

$$(\forall x) (M_x \rightarrow \neg K_x)$$

(4) المقدمات

$$(\exists x) (K_x \wedge \neg L_x)$$

$$(\forall x) (M_x \rightarrow K_x)$$

النتيجة

$$(\exists x) (M_x \wedge \neg K_x)$$

(5) المقدمات

$$(\forall x) (K_x \rightarrow \neg L_x)$$

$$(\exists x) (M_x \wedge L_x)$$

النتيجة

$$(\exists x) (K_x \wedge \neg M_x)$$

(6) المقدمات

$$(\exists x) (K_x \wedge L_x)$$

$$(\forall x) (M_x \rightarrow K_x)$$

النتيجة

$$(\exists x) (M_x \wedge L_x)$$

(هـ) أعط برهانا سوريا لكل من صور الحجج التالية مستخدما قاعدتي

الهوية :

(1) المقدمات

$$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$$

$$K_a$$

$$a = n$$

النتيجة
 L_n

$K_a, L_b, a=b, (\forall x) (L_x \rightarrow M_x)$

(2) المقدمات

$(\exists x) (K_x \wedge M_x)$

النتيجة

$(\forall x) (L_x \rightarrow \neg M_x), M_m, m = n$

(3) المقدمات

$\neg L_n$

النتيجة

$(\forall x) ((K_x \wedge L_x) \rightarrow M_x), K_m, L_n, n = m, \neg M_o$

(4) المقدمات

$o \neq n$

النتيجة

(و) برهن أن كل من مجموعات الصيغ التالية غير متسقة وذلك بإعطاء برهان صوري لصيغة متناقضة.

(1) $(\forall x) (K_x \rightarrow L_x), (\forall x) (K_x \rightarrow \neg L_x), K_a$

(2) $(\forall x) (K_x \rightarrow (L_x \wedge M_x)), (\forall x) (N_x \rightarrow \neg M_x), \neg (\forall x) (N_x \rightarrow \neg M_x)$

(3) $(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz}), (\forall x) (\forall y) (R_{xy} \wedge R_{yx}),$

$R_{ab}, \neg R_{ab}$

(4) $K_a, L_b, (\forall x) (K_x \rightarrow M_x), (\forall x) (L_x \rightarrow \neg M_x), a = b$

الفصل السادس

Formal systems of **الأنساق الصورية لحساب المحمولات** **predicate calculus**

تمثل جداول الصدق في حساب القضايا طريقة فعالة لتحديد فيما إذا كانت صيغة معطاة هي صيغة تكرارية. ولكن لا توجد أية عملية فعالة يمكنها في حساب المحمولات من تحديد فيما إذا كانت صيغة معطاة صحيحة، لأنه يتوجب علينا هنا التحقق من صدق الصيغة في تفسيرات ذات مجالات منتهية أو غير منتهية. وهكذا فإن بناء الأنساق الصورية في حساب المحمولات يصبح ضروريا في دراسة الصيغ التي تحوي على مكلمات وهذا ما سنفعله أدناه.

1.6 مكونات النسق الصوري لحساب المحمولات

النسق Q

(1) رموز النسق (الجدية النسق)

أ- المتغيرات x, y, z ودلائلها $x_1, x_2, \dots, y_1, y_2, \dots, z_1, z_2, \dots$

ب- الثوابت a, b, c ودلائلها $a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots, c_1, c_2, \dots$

ج- متغيرات المحمولات

1. الأحادية $K_1^1, K_2^1, \dots, L_1^1, L_2^1, \dots, M_1^1, M_2^1, \dots$

2. الثنائية $K_1^2, K_2^2, \dots, L_1^2, L_2^2, \dots, M_1^2, M_2^2, \dots$

3. الثلاثية $K_1^3, K_2^3, \dots, L_1^3, L_2^3, \dots, M_1^3, M_2^3, \dots$

وهكذا.

د-رموز الدوال

1. ذات المتغير الواحد f_1^1, f_2^1, \dots

2. ذات المتغيرين f_1^2, f_2^2, \dots

3. ذات الثلاث متغيرات f_1^3, f_2^3, \dots

وهكذا.

هـ- الرمزان \lceil ، \rightarrow ندعوهما الرابطين الأوليين.

و- الرمزان (و) ندعوهما قوس الإغلاق وقوس الفتح على الترتيب. رمز

المتعم الكلي \forall

(2) مجموعة الصيغ التي تتكون حسب القاعدتين :

أ- كل صيغة ذرية تكون صيغة.

(تعريف الصيغة الذرية هو نفسه الذي ورد سابقا في فقرات (قواعد بناء

الصيغ)).

ب- إذا كانت α و β صيغتان و x متغير فإن $\lceil \alpha$ ، $\alpha \rightarrow \beta$ و $(\forall x) \alpha$

تكون صيغا.

كل من $\alpha \wedge \beta$ ، $\alpha \vee \beta$ و $\alpha \leftrightarrow \beta$ نعرفها كما يلي :

تعريف 1

$$\alpha \wedge \beta \equiv \lceil \text{تع } (\alpha \rightarrow \beta)$$

تعريف 2

$$\alpha \vee \beta \equiv \lceil \text{تع } \alpha \rightarrow \beta$$

تعريف 3

$$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$$

إن معنى التعريف 1 ، مثلا ، هو أنه : من أجل كل صيغتين α و β فإن $\beta \wedge \alpha$ هو اختصار إلى $\lceil (\alpha \rightarrow \lceil \beta) \rceil$.

ليس من الضروري وضع الرمز \exists كرابط أولي لأنه يمكننا تعريفه باستخدام الرابط الأولي \forall كالتالي :

تعريف 4

$$(\exists x) \alpha \equiv \lceil (\forall x) \lceil \alpha \rceil \rceil$$

(3) مجموعة الأشكال البديهية (حيث α ، β ، γ أية صيغ من النسق Q)

شكل البديهية 1 (A₁)

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$$

شكل البديهية 2 (A₂)

$$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

شكل البديهية 3 (A₃)

$$(\lceil \alpha \rightarrow \lceil \beta \rceil) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$$

شكل بديهية 4 (A₄)

$$(\forall x) \alpha(x) \rightarrow \alpha(t/x)$$

شرط أن يكون t حرا إلى x في $\alpha(x)$.

شكل البديهية 5 (A₅)

$$(\forall x) (\alpha \rightarrow \beta(x)) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\forall x) \beta(x))$$

شرط أن لا يكون x حرا في α .

(4) مجموعة قواعد الاستنتاج

تتكون هذه المجموعة من قاعدتي الاستنتاج :

1. قاعدة الوضع : من α و $\beta \rightarrow \alpha$ نستنتج β .
2. قاعدة التعميم : من $\alpha(x)$ نستنتج $(\forall x)\alpha(x)$.

ستقوم بتوضيح يتعلق بالشريطين اللذين واردة في شكل البديهية (A₄) وشكل البديهية (A₅). فبالنسبة إلى (A₄) إذا كان t ليس حراً إلى x في $\alpha(x)$ فإن ذلك يؤدي إلى عدم صدق (A₄) ، فمثلاً لتكن $\alpha(x_1)$ هي $(\forall x_2) K_1^2(x_1, x_2)$ وليكن t هو x_2 . لاحظ أن t ليس حراً إلى x_1 في $\alpha(x_1)$. خذ الآن الحالة غير الصحيحة من حالات (A₄) :

$$(1) (\forall x_1) (\neg(\forall x_2) K_1^2(x_1, x_2)) \rightarrow \neg(\forall x_2) K_1^2(x_1, x_2)$$

خذ الآن التفسير الذي مداه عنصرين على الأقل وليكن K_1^2 هو علاقة المساواة. إن مقدم الاستلزام (1) صادقاً وتاليه كاذباً. وهكذا فإن (1) كاذباً في هذا التفسير .

في حالة (A₅) فإن عدم التقيد بشرط أن لا يكون x حراً في α سيؤدي إلى الخطأ التالي. لتكن كل من α و β هي الصيغة $K_1^1(x_1)$. هنا x حر في α . لناخذ الحالة الخاطئة التالية لشكل البديهية (A₅) :

$$(2) (\forall x_1) (K_1^1(x_1) \rightarrow K_1^1(x_1)) \rightarrow (K_1^1(x_1) \rightarrow (\forall x_1) K_1^1(x_1))$$

مقدم الاستلزام (2) صادق. الآن لناخذ تفسير مداه هو مجموعة الأعداد الصحيحة وليكن $K_1^1(x) : x$ عدد فردي. إذن $(\forall x_1) (K_1^1(x_1))$ كاذبة. وبالتالي فإن تالي (2) كاذبة وهكذا فإن (2) تكون كاذبة في هذا التفسير .

نشير إلى أن الأشكال البديهية 1، 2 و 3 تشكل مع قاعدة الوضع أساس التمسق الصوري لحساب القضايا وهكذا فإن كل المبرهنات التي تبرهن في حساب القضايا هي أيضا مبرهنات نبرهن عليها في حساب المحمولات. كذلك فإن الصيغ التي تنتج من مبرهنات حساب القضايا عن طريق إبدال المتغيرات القضائية بصيغ من صيغ حساب المحمولات هي من مبرهنات حساب المحمولات. أي أنه، إذا كانت الصيغة α التي تحتوي على n من المتغيرات القضائية k_1, k_2, \dots, k_n (سنكتبها هكذا $(\alpha(k_1, k_2, \dots, k_n))$) هي صيغة من حساب القضايا فإن الصيغة $(\alpha(\beta_1/k_1, \beta_2/k_2, \dots, \beta_n/k_n))$ الناتجة عن الأولى وذلك بإبدال أي متغير قضائي k_m بالصيغة β_m من حساب المحمولات هي مبرهنة في حساب المحمولات والتي يمكننا التوصل لبرهانها بواسطة أشكال البديهيات الثلاثة الأولى بالإضافة إلى قاعدة الوضع فقط.

(البرهان) في النسق Q هو متتالية من الصيغ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ حيث أن أية صيغة α_i ($1 \leq i \leq n$) هي بديهية من بديهيات النسق Q أو أن α_i صيغة مشتقة من الصيغ التي تسبقها في المتتالية وذلك باستخدام قاعدة الوضع أو التعميم.

سوف نكتب $\alpha \mid_Q$ للتعبير عن (α مبرهنة في النسق Q) ونكتب $\Gamma \mid_Q \alpha$ لتعبير عن (α هي نتيجة Γ في النسق Q وحيث أن Γ مجموعة من صيغ Q).

(5) مبرهنات النسق Q

$(\forall x) (\alpha(x) \rightarrow (\beta(x))) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow (\forall x) \beta(x))$ مبرهنة 1

البرهان

- | | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| $\frac{}{0}$ | 1. $(\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \beta(x))$ | |
| | 2. $(\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \alpha(x))$ | شكل بدئية (A ₄) |
| | 3. $((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \beta(x))) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \alpha(x)) \rightarrow ((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x)))$ | حق ¹ |
| | 4. $((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \alpha(x)) \rightarrow ((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x)))$ | الوضع 1,3 |
| | 5. $((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x)))$ | الوضع 2,4 |
| | 6. $(\forall x) (((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x)))$ | تعميم 5 |
| | 7. $(\forall x) ((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x))) \rightarrow ((\forall x) (\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x))$ | شكل بدئية (A ₅) |
| | 8. $((\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) (\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x)))$ | الوضع 6,7 |
| | 9. $(\forall x) ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow (\forall x) \beta(x))$ | شكل بدئية (A ₅) |
| | 10. $(\forall x) (\alpha(x) \rightarrow (\beta(x))) \rightarrow ((\forall x) \alpha(x) \rightarrow (\forall x) \beta(x))$ | حق 8,9 |

$\frac{}{0} (\forall x) (\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x) (\alpha(x) \leftrightarrow (\forall x) \beta(x)))$ مبرهنة 2

البرهان

1. $(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \beta(x))$ حق

¹ - استبدال في الصيغة $((K \rightarrow (L \rightarrow M)) \rightarrow (N \rightarrow L)) \rightarrow (K \rightarrow (N \rightarrow M))$ من حساب القضايا (حق).

2. $(\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \beta(x))$ تعميم 1,
3. $(\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x)\alpha(x) \leftrightarrow (\forall x)\beta(x))$ مبرهنة 1
4. $((\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x)(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)))$ الوضع 2,3
5. $((\forall x)(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x)(\alpha(x) \rightarrow (\forall x)\beta(x)))$ مبرهنة 1
6. $((\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x)(\alpha(x) \rightarrow (\forall x)\beta(x)))$ حق 4,5
7. $((\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x)\beta(x) \rightarrow (\forall x)\alpha(x)))$ تبرهن بنفس الخطوات من 1 إلى 6
8. $(\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow \beta(x)) \rightarrow ((\forall x)(\alpha(x) \leftrightarrow (\forall x)\beta(x)))$ حق 6,7

مبرهنة الاستنتاج

لنكن α ، β صيغتان من Q و Γ مجموعة غير خالية من صيغ Q .
 إذا كانت $\beta \mid \Gamma, \alpha$ وكان البرهان لا يحتوي على تطبيق لقاعدة التعميم المحتوية على متغير حر في α ، فإن $\beta \mid \Gamma, \alpha$.
 البرهان : سنستخدم في هذا البرهان طريقة الاستقراء على عدد n من الصيغ التي تُولف اشتقاق β من Γ, α .
 الخطوة القاعدية : $n = 1$
 إن β تكون بديهية من Q أو β تكون α أو β تنتمي إلى Γ . في هذه

\mid

الحالة نقوم باشتقاق $\alpha \rightarrow \beta$ Γ تماما بنفس الطريقة التي قمنا بها في برهان نظرية الاستنتاج في نفس حساب القضايا P.

خطوة الاستقرار : $n > 1$

نفرض أنه إذا كانت β صيغة من Q والتي يمكن اشتقاقها من $\{\alpha\} \cup \Gamma$ بدون تطبيق قاعدة التعميم على متغير حر في α ، في اشتقاق يحتوي أقل من n من الصيغ، فإن $\Gamma \frac{\alpha \rightarrow \beta}{Q}$.

الحالة 1 : β تنتج من الصيغ السابقة لها في البرهان باستخدام قاعدة الوضع. هنا أيضا يكون البرهان مماثلا لبرهان نسق حساب القضايا P.

الحالة 2 : β هي بديهية أو α تنتمي إلى Γ . هنا أيضا يكون البرهان مماثلا لبرهان نسق حساب القضايا P.

الحالة 3 : β تنتج من الصيغ السابقة لها في البرهان باستخدام قاعدة التعميم. إذن β هي $(\forall x)\gamma$ و γ تظهر مسبقا في البرهان. وهكذا فإن $\Gamma \cup \{\alpha\} \frac{\gamma}{Q}$ والبرهان يحتوي على عدد من الصيغ أصغر من n إذن $\Gamma \frac{\alpha \rightarrow \beta}{Q}$ بسبب عدم وجود تطبيق لقاعدة التعميم يحوي على متغير حر في α . كذلك فإن x لا يمكن أن يكون حرا في α لأنه متضمن في تطبيق بقاعدة التعميم في برهان β من $\Gamma \cup \{\alpha\}$. إذن برهان $\alpha \rightarrow \beta$ من Γ يكون كما يلي :

$$\left. \begin{array}{l} 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ k \alpha \rightarrow \beta \end{array} \right\} \text{اشتقاق } \alpha \rightarrow \beta \text{ من } \Gamma$$

$$k + 1 (\forall x)(\alpha \rightarrow \beta) \quad \text{التعميم } k$$

$$k + 2 (\forall x)(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\forall x)\beta) \quad (A_5) \text{ شكل البديهية}$$

الوضع $k+1, k+2$ $(\alpha \rightarrow (\forall x)\beta)$ $k+3$

إذن $\Gamma \mid \alpha \rightarrow \beta$.

نستخدم في البرهنة التالية تطبيقاً لنظرية الاستنتاج.

مبرهنة 3 $\mid \alpha \rightarrow (\forall x)(\alpha(x) \rightarrow \beta) \rightarrow ((\exists x)\alpha(x) \rightarrow \beta)$

البرهان

1. $(\forall x)(\alpha(x) \rightarrow \beta)$ م
 2. $(\forall x)(\alpha(x) \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \beta)$ (A_4)
 3. $(\alpha(x) \rightarrow \beta)$ الوضع 1,2
 4. $(\neg \beta \rightarrow \neg \alpha(x))$ حق 3
 5. $(\forall x)(\neg \beta \rightarrow \neg \alpha(x))$ التعميم 4
 6. $(\forall x)\neg \beta \rightarrow \neg \alpha(x) \rightarrow (\neg \beta \rightarrow (\forall x)\neg \alpha(x))$ (A_5)
 7. $(\neg \beta \rightarrow (\forall x)\neg \alpha(x))$ الوضع 5,6
 8. $\neg(\forall x)\neg \alpha \rightarrow \beta$ حق 7
 9. $(\exists x)\alpha(x) \rightarrow \beta$ تعريف 4
 10. $(\forall x)(\alpha(x) \rightarrow \beta) \rightarrow ((\exists x)\alpha(x) \rightarrow \beta)$ نظرية الاستنتاج 1,9
- المبرهنة 4 بشرط أن يكون $\alpha(x)$ حراً إلى x في $\alpha(x)$.

مبرهنة 4 $\alpha(a/x) \mid \neg (\exists x)\alpha(x)$

البرهان

1. $\alpha(a/x)$ م
2. $(\forall x)\neg(\alpha(x) \rightarrow \neg \alpha(a/x))$ (A_4)
3. $\neg \neg \alpha(a/x) \rightarrow \neg(\forall x)\neg \alpha(x)$ ص 2,
4. $\alpha(a/x)(\beta \leftrightarrow \neg(\forall x)\neg \alpha(x))$ حق 3,
5. $\alpha(a/x) \rightarrow (\exists x)\alpha(x)$ تعريف 4
6. $(\exists x)\alpha(x)$ الوضع 1,6

المبرهنة 4 هي قاعدة التكميم الوجودي (تك. و).
المبرهنة 5 بشرط أن يكون α حرا إلى x في $\alpha(x)$.

مبرهنة 5 $(\forall x)\alpha(x) \vdash \alpha(a/x)$
البرهان

1. $(\forall x) \alpha(x)$ م
2. $(\forall x) (\alpha(x) \rightarrow \alpha(a/x))$ (A_4)
3. $\alpha(a/x)$ الوضع 1,2

المبرهنة 5 هي قاعدة التخصيص الكلي (تك. ك).

مبرهنة 6 $(\forall x) (\forall y) \alpha(x,y) \leftrightarrow (\forall x) (\forall y) \alpha(x,y)$
البرهان

1. $(\forall x) (\forall y) \alpha(x,y)$ م
2. $(\forall y) \alpha(x,y)$ (A_4)
3. $\alpha(x,y)$ الوضع 1,2
4. $(\forall x) \alpha(x,y)$ حق 3
5. $(\forall y) (\forall x) \alpha(x,y)$ التعميم 4
6. $(\forall x) (\forall y) \alpha(x,y) \rightarrow (\forall y) (\forall x) \alpha(x,y)$ (A_5)
7. $(\forall y) (\forall x) \alpha(x,y) \rightarrow (\forall x) (\forall y) \alpha(x,y)$ الوضع 5,6
8. $(\forall x) (\forall y) \alpha(x,y) \leftrightarrow (\forall y) (\forall x) \alpha(x,y)$ حق 7

2.6 النسق الصوري لحساب المحمولات مع المساواة

النسق الصوري Q الذي مر بنا يمكننا توسيعه ليصبح نسقا صوريا
لحساب المحمولات مع المساواة (الهوية)، وذلك بإضافة صيغة الهوية التي
تكون على شكل $a = b$ (a و b حدان) إلى صيغ النسق Q. وكذلك بإضافة

شكلي البديهيتين التاليتين إلى الأشكال البديهية السابقة A_1, A_2, A_3, A_4, A_5
 للنسق Q :

شكل البديهية 6 (A_6)

($\forall x$) ($x = x$) (الخاصية الانعكاسية للمساواة)

شكل البديهية 7 (A_7)

$(x = y) \rightarrow (\alpha(x) \rightarrow \alpha(y/x))$

شرط أن يكون y حراً إلى x وحيث x, y هما أي متغيرين، $\alpha(x)$ أية صيغة و $\alpha(y/x)$ تنتج من $\alpha(x)$ وذلك باستبدال بعض (وليس بالضرورة كل) ظهور إلى x بواسطة y شرط أن يكون y حراً في $\alpha(y/x)$. وهكذا، فإن $\alpha(y/x)$ يمكن أن تحوي أو لا تحوي ظهور حر إلى x .

يمكننا، في النسق الموسع هذا، من البرهان على مبرهنات النسق Q، التي برهناها سابقاً بالإضافة إلى مبرهنات جديدة تتعلق بالمساواة. سنبرهن أدناه اثنتين منها.

$y = x \rightarrow x = y$

مبرهنة 1

البرهان

1. $x = y \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$

A_7 ، حيث $\alpha(x)$ هي

$x = x$ و $\alpha(y/x)$ هي

$y = x$

حق¹، 1

2. $(x = x) \rightarrow (x = y \rightarrow y = x)$

3. $(\forall x) (x = x)$

التخصيص الكلي، 3

(مبرهنة 4)

4. $x = x$

A_6

5. $x = y \rightarrow y = x$

الوضع 2,4

$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

¹ - باستخدام

هذه المبرهنة هي خاصية التماثل لعلاقة المساواة.

$$(x = y) \wedge (y = z) \rightarrow (x = z) \quad \text{مبرهنة 2}$$

البرهان

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. $(x = y) \wedge (y = x)$ | م |
| 2. $x = y$ | مقدمة نظرية الاستنتاج |
| 3. $y = z$ | حق 1، |
| 4. $x = y \rightarrow y = x$ | حق 1، |
| 5. $y = x$ | مبرهنة 1 |
| 6. $y = x \rightarrow (y = z \rightarrow x = z)$ | الوضع 2,4 |
| 7. $y = z \rightarrow x = z$ | A7 |
| 8. $x = z$ | الوضع 5,6 |
| 9. $(x = z) \wedge (y = z) \rightarrow (x = z)$ | الوضع 3,7 |
| | نظرية الاستنتاج 1,8 |

هذه المبرهنة هي خاصية التعدي لعلاقة المساواة.

3.6 تمارين

برهن المبرهنات التالية في النسق Q.

$$(\forall x) \alpha \leftrightarrow \alpha \quad (1)$$

$$(\exists x) \alpha \leftrightarrow \alpha \quad (2)$$

$$(\forall x) \alpha(x) \leftrightarrow (\exists x) \alpha(x) \quad (3)$$

الفصل السابع

Truth Trees

أشجار الصدق

لقد استخدمنا جداول الصدق للأغراض التالية :

أولاً، تحديد نوع الصيغ، أي في ما إذا كانت : تكرارية، عارضة، أم متناقضة.

ثانياً، تحديد صحة الحجج في ما إذا كانت : صحيحة أم خاطئة.

ثالثاً، تحديد اتساق أو عدم اتساق الصيغ.

رابعاً، تحديد العلاقتين (ينتج) و(يكافئ) بين الصيغ.

إن استخدام جداول الصدق يكون ممكناً وعملياً، إذا كان عدد المتغيرات القضائية 3 على الأكثر، ذلك أننا نعلم أن عدد أسطر الجدول يكون 2^n (حيث n عدد المتغيرات القضائية). وهكذا فإذا كان $n = 6$ فإن عدد أسطر الجدول يكون $2^6 = 64$. أما إذا كان $n = 18$ فإن عدد أسطر الجدول يساوي 144, 262 سطرًا وسيحتوي الجدول في هذه الحالة على 31 مليون T و F . أما الشخص الذي يملأ للجدول في هذه الحالة بمعدل رمز لكل ثانية وبدون توقف فإنه سيقضي سنة من أجل تكملة الجدول. كذلك فإن الجداول لا تكن نافعة (كما رأينا سابقاً) في حساب المحمولات.

إن التغلب على نواقص جداول الصدق في عدم عمليتها وعدم شموليتها يتم باستخدام طريقة أشجار الصدق، حيث يتم التغلب على مسألة


عدد المتغيرات القضائية وكذلك فإن هذه الطريقة تشمل حساب المحمولات أيضا بالإضافة إلى حساب القضايا.

إن تبديد الوقت الذي يتم باستخدام الجداول لتحديد صحة الحجج يكون عن طريق النظر إلى جميع قيم الصدق الممكنة، الصادقة والكاذبة، للمتغيرات القضائية. ولكن أكثر قيم الصدق هذه لا تهمننا مثلا، عند تحديد صحة الحجج، إن ما يهمنا هو تلك القيم التي تجعل جميع المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. وهكذا فلا تهمننا قيم الصدق الممكنة للمتغيرات القضائية التي تجعل المقدمات كاذبة أو تجعل النتيجة صادقة.

تقوم أشجار الصدق بعمل معاكس لما نفعله عند إعطاء مثال مضاد، الذي يقوم على أخذ النتيجة كاذبة وإعطاء قيم صدق للمتغيرات القضائية، بحيث تكون المقدمات صادقة. العمل المعاكس لهذا المثال المضاد يقوم على أخذ النتيجة كاذبة والمقدمات صادقة ثم البحث عن قيم الصدق الممكنة للمتغيرات القضائية التي تقود إلى ذلك. فإذا وجدت مثل هذه القيم فالحجة خاطئة وإذا لم توجد فالحجة صحيحة.

1.7 بناء أشجار الصدق Construction of Truth Trees

في قمة شجرة الصدق يكون (الجذر) وفي أسفلها تكون (الرؤوس) أو (الأوراق). الطريق الذي يتجه مباشرة من الجذر إلى الرأس يسمى (الفرع). والشجرة التي تمتلك أكثر من فرع تتفرع حيث تتفرق الطرق. وبتلك الشجرة عددا من الفروع مساوي لعدد الرؤوس. أما جزء الشجرة فوق جميع التفروعات فيسمى (جذعا).



الصيغ على جذع الشجرة تظهر على كل فرع. بعض الصيغ يشار إليها بواسطة علامة الإنجاز ✓ وذلك للدلالة على أنه قد تم إنجاز (تطبيق) قواعد اشتقاق على تلك الصيغ. وهكذا يمكننا إهمال الصيغ المنجزة وتبقى الصيغ غير المنجزة. والفروع التي تظهر عليها صيغ ونفيها غير منجزة تسمى فروعاً مغلقة. الأشجار التي تكون جميع فروعها مغلقة تسمى أشجار مغلقة.

نستطيع الآن إعطاء ما يلي :

1. يكون فرع الشجرة مغلقاً إذا وفقط إذا كانت صيغة ونفيها تظهران غير منجزتين عليه.
2. تكون الشجرة مغلقة إذا وفقط إذا كانت جميع فروعها مغلقة، وإلا تكون مفتوحة.

سنشير إلى الفرع المغلق بواسطة العلامة \times . والإغلاق يبين نهاية عملية بناء الشجرة.

إننا نقوم ببناء أشجار الصدق وذلك باستخدام قواعد اشتقاق.
مثال

سنستخدم شجرة الصدق لتحديد في ما إذا كانت صورة الحجة التي تسمى قاعدة الوضع $\frac{K \rightarrow L, K}{L}$ صحيحة كالتالي :

$K \rightarrow L$


K

$\neg L$

تقوم شجرة الصدق على افتراض أن $K \rightarrow L$ و K صادقتين وأن L كاذبة. فإذا كان ممكنا تعيين قيم صدق بحيث تكون الصيغ $K \rightarrow L$ ، K ، $\neg L$ صادقة في نفس الوقت، فصورة الحجة خاطئة وبالتالي فإن قاعدة الوضع ليست صحيحة وإذا كان مستحيلا الحصول على هذا التعيين فإن صورة الحجة خاطئة وقاعدة الوضع صحيحة. إن قواعد اشتقاق أشجار الصدق تبين فيما إذا كان ممكنا إيجاد تعيين قيم صدق بحيث تكون الصيغ الأولية (التي نبدأ بها) صادقة. وهكذا فإن شجرة الصدق تبدأ بمجموعة افتراضات حول صدق أو كذب صيغ معينة (في مثالنا هذا، تم افتراض صدق $K \rightarrow L$ و K وافتراض كذب L).

نحن نضع هذا الافتراض على شكل صيغ على شجرة الصدق وبتطبيق قواعد اشتقاق نحصل على صيغ أخرى نقوم بتحديد فروع الشجرة. سنستخدم شجرة الصدق لمعرفة ذلك التعيين لقيم الصدق الذي يجعل افتراضاتنا الأولية ممكنة (وفي حالتنا نحاول إيجاد تعيين قيم صدق إلى K و L بحيث تكون كل من الصيغتين $L \rightarrow K$ و K صادقة و L كاذبة). إن فرع الشجرة يناظر سطر من جدول الصدق.

إن ما نقوم به هو تطبيق قواعد اشتقاق والتأشير على الصيغ بعلامة الإنجاز \checkmark . فبالنسبة إلى قاعدة الوضع، مثلا نقوم بتطبيق قاعدة الاستلزام (كما سنرى في الفقرة القادمة) ونحصل على شجرة الصدق التالية :




لقد قمنا بالتحقق (أي بوضع علامة الإنجاز \checkmark) من الصيغة $K \rightarrow L$ لتبيان أننا قد طبقنا قاعدة اشتقاق عليها وهكذا فلن يكون لها لاحقا أي دور في شجرة الصدق. كذلك قمنا بتفريع الشجرة إلى فرعين وذلك للإشارة إلى أنه يجب علينا دراسة إمكانييتين. فإذا كانت $L \rightarrow K$ صادقة فإنه (حسب جدول

صدق الاستلزام \bar{K} أو L صادقة. وبما أن الفروع تكون مغلقة إذا ظهرت عليها صيغة ونفيها فإن الفرعين مغلقين. فالفرع الأيسر عليه K و \bar{K} والفرع الأيمن عليه L و \bar{L} :

✓ $K \rightarrow L$

K

\bar{L}



أشجار الصدق، مثل تلك أعلاه، حيث جميع فروعها مغلقة تسمى مغلقة أيضا. عندما تغلق جميع الفروع فإن ما نستنتجه هو أنه لا توجد إمكانية لجعل جميع الصيغ الأولية صادقة في نفس الوقت. إن مثالنا أعلاه يبين أن شجرة صدق الوضع مغلقة وهذا يبين أنه لا توجد إمكانية لجعل كل من K و $L \rightarrow K$ صادقة و L كاذبة وهذا يبرهن أن الوضع هي صورة حجة صحيحة.

2.7 قواعد اشتقاق أشجار الصدق

1. قاعدة النفي \neg

إن قواعد اشتقاق أشجار الصدق تعكس تعاريف دوال الصدق. وهنا يمكننا أن نعبر عن تعريف النفي بواسطة الجدول على الشكل التالي:

$\neg K$ تكون صادقة إذا وفقط إذا كانت K كاذبة.

إن هذا يعني أن $\neg \neg K$ تكون صادقة إذا وفقط إذا كانت K كاذبة، وإن $\neg K$ كاذبة إذا وفقط إذا كانت K صادقة. وإذن $\neg \neg K$ صادقة إذا وفقط إذا كانت K صادقة. كما أن K تكافئ $\neg \neg K$ ، وهكذا يمكننا حذف رموز أزواج النفي المتجاورة. الآن يمكننا إعطاء القاعدة التالية:

2. قاعدة النفي المزدوج $\neg \neg$

✓ $\neg \neg K$
 K

3. قاعدة الوصل \wedge

قاعدة الوصل تشتق من تعريف دالة صدق الوصل:


$K \wedge L$ تكون صادقة إذا وفقط إذا كانت K صادقة و L صادقة.

✓ $K \wedge L$

4. قاعدة نفي الوصل $\neg \wedge$


K
 L

يجب علينا هنا الجواب على السؤال التالي: متى تكون الصيغة $(K \wedge L)$ صادقة؟ أو، متى تكون $K \wedge L$ كاذبة؟. هنالك إكمانيتان هما: K كاذبة أو L كاذبة. وللتعبير عن هذين الاختيارين فإننا نقوم بالتفريع إلى فرعين أحدهما يعكس إمكانية أن K كاذبة وذلك بكتابة $\neg K$ وعلى الثاني نكتب $\neg L$ للتعبير عن إمكانية أن L كاذبة. وهكذا فإن هذه القاعدة تأخذ الشكل:



5. قاعدة الفصل \vee

$K \vee L$ تكون صادقة إذا فقط إذا كانت K صادقة أو L صادقة.



6. قاعدة نفي الفصل $\neg \vee$

يجب علينا الآن الجواب على السؤال: متى تكون الصيغة $\neg(K \vee L)$ صادقة؟، أو متى تكون $K \vee L$ كاذبة؟. الجواب: عندما تكون K كاذبة و L كاذبة.

$$\checkmark \quad \neg(K \vee L)$$

$$\neg K$$


$$\neg L$$

7. قاعدة الاستلزام \rightarrow

نستطيع التعبير عن تعريف دالة صدق الاستلزام على الشكل التالي:

$$K \rightarrow L \text{ تكون صادقة إذا وفقط إذا كانت } K \text{ كاذبة أو } L \text{ صادقة.}$$

تطبق هذه القاعدة على الصيغ الشرطية (الاستلزمات). الآن سؤالنا هو: متى يكون الاستلزام صادقا؟. جدول صدق تعريف الاستلزام يشير إلي أن $K \rightarrow L$ تكون كاذبة إذا كانت K صادقة و L كاذبة. وإذن $K \rightarrow L$ تكون صادقة إذا كانت K كاذبة أو L صادقة. هاتان الإمكانيتان تقودان إلي التفريع التالي:



8. قاعدة نفي الاستلزام $\neg \rightarrow$

الصيغة $\neg (K \rightarrow L)$ تكون صادقة أو أن $K \rightarrow L$ تكون كاذبة في

الحالة التي تكون فيها K صادقة و L كاذبة :

$$\checkmark \neg (K \rightarrow L)$$

$$\begin{array}{c} K \\ \neg L \end{array}$$

9. قاعدة الاستلزام الثنائي \leftrightarrow

قاعدة الاستلزام الثنائي تعكس أيضا تعريفه.

الصيغة $K \leftrightarrow L$ تكون صادقة إذا وفقط إذا تساوت قيم صدق K مع قيم صدق L.


إذا كانت $L \leftrightarrow K$ صادقة فإن K و L يجب أن تمتلكان نفس قيم الصدق. أي أن K و L يجب أن تكونا صادقتين معا أو كاذبتين معا. أي أن هنالك إكثانيتين ويجب التفريع:

$$\begin{array}{c} \checkmark K \leftrightarrow L \\ / \quad \backslash \\ K \quad \neg K \\ L \quad \neg L \end{array}$$

10. قاعدة نفي الاستلزام الثنائي $\neg \leftrightarrow$

إذا كانت $L \leftrightarrow K$ كاذبة فإن K و L يجب أن تمتلكان قيم صدق مختلفة. أي أن K صادقة و L كاذبة أو أن L صادقة و K كاذبة. هنا أيضا يجب التفريع للتعبير عن هاتين الإكثانيتين.

✓ $\neg(K \leftrightarrow L)$



3.7 تطبيقات أشجار الصدق

1. تحديد صحة صور الحجج

أمثلة

1. أفضئ شجرة الصدق وحدد صحة صورة الحجة التالية.

المقدمات: $K \rightarrow L, L \rightarrow N, K$

النتيجة: N

1

✓ $K \rightarrow L$

2

✓ $L \rightarrow N$

3

K

4

$\neg N$

5

$\neg K$

L

6

x

7

$\neg L$

N

8

x


x

لقد بدأنا بكتابة المقدمات ونفي النتيجة. وقمنا بتطبيق قاعدة الاستلزام على الخط 1 فحصلنا على الخط 5 . الفرع الأيسر أغلق على الخط 6 لوجود K و $\neg K$ عليه. ولكن الفرع الأيمن بقي مفتوحا ولهذا طبقنا قاعدة الاستلزام على الخط 2 فحصلنا على الخط 7. الفرعان الباقيان تم غلقهما لوجود L و $\neg L$ على الأيسر ولوجود N و $\neg N$ على الأيمن. وهكذا تكون الشجرة مغلقة وبالتالي فلا توجد إمكانية لجعل المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. إذن صورة الحجة صحيحة.

2. أنشئ شجرة الصدق وحدد صحة صورة الحجة التالية :

المقدمات : $\neg (K \wedge L)$

النتيجة $\neg K \wedge \neg L$




هنا أيضا بدأنا بالمقدمة ونفي النتيجة وقمنا بتطبيق قاعدة نفي الوصل عليهما
 فحصلنا على الخططين 3 و4. وقد تم غلق الفرعين في أقصى اليسار لوجود
 $\neg K$ و $\neg K$ وفي أقصى اليمين لوجود L و $\neg L$. وبقي فرعان مفتوحان
 حتى بعد تطبيق النفي المزدوج. وبما أنه لا يمكننا تطبيق أكثر لقواعد اشتقاق
 فالشجرة منتهية وهذا يعني وجود إمكانية لجعل المقدمة ونفي النتيجة
 صادقتين في نفس الوقت وبالتالي فصورة الحجة خاطئة.

3. أنشئ شجرة الصدق وحدد فيما إذا كانت صورة الحجة التالية صحيحة

المقدمات: $K, K \rightarrow L$

النتيجة: $K \leftrightarrow L$




بما أن الشجرة المنتهية مغلقة فإن صورة الحجة صحيحة.

2. تحديد اتساق أو عدم اتساق الصيغ

تعتبر شجرة الصدق مفيدة لأغراض أخرى غير تحديد صحة صور الحجج. فمجموعة من الصيغ تكون متسقة إذا احتوت شجرة الصدق على الأقل على فرع واحد منتهي مفتوح لأن هذا يعني وجود إمكانية جعل جميع الصيغ صادقة في نفس الوقت أو أنها متسقة. وإذا كانت الشجرة المنتهية لا تحتوي على أي طريق مفتوح فإن مجموعة الصيغ المعطاة تكون غير متسقة.

مثال 1


لنأخذ الصيغ التالية : $K \wedge L, \neg(L \wedge M), M \vee N$



لقد قمنا بتطبيق قاعدة ٨ على الخط 1 فحصلنا على الخطين 4 و5،
 ثم طبقنا قاعدة ٨ على الخط 2 فحصلنا على الخط 6، وأخيرا طبقنا قاعدة
 ٧ على الخط 3 فحصلنا على الخط 8. لا نستطيع الآن القيام بتطبيق أكثر
 لقواعد الاستنتاج. نرى أن الفرع في أقصى اليسار مغلقا لوجود L و $\neg L$ عليه
 وكذلك، فإن الفرع الأوسط مغلقا لوجود M و $\neg M$ عليه. ولكن، الفرع في
 أقصى اليمين مفتوح لعدم وجود صيغة نرية ونفيها عليه. وبما أن هذا الفرع
 يقول بوجود إمكانية أن تكون الصيغ الأولية كلها صادقة في نفس الوقت فإن
 هذه الصيغ تكون متسقة (حسب تعريف الاتساق).

مثال 2

لنأخذ الصيغ التالية : $K \vee L, \neg(L \vee M), M \vee \neg K$




لقد قمنا بتطبيق قاعدة \vee على الخط 1 فحصلنا على الخط 4، ثم طبقنا قاعدة \vee على الخط 2 فحصلنا على الخطين 5 و6، وأخيرا طبقنا قاعدة \vee على الخط 3 فحصلنا على الخط 8. نرى أن الفرع في أقصى اليسار مغلقا لوجود M و $\neg M$ عليه وكذلك، فإن الفرع الأوسط مغلقا لوجود K و $\neg K$ عليه. كما أن الفرع في أقصى اليمين مغلقا لوجود L و $\neg L$ عليه. وهكذا، فالشجرة المنتهية مغلقة. إذن لا توجد إمكانية لجعل جميع الصيغ الأولية كلها صادقة في نفس الوقت وبالتالي، فإن هذه الصيغ تكون غير متسقة.

3. تحديد نوع الصيغ

1. تكون الصيغة α تكرارية إذا وفقط إذا كانت جميع الفروع على الشجرة المنتهية للصيغة α مغلقة.

مثال أنشئ شجرة للصدق وحدد تكرارية الصيغة :



بدأنا بكتابة نفي الصيغة المعطاة على الخط 1 تم تطبيق القاعدة \neg على الخط 1 فحصلنا على الخطين 2 و3. وطبقنا القاعدة \rightarrow على الخط 2 فحصلنا على الخطين 4 و5. بتطبيق القاعدة \wedge على الخط 3 حصلنا على الخط 6. الفرع الأيسر مغلق لوجود K و K عليه والفرع الأيمن مغلق لوجود L و L عليه وبما أن جميع الفروع مغلقة فإنه لا توجد إمكانية لجعل نفي الصيغة صادقة وبالتالي فالصيغة تكرارية.


2.. تكون الصيغة α متناقضة إذا وفقط إذا كانت جميع فروع شجرة الصدق المنتهية للصيغة α مغلقة.

3. تكون الصيغة α عارضة إذا وفقط إذا كانت جميع فروع شجرة الصدق المنتهية للصيغة α مفتوحة وكانت شجرة الصدق المنتهية للصيغة α مفتوحة أيضا.


مثال

أنشئ شجرة الصدق للصيغة $L \leftrightarrow K$ وحدد فيما إذا كانت عارضة أم غير عارضة.

(1) شجرة صدق الصيغة



(2) شجرة صدق نفي الصيغة




نرى أن شجرة الصيغة $L \leftrightarrow K$ المنتهية مفتوحة لوجود فرعين مفتوحين فيها. نرى كذلك أن شجرة الصيغة $(L \leftrightarrow K)$ مفتوحة أيضا وإذن، تكون الصيغة $L \leftrightarrow K$ عارضة.
4. تستخدم أشجار الصدق أيضا لتحديد التكافؤ.

الصيغتان المتكافئتان هما اللتان تمتلكان نفس قيم الصدق. أي أنه لا يوجد تعيين قيم صدق لمتغيراتها القضائية يجعل أحدهما صادقة والأخرى كاذبة. ولاختبار ذلك نقوم بإنشاء شجرتين. لناخذ الصيغتين α و β . شجرة الصدق الأولى تبدأ بفرض أن β صادقة و α كاذبة وشجرة الصدق الثانية تبدأ بفرض أن β كاذبة و α صادقة. إذا كانت الشجرتان مغلقتين فهذا يعني عدم وجود تعيين يجعل للصيغتين قيم مختلفة وهكذا يتحقق التكافؤ. وإذا كانت إحدى الشجرتين على الأقل مفتوحة فهذا يعني وجود تعيين يجعل إحدى الصيغتين صادقة والأخرى كاذبة وبالتالي تكون الصيغتان غير متكافئتين.

مثال


حدد فيما إذا كانت الصيغتان $K \rightarrow L$ ، $\neg L \rightarrow \neg K$ متكافئتين أم غير متكافئتين.

1. الشجرة الأولى



طبقا قاعدة \rightarrow على الخط 2 فحصلنا الخطين 3 و4. وطبقنا قاعدة

\rightarrow على الخط 1 فحصلنا على الخط 5 الشجرة مغلقة.



وهذه أيضا مغلقة وإذن يتحقق التكافؤ.

4.7 أشجار الصدق في حساب المحمولات

نستطيع تعميم استخدام طريقة أشجار الصدق ليشمل حساب المحمولات. نشير هنا أننا يمكننا من تفسير $(\forall x)Px$ على أنه وصل لا نهائي من المعطوفات حيث أن مجموعة تعريف Px هي المجموعة اللانهائية

$$:M = \{ a_1, a_2, \dots \}$$

$$(\forall x)Px \Leftrightarrow Pa_1 \wedge Pa_2 \wedge \dots$$

إن كل من هذه المعطوفات تمثل جزء من شروط صدق الصيغة $(\forall x)Px$. ولكنه من المستحيل كتابة هذه الشروط كلها في شجرة الصدق لأنها لا نهائية.

نشير هنا إلى أنه حتى شجرة الصدق لا تعطينا طريقة كاملة لتحديد صحة الحجج في حساب المحمولات.

سنحاول الآن كتابة شروط الصدق بالنسبة للمكم الكلي $(\forall x)Px$:

$$(\forall x)Px$$

$$Pa_1$$

$$Pa_2$$


$$Pa_3$$

...

وبالمثل نستطيع تفسير $(\exists x) Px$ على أنه فصل لا نهائي من المفصولات حيث أن مجموعة تعريف Px هي المجموعة اللانهائية $M = \{ a_1, a_2, \dots \}$

$$(\exists x)Px \Leftrightarrow Pa_1 \vee Pa_2 \vee \dots$$

شروط الصدق بالنسبة للمكتم الجزئي $(\exists x)Px$:



مثال 1

أنشئ شجرة صدق الحجة التالية :

كل شيء جميل

الورد جميل

الترجمة :

$$\frac{(\forall x)Px}{Pa}$$

حيث Px : x يكون جميل، a : الورد، Pa : الورد جميل.

شجرة الصدق كاملة تكون كما يلي :

$$\begin{array}{l} (\forall x)Px \\ \quad \downarrow \\ \quad Pa \\ \quad Pa \\ \quad x \end{array}$$

إن قواعد شجرة الصدق المعممة تستخدم قواعد شجرة حساب القضايا التي مرت بنا بالإضافة إلى 6 قواعد جديدة وهي المتعلقة بالصيغ المحتوية على الكممين وعلى الهوية.

بما أن حساب المحمولات مع الهوية يمتلك 3 رموز لا يتضمنها حساب القضايا وهي \forall ، \exists ، = ونحن نحتاج إلى قاعدتين لكل منهم (واحدة للصيغة المنفية وأخرى للصيغة غير المنفية) التي تظهر فيهم فإذن، توجد 6 قواعد جديدة في أشجار حساب المحمولات. سنبدأ أولاً بقاعدة التكميم الكلي.

I. قاعدة المكمم الكلي \forall

إذا ظهرت صيغة على الشكل $\alpha (x \forall)$ على فرع مفتوح فإنه إذا كان a حداً ثابتاً في صيغة ما على هذا الفرع فنكتب $\alpha(a/x)$ (التي هي نتيجة استبدال كل ظهور للمتغير x في α بواسطة a) أسفل الفرع. إذا لم تظهر أية صيغة تحوي حداً ثابتاً فإننا نختار حداً ثابتاً a ونكتب $\alpha(a/x)$ أسفل الفرع. وفي كل الحالات لا نحقق (لا نكتب \checkmark) $\alpha (x \forall)$.

إننا لا نحقق هذه الصيغة، وذلك لأنه مهما اشتققنا من صيغ بواسطة القاعدة \forall فإننا لا نستنفذ كل تطبيقاتنا. ولكن بالرغم من أن الصيغ المكممة كلياً لا تحقق أبداً فإن أشجارها يمكن أن تغلق (في هذه الحالة صورة الحجة تكون صحيحة) أو يمكن الوصول إلى نقطة تكون عندها الشجرة غير مغلقة ولا توجد قواعد أكثر يمكن تطبيقها (في هذه الحالة تكون صورة الحجة خاطئة).

مثال 2

أنشئ شجرة صدق صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم

خاطئة: $(\forall x)(Kx \rightarrow Lx), (\forall x) Kx$

	La	
1	$(\forall x)(Kx \rightarrow Lx)$	
2	$(\forall x) Kx$	
3	$\neg La$	
4	$\checkmark \quad Ka \rightarrow La$	
5	Ka	
	\swarrow	\searrow
6	$\neg Ka$	La
7	x	x

بما أن الحد الثابت a يظهر على $\neg La$ (الخط 3) فإنه يكون الحد الذي نستخدمه للحصول على الخطين 4 و5 باستخدام قاعدة التكميم الكلي. ولكن الشجرة أصبحت مغلقة بعد تطبيق قاعدة الاستلزام وهذا يبين أن صورة الحجة صحيحة.

2. قاعدة نفي الكمم الجزئي $\neg \exists$

إذا ظهرت صيغة غير محققة على الشكل $\alpha (\exists x)$ على فرع مفتوح فإننا نقوم بتحقيقها ونكتب $\alpha (\forall x)$ أسفل كل فرع مفتوح يحوي الصيغة المحققة.

3. قاعدة نفي الكمم الكلي $\neg \forall$

إذا ظهرت صيغة غير محققة على الشكل $\alpha (\forall x)$ على فرع مفتوح فإننا نقوم بتحقيقها ونكتب $\neg \alpha (\exists x)$ أسفل كل فرع مفتوح يحوي الصيغة المحققة.

مثال 3

أنشئ شجرة صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم خاطئة :

$$\frac{(\forall x)(Kx \rightarrow Lx), \neg(\exists x)Lx}{\neg Ka}$$

1		$(\forall x)(Kx \rightarrow Lx)$
2	✓	$\neg(\exists x)Lx$
3	\neg	$\neg Ka$
4	$(\forall x)$	$\neg Lx$
5	\neg	La
6	✓	$Ka \rightarrow La$
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px; margin: 0 auto 10px auto;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p style="padding: 5px;">7</p> <p style="padding: 5px;">$\neg Ka$</p> <p style="padding: 5px;">x</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p style="padding: 5px;">La</p> <p style="padding: 5px;">x</p> </div> </div> </div> </div>		

لقد طبقنا قاعدة نفي التكميم الجزئي على الخط 2 وحصلنا على الخط

4. وطبقنا قاعدة التكميم الكلي على 4 فحصلنا على الخط 5 ثم طبقنا قاعدة

التكميم الكلي على الخط 1 فحصلنا على الخط 6. وأخيرا طبقنا قاعدة الاستلزام على الخط 6 فحصلنا على الخط 7. صورة الحجة صحيحة.

4. قاعدة المكمم الجزئي \exists

إذا ظهرت الصيغة على الشكل $\alpha(x)$ على فرع مفتوح فإننا نقوم بتحقيقها ثم نقوم باختيار حد ثابت والذي لم يظهر لحد الآن على هذا الفرع ونكتب $\alpha(a/x)$ (التي هي نتيجة استبدال كل ظهور للمتغير x في α بواسطة a) أسفل كل فرع مفتوح يحتوي الصيغة المحققة.

مثال 4

أنشئ شجرة صدق صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم

$$(\exists x)Kx$$

خاطئة :

$$(\forall x)Kx$$

1	✓	$(\exists x)Kx$
2	✓	$\neg(\forall x)Kx$
3		Ka
4	✓	$(\exists x)\neg Kx$
5		$\neg Kb$

لقد أدخلنا الحد الثابت a باستخدام القاعدة \exists على الخط 3. واستبدلنا الصيغة $\neg(\forall x)Kx$ بواسطة مكافئتها الجزئية على الخط 4. كما أدخلنا بعد ذلك حدا ثابتا آخر b مع تطبيق ثاني للقاعدة \exists (قاعدة المكمم الجزئي تتطلب أن يكون الحد الثابت الثاني مختلفا عن الأول). لا يوجد تطبيق لقواعد

أخرى والشجرة المنتهية تحوي على فرع واحد مفتوح. وهكذا فإن المقدمة ونفي النتيجة تكون صيغ متنسقة وبهذا فإن صورة الحجة خاطئة.

مثال 5

أنشئ شجرة صدق صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم خاطئة :

$$\frac{(\forall x)(\forall y)(Kxy \rightarrow \neg Kyx)}{\neg(\exists x)Kxx}$$

1		(∀x)(∀y)(Kxy → ¬Kyx)
2	✓	¬¬(∃x)Kxx
3	✓	(∃x)Kxx
4		Kaa
5		(∀y)(Kay → ¬Kya)
6	✓	(Kaa → ¬Kaa)
7		¬Kaa ¬Kaa
8		x x

لقد طبقنا قاعدة المكتم الوجودي على الخط 3 قبل تطبيق قاعدة المكتم الكلي على الخطين 5 و6 لأن هذا يقلل من طول الأشجار بشكل عام. وصورة الحجة صحيحة.

مثال 6

أنشئ شجرة صدق صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم خاطئة :

$$\frac{(\forall x)(\exists y)Lxy}{Laa}$$

1		$(\forall x)(\exists y)Lxy$
2		$\lceil Laa$
3	✓	$(\exists y)Lay$
4		Lab
5	✓	$(\exists y)Lby$
6		Lbc
7	✓	$(\exists y)Lcy$
8		Lcd
		.
		.
		.

الشجرة أعلاه لن تصل إلى نهايتها لأنها لا نهائية الطول. لقد طبقنا قاعدة التكميم الكلي على الخط 1 وهكذا نتجت صيغة مكتملة جزئية جديدة على الخط 3. تطبيق القاعدة \exists على هذه الصيغة الجديدة على الخط 4 أنتج

حد ثابت b . وبما أن الصيغة المكتملة كلياً على الخط I غير محققة فيجب تطبيق القاعدة \vee مرة أخرى بالنسبة إلى b وبهذا نتجت صيغة مكتملة جزئية جديدة وهذه بدورها أدخلت حداً ثابتاً جديداً c على الخط 6 لكن هذا يتطلب تطبيق القاعدة \vee على الخط I بالنسبة إلى c وهكذا دواليك. وهكذا فالشجرة لا يمكن أن تنتهي وبالتالي لا تعطي جواباً. المثال أعلاه يبين أن حساب المحمولات غير قابل للحكم (أي لا توجد طريقة فعالة للحكم على صحة صورة حجة فيما إذا كانت صحيحة أم خاطئة).

5.7 أشجار صدق الهوية

يمكن استخدام أشجار الصدق في صور الحجج المحتوية على علاقة الهوية (=). إن هذا يتطلب إدخال قاعدتين جديدتين.

1. قاعدة الهوية =

إذا ظهرت صيغة على الشكل $a = b$ على فرع مفتوح، فإنه إذا ظهرت صيغة γ غير محققة وتحتوي الحدين a أو b فإننا نقوم أسفل الفرع بكتابة أية صيغة ليست على الفرع والتي تكون نتيجة استبدال ظهور واحد أو أكثر لأي من هذين الحدين بواسطة الحد الآخر في γ . لا يتم تحقيق أي من $a = b$ أو γ .

مثال 7

أنشئ شجرة صدق صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم خاطئة :

$$a = b$$

$$Kab \rightarrow Kba$$

1	$a = b$
2	$\lceil (Kab \rightarrow Kba)$
3	$\checkmark \lceil (Kaa \rightarrow Kaa)$
4	Kaa
5	$\lceil Kaa$
6	x

لقد قمنا على الخط 3 باستبدال ظهور b في الصيغة على الخط 2 بواسطة a باستخدام قاعدة الهوية. صورة الحجة صحيحة.

2. قاعدة نفي الهوية = \lceil

يغلق أب فرع مفتوح تكون عليه صيغة على الشكل $(\alpha = \alpha)$ \lceil

مثال 8

أنشئ شجرة صدق صورة الحجة التالية وحدد فيما إذا كانت صحيحة أم خاطئة:

$$\frac{a = b}{b = a}$$

1	$a = b$
2	$\lceil (b = a)$
3	$\lceil (a = a)$
4	x

لقدّم قّما على الخط 3 باستبدال ظهور b على الخط 2 بواسطة a
وهكذا حصلنا على الصيغة $\neg(a = a)$ التي أغلقت الشجرة باستخدام قاعدة
نفي الهوية.

6.7 تمارين

(i) باستخدام أشجار الصدق حدد، فيما إذا كانت كل من الصيغ التالية
تكرارية، عارضة أم متناقضة.

$$(1) \neg(L \rightarrow (K \wedge \neg K))$$

$$(2) (K \leftrightarrow (\neg K \rightarrow K))$$

$$(3) (K \rightarrow K) \rightarrow (L \wedge \neg L)$$

$$(4) ((K \rightarrow L) \leftrightarrow \neg(K \wedge \neg L))$$

$$(5) (K \rightarrow (L \rightarrow M)) \rightarrow ((K \rightarrow L) \rightarrow (K \rightarrow M))$$

(ب) حدد فيما إذا كانت كل من مجموعات الصيغ التالية متسقة أم غير
متسقة، وذلك باستخدام أشجار الصدق :

$$(1) \neg K \vee L, \neg((\neg L \wedge M) \rightarrow \neg K)$$

$$(2) (\neg L \wedge M) \rightarrow \neg K, \neg(\neg K \vee L)$$

$$(3) K \rightarrow L, M \rightarrow L, \neg(K \rightarrow M)$$

$$(4) K \vee L, K \rightarrow L, \neg L$$

$$(5) K \leftrightarrow L, \neg\neg(K \leftrightarrow M)$$

(ج) باستخدام أشجار الصدق حدد فيما إذا كانت صور التالية صحيحة أم خاطئة.

$K \rightarrow (L \wedge (M \vee))$	(1) المقدمات
$K \rightarrow L$	النتيجة
$K \rightarrow (L \vee M), \neg L \wedge K$	(2) المقدمات
M	النتيجة
$K \vee (L \wedge M), K \rightarrow L$	(3) المقدمات
$L \wedge N$	النتيجة
$K \rightarrow (L \rightarrow M)$	(4) المقدمات
$(K \wedge L) \rightarrow M$	النتيجة
$(K \wedge L) \rightarrow M$	(5) المقدمات
$K \rightarrow (L \rightarrow M)$	النتيجة

(د) باستخدام أشجار الصدق حدد فيما إذا كانت أزواج الصيغ التالية متكافئة أم غير متكافئة.

$$\neg K \rightarrow L, \neg(K \rightarrow L) \quad (1)$$

$$\neg(K \wedge L), \neg K \wedge \neg L \quad (2)$$

$$((K \leftrightarrow L) \wedge K), L \quad (3)$$

(هـ) باستخدام أشجار الصدق، حدد فيما إذا ما كنت كل من مجموعات الصيغ التالية متسقة أم غير متسقة.

$$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x), (\exists x) K_x, \neg(\exists x) L_x \quad (1)$$

$$K_{ab}, (\exists x) K_x, (\forall x) (K_x \rightarrow L_{xx}) \quad (2)$$

$$(\exists x) (K_x \wedge \neg L_x), (\forall x) (M_x \rightarrow L_x), (\forall x) (K_x \rightarrow M_x) \quad (3)$$

$$\neg((\exists x) K_x \rightarrow (\exists y) L_y), (\forall x) (K_x \rightarrow L_x) \quad (4)$$

(و) باستخدام أشجار الصدق حدد فيما إذا كانت صور التالية صحيحة أم خاطئة.

$$\frac{(\forall x) K_x \rightarrow (\forall x) L_x, \neg(\exists x) L_x}{(\exists x) \neg K_x} \quad (1)$$

$$\frac{(\exists x) K_x, (\exists x) L_x}{(\exists x) (K_x \wedge L_x)} \quad (2)$$

$$\frac{(\exists x) (\forall x) K_{xy}}{(\forall x) (\exists x) K_{yx}} \quad (3)$$

$$\frac{K_a \wedge (L_a \wedge M_a), (\forall x) (L_x \rightarrow N_x), (\forall x) (L_x \rightarrow O_x)}{P_a} \quad (4)$$

$$\frac{a = b}{K_{ab} \rightarrow K_{ba}} \quad (5)$$

$$a = b \mid - b = a \quad (6)$$

حلول التمارين

الفصل الأول - 6.1

(i)

1) ذهب أحمد إلى المكتبة : K ، ذهب علي إلى المكتبة : L

الترجمة : $K \wedge L$.

2) المثلث ABC قائم الزاوية : K ، المثلث ABC متساوي الساقين : L

الترجمة : $K \wedge L$.

3) أحمد يذهب إلى المدرسة : K ، علي يذهب إلى المدرسة : L

الترجمة : $K \wedge L$.

4) العدد $a > b$: K ، العدد $b > a$: L

الترجمة : $K \vee L$.

5) مماثل إلى 4

6) المستقيم a عمودي على c : K ، المستقيم b عمودي على c : L ،

M : $a \parallel b$

الترجمة : $(K \wedge L) \rightarrow (M \vee M)$.

7) تتدمر الحضارة البشرية : K ، اندلعت الحرب الذرية : L

الترجمة : $L \rightarrow K$.

8) $a < 0$: N ، $b > 0$: M ، $a > 0$: L ، $ab > 0$: K

$0 : b < 0$

الترجمة : $K \rightarrow ((L \wedge M) \vee (N \wedge O))$.

(9) مماثلة إلى 8)

$L : -c < -b$ ، $K : b < c$ (10)

الترجمة : $K \leftrightarrow L$.

11) مقياس المنطق صعب : K ، احمد ينجح في المنطق : L ، فاطمة تنجح

في المنطق : M ، حضرا المحاضرات : N

الترجمة : $K \rightarrow ((L \wedge M) \leftrightarrow N)$.

(ب)

1) إذا حضر أحمد الاجتماع، فإن علي يحضر الاجتماع.

2) إذا حضرت خلود الاجتماع، فإن أحمد لن يحضر الاجتماع.

3) أحمد يحضر الاجتماع إذا فقط إذا حضرت خلود الاجتماع.

4) إذا حضر أحمد أو علي الاجتماع، فإن خلود تحضر الاجتماع.

5) إذا حضر أحمد الاجتماع، فإن خلود تحضر أو إذا لم تحضر خلود

الاجتماع فإن علي يحضر.

(ج)

K	L	$K \vee L$	$L \vee K$	$(K \vee L) \rightarrow (L \vee K)$
T	T	T	T	T
T	F	T	T	T
F	T	T	T	T
F	F	F	F	T

K	$\neg K$	$\neg \neg K \rightarrow K$
T	F	T
F	T	F

(3)

K	L	$K \vee L$	$\neg K$	$\neg L$	$\neg K \wedge \neg L$	$(K \vee L) \rightarrow (\neg K \wedge \neg L)$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	T	F	F
F	T	T	T	F	F	F
F	F	F	T	T	T	T

(4)

K	L	$K \rightarrow L$	$\neg L$	$(K \rightarrow L) \wedge \neg L$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

(5)

K	L	$K \rightarrow L$	$\neg K$	$\neg K \vee L$	$(K \rightarrow L) \leftrightarrow (\neg K \vee L)$
T	T	T	F	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

(6)

K	L	M	$L \rightarrow M$	$K \rightarrow (L \rightarrow M)$	$K \wedge L$	$(K \wedge L) \rightarrow M$	$(K \rightarrow (L \rightarrow M)) \leftrightarrow ((K \wedge L) \rightarrow M)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	T	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	T	T
F	T	F	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	F	T	T

(د)

K	L	$K \wedge L$	$L \wedge K$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

(2)

K	$\neg K$	$\neg \neg K$
T	F	T
F	T	F

(1)

قارن بين العمودين الأول والثالث

قارن بين العمودين الأخيرين

K	L	$\neg K$	$\neg L$	$K \wedge L$	$\neg(K \wedge L)$	$K \vee \neg L$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T

قارن بين العمودين الأخيرين

(4 مماثل إلى 3)


K	L	$\neg K$	$\neg K \vee L$	$K \rightarrow L$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

قارن بين العمودين الأخيرين


(6)

K	L	M	$K \wedge L$	$L \rightarrow M$	$(K \wedge L) \rightarrow M$	$K \rightarrow (L \rightarrow M)$	$((K \wedge L) \rightarrow M) \leftrightarrow ((K \rightarrow L) \rightarrow M)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	F	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T	T

(\neg)
(1)



(2)



(د)

ا) $2^3 \neq 3$ أو $4 \times 6 \neq 20$: صدقة ، ب) $4 \times 6 = 20$ و 9 عدد فردي:

كاذبة ، ج) إذا كان $4 \times 6 \neq 20$ فإن $2^3 \neq 8$: كاذبة.

د) $2^3 = 8$ أو $4 \times 6 = 20$ و 9 عدد فردي : صدقة

الفصل الثاني - 12.2

(أ) ننشئ أولاً جدول صدق كل صيغة.

(1) تكرارية ، (2) تكرارية ، (3) عارضة ، (4) عارضة ،
(5) تكرارية ، (6) متناقضة ، (7) تكرارية.

(ب)

(1) للتحقق من (ب) \Rightarrow (أ) نقوم بإنشاء جدول صدق الصيغة (ب) \rightarrow (أ)
أي : $(K \vee L) \rightarrow (\neg K \rightarrow L)$ ، فإذا كانت هذه الصيغة تكرارية فإن
ب \Rightarrow (أ).

K	L	$\neg K$	$K \vee L$	$\neg K \rightarrow L$	$(\neg K \rightarrow L) \rightarrow (K \vee L)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	T	F	T
F	F	T	F	F	T

بما أن (ب) \rightarrow (أ) صيغة تكرارية، فإن (ب) \Rightarrow (أ).

للتحقق من (أ) \Rightarrow (ب) نقوم بإنشاء جدول صدق الصيغة (أ) \rightarrow (ب)، أي

$(K \vee L) \rightarrow (\neg K \rightarrow L)$ ، فإذا كانت هذه الصيغة تكرارية فإن (أ) \Rightarrow (ب).

سنستخدم الأعمدة الخمسة الأولى من الجدول أعلاه ونضيف لهم العمود

السادس التالي :

$(K \vee L) \rightarrow (\neg K \rightarrow L)$
T
T
T
T

بما أن (أ) \rightarrow (ب) صيغة تكرارية، فإن (أ) \Rightarrow (ب).

للتحقق من (ب) \Leftrightarrow (أ) نقوم بإنشاء جدول صدق الصيغة (ب) \leftrightarrow (أ) أي
 $(\neg K \rightarrow L) \leftrightarrow (K \vee L)$ ، فإذا كانت هذه الصيغة تكرارية فإن (ب) \Leftrightarrow (أ).
سنستخدم هنا أيضا الأعمدة الخمسة الأولى أعلاه ونضيف لهم العمود
السادس التالي :

$(\neg K \rightarrow L) \leftrightarrow (K \vee L)$
T
T
T
T

(2) للتحقق من (ب) \Rightarrow (أ) نقوم بإنشاء جدول صدق الصيغة (ب) \rightarrow (أ)،
أي $(K \rightarrow L) \rightarrow (K \wedge (K \rightarrow L))$ ، فإذا كانت هذه الصيغة تكرارية فإن
(ب) \Rightarrow (أ) :

K	L	$K \rightarrow L$	$(K \wedge (K \rightarrow L))$	$(K \rightarrow L) \rightarrow (K \wedge (K \rightarrow L))$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	F

نلاحظ أن الصيغة في العمود الأخير ليست تكرارية وإن كان (ب) \nrightarrow (أ).
للتحقق من (أ) \Rightarrow (ب) نقوم بإضافة عمود آخر ونجد قيم صدق الصيغة
(أ) \rightarrow (ب)، فإذا كانت هذه الصيغة تكرارية فإن (أ) \Rightarrow (ب).

$(K \wedge (K \rightarrow L)) \rightarrow (K \rightarrow L)$
T
T
T
T

نلاحظ أن الصيغة في هذا العمود تكرارية، وإن كان (أ) \Rightarrow (ب).

للتحقق من (ب) \leftrightarrow (أ) نقوم بإضافة عمود جديد ونجد قيم صدق الصيغة

(ب) \leftrightarrow (أ)، فإذا كانت هذه الصيغة تكرارية فإن (ب) \leftrightarrow (أ) :

	$(K \rightarrow L) \leftrightarrow (K \wedge (K \rightarrow L))$
	T
	T
	F
	F

نلاحظ أن الصيغة في هذا العمود ليست تكرارية وإن (ب) $\not\leftrightarrow$ (أ).

حل (3)، (4)، (5) مماثل إلى (1) و(2) أعلاه.

(ج)

$$\neg(K \wedge (L \wedge \neg M)) \quad (2) \quad , \quad (K \vee L) \vee \neg(M \vee \neg N) \quad (1)$$

$$\neg(\neg(\neg(K \vee L))) \vee \neg(\neg(L \vee K)) \quad (3)$$

$$(((K \rightarrow \neg L) \wedge (\neg L \rightarrow K)) \rightarrow M) \wedge (M \rightarrow ((\neg L \rightarrow K) \wedge (K \rightarrow \neg L))) \quad (4)$$

$$\neg(K \rightarrow (L \rightarrow \neg M)) \quad (5)$$

(د)

(1) القضايا الذرية : شيء ما حي : K ، شيء ذو روح : L ، شيء

متحرك بذاته : M .

الترجمة .

$$(K \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow M) \quad (أ)$$

$$(M \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow K) \quad (ب)$$

الآن ننشئ جدول صدق الصيغة (أ) \leftrightarrow (ب) :

K	L	M	$K \rightarrow L$	$L \rightarrow M$	(أ)	$M \rightarrow L$	$L \rightarrow K$	(ب)	(أ) \leftrightarrow (ب)
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T	T	T	F
T	F	T	F	T	F	F	T	F	T
T	F	F	F	T	F	T	T	T	F
F	T	T	T	T	T	T	F	F	F
F	T	F	T	F	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T	T	T	T

نلاحظ أن الصيغة في العمود الأخير (ب) \leftrightarrow (أ) ليست صيغة تكرارية
وإذن (أ) لا تكافئ (ب).

(2) القضايا الذرية

الروح متحركة بذاتها : K ، كل ما هو متحرك بذاته مصدر التغير : L ،
الروح مصدر التغير : M

الترجمة

$$(K \wedge L) \rightarrow M \text{ (أ)}$$

$$\neg(\neg M \wedge (K \wedge L)) \text{ (ب)}$$

الآن ننشئ جدول صدق الصيغة (أ) \leftrightarrow (ب)، فإذا كانت الصيغة (أ) \leftrightarrow (ب) تكرارية فإن (أ) تكافئ (ب). النتيجة هي أن (أ) تكافئ (ب).

(٥)

(1) سنحاول أولاً البرهان على خطأ صحة صورة الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد.

لنأخذ النتيجة كاذبة، إذن يجب أن تكون M صادقة. الآن، حتى تكون المقدمة الثالثة صادقة يجب أن تكون K صادقة. وحتى تكون المقدمة الثانية صادقة وبما أن M صادقة، أي $\neg M$ كاذبة، فيجب أن تكون L كاذبة. حتى تكون المقدمة الأولى صادقة وبما أن L كاذبة، أي أن $\neg L$ صادقة، فيجب أن تكون K كاذبة. وهنا وصلنا إلى تناقض : K صادقة و K كاذبة. إذن يفشل المثال المضاد وصورة الحجة صحيحة.

وحتى نبرهن أن هذه الصورة صحيحة سنعطي برهاننا سوريا لها.

البرهان

1. $\neg L \rightarrow \neg K$	M
2. $L \leftrightarrow \neg M$	M
3. K	M
4. $\neg \neg K$	النفي المضاعف, 3,
5. $\neg \neg L$	نفي التالي 1,4
6. L	النفس المضاعف, 5,
7. $(L \rightarrow \neg M) \wedge (\neg M \rightarrow L)$	الاستلزام التثائي, 2,
8. $L \rightarrow \neg M$	التبسيط, 7,
9. $\neg M$	الوضع 6, 8

(2) سنحاول أولاً البرهان على خطأ صورة الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد.

نأخذ النتيجة كاذبة. إذن يجب أن تكون M كاذبة و K كاذبة. حتى تكون المقدمة الأولى صادقة وبما أن M كاذبة فإن L يجب أن تكون كاذبة. حتى تكون المقدمة الثانية صادقة فيجب أن تكون $M \leftrightarrow K$ كاذبة. وبما أن K

كاذبة فيجب أن تكون M صادقة وهنا وصلنا إلى تناقض : M كاذبة و M صادقة. إذن يفشل المثال المضاد وصورة الحجة صحيحة. وحتى نبرهن أن هذه الصورة صحيحة سنعطي برهاناً سوريا لها.

البرهان

1. $L \rightarrow M$	م
2. $\neg(K \leftrightarrow M)$	م
3. $\neg M$	(مقدمة ب.ش) م
4. $\neg((K \rightarrow M) \wedge (M \rightarrow K))$	استلزام ثنائي, 2
5. $\neg(K \rightarrow M) \vee \neg(M \rightarrow K)$	دي مورغان, 4
6. $\neg M \vee K$	الجمع, 3
7. $M \rightarrow K$	الاستلزام, 6
8. $\neg(K \rightarrow M)$	نفي الفصل, 5, 7
9. $\neg(\neg K \vee M)$	الاستلزام, 8
10. $K \wedge \neg M$	دي مورغان, 9
11. K	التبسيط, 10
12. $\neg M \rightarrow K$	ب.ش, 11, 3

(و)(1)

البرهان

1. $K \rightarrow (L \vee M)$	م
2. $L \rightarrow N$	م
3. $M \rightarrow N$	م
4. $N \rightarrow \neg O$	م
5. O	م
6. $\neg \neg O$	نفي المضاعف, 5
7. $\neg N$	نفي التالي, 6, 4
8. $\neg M$	نفي التالي, 7, 3
9. $\neg L$	نفي التالي, 7, 2

$$10. \neg L \wedge \neg M$$

$$11. \neg(L \vee M)$$

$$12. \neg K$$

العطف 8,9

دي مورغان, 10

نفي التالي 1,11

(2)

البرهان

$$1. L \leftrightarrow (M \wedge K)$$

$$2. M \rightarrow \neg K$$

$$3. (L \rightarrow (M \wedge K)) \wedge ((M \wedge K) \rightarrow L)$$

$$4. L \rightarrow (M \wedge K)$$

$$5. \neg M \vee \neg K$$

$$6. \neg(M \wedge K)$$

$$7. \neg L$$

م

م

الاستنزام الثاني, 1

التبسيط, 3

الاستنزام, 2

دي مورغان, 5

نفي التالي 4,6

(3)

البرهان

$$1. K \rightarrow (L \rightarrow M)$$

$$2. \neg M$$

$$3. (K \wedge L) \rightarrow M$$

$$4. \neg(K \wedge L)$$

$$5. \neg K \vee \neg L$$

م

م

الاستيراد والتصدير, 1

نفي التالي 2,3

دي مورغان, 4

(ج)

(1) القضايا الذرية

الموت انفصال الروح عن الجسم : K

الروح قادرة على الوجود مستقلة عن الجسم : L

الروح تصبح حرة حين يموت الجسم : M

الترجمة

$K \rightarrow (L \rightarrow M)$	المقدمات
$\neg M \rightarrow (\neg K \vee \neg L)$	النتيجة

البرهان

1. $K \rightarrow (L \rightarrow M)$	م
2. $(K \wedge L) \rightarrow M$	الاستيراد والتصدير, 1
3. $\neg M \rightarrow \neg(K \wedge L)$	عكس النقيض, 2
4. $\neg M \rightarrow (\neg K \vee \neg L)$	دي مورغان, 3

(2) القضايا الذرية

K : تفقد الروح حين يموت الجسم

L : ينبغي أن نخشى الموت

M : هناك أمل

الترجمة

$K \rightarrow L, \neg K \rightarrow M, K \vee \neg K$ المقدمات

$\neg M \rightarrow L$ النتيجة

البرهان

1. $K \rightarrow L$	م
2. $\neg K \rightarrow M$	م
3. $K \vee \neg K$	م
4. $\neg L \rightarrow \neg K$	عكس النقيض, 1
5. $\neg L \rightarrow M$	القياس الشرطي, 2, 4
6. $\neg M \rightarrow \neg \neg L$	عكس النقيض, 5
7. $\neg M \rightarrow L$	التفي المضاعف, 6

(3) القضايا الذرية

ألقيت أسئلة على الناس بصورة صحيحة : K

الناس يظهرون معرفة لم يكتسبوها في هذه الحياة : L

الناس اكتسبوا معرفة في حياة سابقة : M

الروح يمكن أن توجد مستقلة عن الجسم : N

الترجمة

المقدمات $K \rightarrow L, \neg M \rightarrow \neg L, M \rightarrow N$

النتيجة $K \rightarrow N$

البرهان

- | | |
|--|---------------------|
| 1. $K \rightarrow L$ | م |
| 2. $\neg M \rightarrow \neg L$ | م |
| 3. $M \rightarrow N$ | م |
| 4. $\neg\neg L \rightarrow \neg\neg M$ | عكس النقيض, 2, |
| 5. $L \rightarrow M$ | الفني المضاعف, 4, |
| 6. $K \rightarrow N$ | القياس الشرطي 1,3,5 |

(4) القضايا الذرية

الروح تشبه نغم يعزف على آلة موسيقية : K

يمكن أن توجد الروح قبل أن يوجد الجسم : L

الحجة المستندة إلى الروح قوية : M

الروح قد وجدت قبل أن يوجد الجسم : N

الترجمة

المقدمات $K \rightarrow \neg N, M \rightarrow L, L \rightarrow N$

النتيجة $\neg M \vee \neg K$

البرهان

1. $K \rightarrow \neg N$	م
2. $M \rightarrow L$	م
3. $L \rightarrow N$	م
4. $M \rightarrow N$	القياس الشرطي 2,3
5. $\neg \neg N \rightarrow \neg K$	عكس النقيض 1
6. $N \rightarrow \neg K$	الفني المضاعف 5
7. $M \rightarrow \neg K$	القياس الشرطي 4,6
8. $\neg M \vee \neg K$	الاستلزام 7

(ح)

(١) القضايا الذرية

أذهب لقضاء إجازتي : K

القيام بعمل إضافي : L

أبيع سيارتي : M

أكسب بعض المال : N

الترجمة

المقدمات $(\neg K \vee L) \rightarrow (M \wedge N)$

النتيجة $K \vee M$

سنحاول أولاً البرهنة على خطأ الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد. نأخذ النتيجة كاذبة. إذن K يجب أن تكون كاذبة و M يجب أن تكون كاذبة. حتى

تكون المقدمة صادقة وبما أن M كاذبة فإن تالي المقدمة كاذبا، وهكذا فيجب أن يكون مقدمها كاذبا أيضا. وإذن يجب أن تكون K صادقة و L كاذبة. وهنا وصلنا إلى تناقض : K كاذبة وصادقة. إذن يفشل المثال المضاد والحجة صحيحة. وحتى نبرهن صحة الحجة سنعطي برهانا سوريا، باستخدام طريقة البرهان غير المباشر.

البرهان

1. $(\neg K \vee L) \rightarrow (M \wedge N)$	م
2. $K \vee M$	م
3. $\neg(K \vee M)$	(مقدمة ب.غ) م
4. $\neg K \wedge \neg M$	3, دي مورغان
5. $\neg K$	4, التبسيط
6. $\neg K \vee L$	5, الجمع
7. $M \wedge N$	1,6 الوضع
8. $\neg M$	4, التبسيط
9. M	7, التبسيط
10. $M \wedge \neg M$	8,9 العطف
11. $K \vee M$	ب.غ 3,10

(2) القضايا الذرية

فازت الجزائر بكأس العرب لكرة القدم : K

فازت سوريا بكأس العرب لكرة القدم : L

أكون سعيدا : M

أقيم احتفالا : N

الترجمة

المقدمات $(K \vee L) \rightarrow (M \wedge N)$

النتيجة $K \rightarrow M$

سنحاول البرهان أولا على خطأ الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد. نأخذ النتيجة $M \rightarrow K$ كاذبة. إذن يجب أن تكون K صادقة و M كاذبة. حتى تكون المقدمة صادقة، وبما أن M كاذبة فإن ناليتها يكون كاذبا وبالتالي يجب أن يكون مقدمها كاذبا. إذن يجب أن تكون K كاذبة و L كاذبة. وصلنا إلى تناقض : K صادقة و K كاذبة. إذن يفشل المثال المضاد والحجة صحيحة.

للبرهنة على أن الحجة صحيحة سنعطي البرهان التالي :
البرهان

- | | |
|--|---------------|
| 1. $(K \vee L) \rightarrow (M \wedge N)$ | م |
| 2. K | مقدمة ب. ش) م |
| 3. $K \vee L$ | الجمع 2, |
| 4. $M \wedge N$ | الوضع 1,3 |
| 5. M | التبسيط 4, |
| 6. $K \rightarrow M$ | ب. ش 2,5 |

(3)القضايا الذرية

على يذهب إلى المكتبة : K

سالم يذهب إلى المكتبة : L

فاطمة تذهب إلى المكتبة : M

الترجمة

المقدمات $K \vee (L \wedge M)$

النتيجة $\neg M$

سنحاول البرهان أولا على خطأ الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد. نأخذ النتيجة $\neg M$ كاذبة. إذن يجب أن تكون M صادقة. حتى تكون المقدمة

الأولى صادقة وبما أن M صادقة فيمكن أن نأخذ K صادقة و L صادقة. حتى تكون المقدمة الثانية صادقة وبما أن M صادقة فيمكن أن نأخذ K صادقة. إذن ينجح المثال المضاد والحجة خاطئة.
السطر المطلوب

K	L	M	$K \vee (L \wedge M)$	$K \rightarrow M$	$\neg M$
T	T	T	T	T	F

(4) القضايا الذرية

K : يغيب أحمد عن دروس المنطق

L : تهاون أحمد في مراجعة دروسه

M : أحمد يرسب

N : أحمد يطرد من الجامعة

O : أحمد يشعر بالإهانة

الترجمة

المقدمات $(K \vee L) \rightarrow (M \vee N), (L \vee M) \rightarrow O, \neg O \wedge K$

النتيجة N

الحجة صحيحة وللبرهنة عن صحة الحجة سنعطي برهاننا صوريا.

البرهان

- | | |
|--|------------|
| 1. $(K \vee L) \rightarrow (M \vee N)$ | م |
| 2. $(L \vee M) \rightarrow O$ | م |
| 3. $\neg O \wedge K$ | م |
| 4. K | 3, التبسيط |
| 5. $K \vee L$ | 4, الجمع |
| 6. $M \vee N$ | الوضع 1,5 |

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 7. $\neg O$ | التبسيط, 3 |
| 8. $\neg (L \vee M)$ | نفي التالي 2,7 |
| 9. $\neg L \wedge \neg M$ | دي مورغان, 8 |
| 10. $\neg M$ | التبسيط, 9 |
| 11. N | قياس الفصل 6,10 |

(5) القضايا الذرية

K : هرب سالم من بيته

L : سالم برئ من التهمة الموجهة إليه

M : سالم يكون آمناً من القبض عليه

N : سالم بعيد عن مكان الجريمة

الترجمة

$K \rightarrow (\neg L \vee \neg M), N \rightarrow L, L \rightarrow M, N$ المقدمات

$\neg K$ النتيجة

البرهان

- | | |
|---|----------------|
| 1. $K \rightarrow (\neg L \vee \neg M)$ | م |
| 2. $N \rightarrow L$ | م |
| 3. $L \rightarrow M$ | م |
| 4. N | م |
| 5. L | الوضع 2,4 |
| 6. M | الوضع 3,5 |
| 7. $L \wedge M$ | العطف 5,6 |
| 8. $\neg (\neg L \vee \neg M)$ | دي مورغان, 7 |
| 9. $\neg K$ | نفي التالي 1,8 |

(6) القضايا الذرية

أقام علي احتفالا بمناسبة نجاحه : K

علي يدعي سمير : L

علي يدعي فائزة : M

علي يجب أن يدعي أحمد : N

الترجمة

المقدمات $K \rightarrow (L \wedge M), (L \vee M) \rightarrow N$

النتيجة $K \rightarrow N$

وللبرهنة عن صحة الحجة سنعطي برهانا صوريا.

البرهان

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. $K \rightarrow (L \wedge M)$ | م |
| 2. $(L \vee M) \rightarrow N$ | م |
| 3. K | (مقدمة ب.ش) م |
| 4. $L \wedge M$ | الوضع 1,3 |
| 5. L | التبسيط, 4 |
| 6. $L \vee M$ | الجمع, 5 |
| 7. N | الوضع 2,7 |
| 8. $K \rightarrow N$ | ب.ش 3,7 |

(ط)

(1) سنعطي برهانا صوريا. سنكتب النتيجة على الشكل $C \rightarrow D$.

البرهان

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. $\neg B \vee (M \wedge C)$ | م |
| 2. $\neg B \rightarrow D$ | م |
| 3. $\neg C$ | (مقدمة ب.ش) م |
| 4. $\neg C \vee \neg M$ | الجمع, 3 |
| 5. $\neg M \vee \neg C$ | التبديل, 4 |
| 6. $\neg(M \wedge C)$ | دي مورغان, 5 |
| 7. $\neg B$ | قياس الفصل, 1,6 |
| 8. D | الوضع, 2,7 |
| 9. $\neg C \rightarrow D$ | ب.ش, 3,9 |
| 10. $C \vee D$ | الاستنزام, 9 |

(2) سنحاول البرهان أولاً على خطأ صورة الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد.

نأخذ النتيجة كاذبة. إذن يجب أن تكون B كاذبة. حتى تكون المقدمة الأولى صادقة فيجب أن تكون A كاذبة و C كاذبة. حتى تكون المقدمة الثانية كاذبة نأخذ E كاذبة. إذن، ينجح المثال المضاد والحجة خاطئة.

السطر المطلوب

A	B	C	E
F	F	F	F

(3) سنحاول أولاً البرهان على خطأ صورة الحجة وذلك بإعطاء مثال مضاد.

نأخذ النتيجة كاذبة. إذن يجب أن تكون K كاذبة. حتى تكون المقدمة الأخيرة صادقة، فيجب أن تكون M صادقة. حتى تكون المقدمة الثانية صادقة وبما

ان K كاذبة، فيجب أن تكون L كاذبة. حتى تكون المقدمة الاولى صادقة
 وبما أن K كاذبة، أي أن التالي $\neg K$ صادق، فإن المقدم يمكن أن يكون
 صادق أو كاذب. عندنا هنا المقدم كاذب. إذن ينجح المثال المضاد والحجة
 خاطئة.

السطر المطلوب

K	L	M	$(\neg M \wedge \neg M) \rightarrow \neg K$	$\neg K \rightarrow \neg L$	M
F	F	T	T	T	T

(4)

نبرهن أن صورة الحجة صحيحة، سنعطي البرهان التالي.

البرهان

- | | |
|---|----------------------|
| 1. $A \rightarrow (B \leftrightarrow C)$ | م |
| 2. $B \wedge \neg C$ | م |
| 3. $\neg A \rightarrow D$ | م |
| 4. $\neg(\neg B \vee \neg C)$ | دي مورغان 2, |
| 5. $\neg(\neg B \vee C)$ | النفس المضاعف 4, |
| 6. $\neg(B \rightarrow C)$ | الاستلزام 5, |
| 7. $\neg(B \rightarrow C) \vee \neg(C \rightarrow B)$ | الجمع 6, |
| 8. $\neg((B \rightarrow C) \wedge \neg(C \rightarrow B))$ | دي مورغان 7, |
| 9. $\neg(B \leftrightarrow C)$ | الاستلزام الثنائي 8, |
| 10. $\neg A$ | نفس التالي 9, |
| 11. D | الوضع 3,10 . |

(5)

البرهان

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. $A \rightarrow C$ | م |
| 2. $\neg C \vee D$ | م |
| 3. $B \leftrightarrow D$ | م |
| 4. $B \rightarrow \neg(\neg A \wedge D)$ | م |
| 5. A | م (مقدمة ب.ش) |
| 6. C | الوضع 1,5 |
| 7. D | قياس الفصل 2,6 |
| 8. B | الوضع 3,7 |
| 9. $A \rightarrow B$ | ب.ش 5,8 |
| 10. B | م (مقدمة ب.ش) |
| 11. $\neg(\neg A \wedge D)$ | الوضع 4,10 |
| 12. $A \vee \neg D$ | دي مورغان 11, |
| 13. D | الوضع 3,10 |
| 14. A | قياس الفصل 12,13 |
| 15. $B \rightarrow A$ | ب.ش 10,14 |
| 16. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ | الوضع 9,15 |
| 17. $A \leftrightarrow B$ | الاستلزام الثنائي 16, |

(6)

البرهان

- | | |
|--|-------------------|
| 1. $(A \wedge B) \rightarrow (C \vee D)$ | م |
| 2. $E \wedge B \rightarrow A$ | م |
| 3. $\neg(A \wedge B) \vee (C \vee D)$ | الاستلزام |
| 4. $(\neg A \vee \neg B) \vee (C \vee D)$ | دي مورغان 3, |
| 5. $\neg A \vee (\neg B \vee (C \vee D))$ | التجميع 4, |
| 6. $A \rightarrow (\neg B \vee (C \vee D))$ | الاستلزام 5, |
| 7. $(E \wedge B) \rightarrow (\neg B \vee (C \vee D))$ | القياس الشرطي 2,6 |

8. $(E \wedge B) \rightarrow (B \rightarrow (C \vee D))$
9. $(E \wedge B) \wedge B \rightarrow (C \vee D)$
10. $(E \wedge (B \wedge B)) \rightarrow (C \vee D)$
11. $(E \wedge B) \rightarrow (C \vee D)$

- 7, الاستلزام
- 8, الاستيراد والتصدير
- 9, التجميع
- 10, تحصيل حاصل

(7)

البرهان

1. $R \rightarrow (Z \rightarrow X)$
2. $R \rightarrow (\neg Z \rightarrow S)$
3. $\neg R \rightarrow O$
4. $Z \vee \neg R$
5. $\neg(X \vee O)$
6. $\neg X \wedge \neg O$
7. $\neg O$
8. $\neg \neg R$
9. Z
10. R
11. $Z \rightarrow X$
12. X
13. $\neg X$
14. $X \wedge \neg X$
15. $X \vee O$

- م
- م
- م
- م
- مقدمة ب.غ م
- 5, دي مورغان
- 6, التبسيط
- 3,7 نفي التالي
- 4,8 قياس الفصل
- 8, النفس المضاعف
- 9,10 الوضع
- 9,11 الوضع
- 6, التبسيط
- 13,14 العطف
- 5,14 ب.غ

(8)

البرهان

1. $(A \wedge B) \rightarrow (\neg D \rightarrow \neg C)$
2. $E \rightarrow A$
3. $A \rightarrow (B \rightarrow (\neg D \rightarrow \neg C))$
4. $E \rightarrow (B \rightarrow (\neg D \rightarrow \neg C))$
5. $E \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow D))$

- م
- م
- الاستيراد والتصدير, 1
- 2,3 القياس الشرطي
- 4, عكس النقيض

- | | |
|--|-----------------------|
| 6. $E \rightarrow ((B \wedge C) \rightarrow O)$ | 5, الاستيراد والتصدير |
| 7. $(E \wedge B) \rightarrow (\neg B \vee (C \vee D))$ | 6, التبديل |
| 8. $E \rightarrow (C \rightarrow (B \rightarrow D))$ | 7, الاستيراد والتصدير |
| 9. $(E \wedge C) \rightarrow (B \rightarrow D)$ | 8, الاستيراد والتصدير |
| 10. $(E \wedge C) \rightarrow (\neg B \vee D)$ | 9, الاستلزام |
| 11. $(E \wedge C) \rightarrow (D \vee \neg B)$ | 10, التبديل |

(ي)

(1)

البرهان

- | | |
|---|--------------|
| 1. $K \rightarrow (L \vee M)$ | م |
| 2. $N \rightarrow K$ | م |
| 3. N | مقدمة ب.ش. م |
| 4. K | الوضع 2,3 |
| 5. $L \vee M$ | الوضع 1,4 |
| 6. $\neg L \rightarrow M$ | الاستلزام 5, |
| 7. $N \rightarrow (\neg L \rightarrow M)$ | ب.ش. 3,6 |

(2)

البرهان

- | | |
|--|----------------|
| 1. $(\neg K \vee \neg L) \rightarrow \neg M$ | م |
| 2. $N \rightarrow M$ | م |
| 3. N | مقدمة ب.ش. م |
| 4. M | الوضع 2,3 |
| 5. $\neg(\neg K \vee \neg L)$ | نفي التالي 1,4 |
| 6. $K \wedge L$ | دي مورغان 5, |
| 7. $N \rightarrow (K \wedge L)$ | ب.ش. 3,6 |

(3)

البرهان

1. $K \rightarrow (L \wedge M)$
2. $((N \vee L) \wedge M) \rightarrow O$
3. K
4. $L \wedge M$
5. $(N \wedge M) \vee (L \wedge M)$
6. $(L \wedge M) \vee (N \wedge M)$
7. $(N \wedge M) \vee (L \wedge M)$
8. O
9. $K \rightarrow O$

- م
م
م (مقدمة ب.ش) م
1,4 الوضع
2, التوزيع
4, الجمع
6, التبديل
5,7 الوضع
3,9 ب.ش

(ك)

(1)

البرهان

1. $\neg A \rightarrow (B \vee C)$
2. $C \vee D$
3. $\neg B \vee \neg D$
4. $\neg(A \vee C)$
5. $\neg A \wedge \neg C$
6. $\neg A$
7. $B \vee C$
8. $\neg C$
9. B
10. $\neg B$
11. $\neg D$
12. C
13. $C \wedge \neg C$
14. $A \vee C$

- م
م
م
م (مقدمة ب.غ) م
4, دي مورغان
5, التبسيط
الوضع 1,6
5, التبسيط
قياس الفصلي 7,8
9, النفي المضاعف
قياس الفصل 3,10
قياس الفصل 2,11
العطف 8,12
ب.غ 4,13

(2)

البرهان

1. $A \rightarrow (D \wedge E)$	م
2. $C \vee E$	م
3. $C \rightarrow (A \wedge \neg D)$	م
4. C	مقدمة ب.غ) م
5. $A \wedge \neg D$	الوضع 3,4
6. A	التبسيط 5,
7. D	الوضع 1,6
8. $\neg C$	التبسيط 7,
9. $\neg D$	التبسيط 5,
10. $D \wedge \neg D$	العطف 8,9
11. $\neg C$	ب.غ 4,10
12. E	قياس الفصل 2,11
13. $E \wedge \neg C$	العطف 11,12

(3)

البرهان

1. $\neg A \rightarrow (B \rightarrow C)$	م
2. $A \vee B$	م
3. $B \rightarrow \neg C$	م
4. $A \rightarrow C$	م
5. $\neg A$	مقدمة ب.غ) م
6. B	قياس الفصل 2,5
7. $\neg C$	الوضع 3,6
8. $B \rightarrow C$	الوضع 1,5
9. C	الوضع 6,8

10. $C \wedge \neg C$

العطف 7,9

11. A

ب.غ 5,10

12. D

الوضع 4,11

13. $A \wedge D$

العطف 11,12

(ن)

(1)

أرقام المقدمات	أرقام الخطوط	البرهان	السبب
{1}	1.	$(L \rightarrow M) \wedge (B \rightarrow A)$	م
{2}	2.	$L \wedge B$	مقدمة ب.ش) م
{1}	3.	$L \rightarrow M$	التبسيط, 1
{1}	4.	$(B \rightarrow A) \wedge (L \rightarrow M)$	التبديل, 1
{1}	5.	$B \rightarrow A$	التبسيط, 4
{2}	6.	L	التبسيط, 2
{1,2}	7.	M	الوضع 3,6
{2}	8.	$B \wedge L$	التبديل, 2
{2}	9.	B	التبسيط, 8
{1,2}	10.	A	الوضع 5,9
{1,2}	11.	$M \wedge A$	العطف 7,10
{1}	12.	$(L \wedge B) \rightarrow (M \wedge A)$	ب.ش 2,11

(2)

أرقام المقدمات	أرقام الخطوط	البرهان	السبب
{1}	1.	$K \rightarrow \neg(M \vee L)$	م
{2}	2.	$(\neg L \rightarrow \neg G) \wedge (\neg M \rightarrow G)$	م
{3}	3.	K	مقدمة ب.غ) م
{1,3}	4.	$\neg(M \vee L)$	الوضع 1,3

{1,3}	5. $\neg M \wedge \neg L$	4, دي مورغان
{2}	6. $\neg L \rightarrow \neg G$	2, التبسيط
{2}	7. $\neg M \rightarrow G$	2, التبسيط
{1,2,3}	8. $\neg G$	5,6 الوضع
{1,2,3}	9. G	5,7 الوضع
{1,2,3}	10. $G \wedge \neg G$	8,9 العطف
{1,2}	11. $\neg K$	3,10 ب.غ

(م)

(1) القضايا الذرية

تفسد الروح حين يموت الجسم : K

ينبغي أن نخشى الموت : L

هناك أمل : M

الترجمة

المقدمات $K \rightarrow L, \neg K \rightarrow M, K \vee \neg K$

K	L	M	$K \rightarrow L$	$\neg K$	$\neg K \rightarrow M$	$K \vee \neg K$
T	T	T	T	F	T	T
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T	T
T	F	F	F	F	T	T
F	T	T	T	T	F	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	T	T	T	F	T
F	F	F	T	T	F	T

نلاحظ من الجدول أن الصيغ الثلاث جميعها صادقة في السطر الأول وإذن فهي متسقة.

(3) القضايا الذرية

$$M : a < c, L : b < c, K : a < b$$

الترجمة

$$(K \wedge L) \rightarrow M, (K \wedge \neg L) \rightarrow \neg M, (\neg K \wedge L) \rightarrow M,$$

$$M \leftrightarrow ((K \wedge L) \vee \neg K)$$

الصيغ متسقة وستر الجدول التالي يبين ذلك.

K	L	M	$(K \wedge L) \rightarrow M$	$(K \wedge \neg L) \rightarrow \neg M$	$(\neg K \wedge L) \rightarrow M$	$M \leftrightarrow ((K \wedge L) \vee \neg K)$
F	F	T	T	T	T	T

(ن)

(1) متسقة

K	L	M	$K \rightarrow (L \vee M)$	$K \wedge \neg L$
T	F	T	T	T

(2) غير متسقة

البرهان

1. $K \rightarrow L$

م

2. $M \rightarrow \neg L$

م

3. $\neg M \rightarrow N$

م

4. $K \wedge \neg N$

م

5. L

الوضع 1,4

6. $\neg M$
7. N
8. $N \wedge \neg N$

نفى التالي, 2,5,
الوضع 3,6
العطف 4,7

(4) غير متسقة

البرهان

1. $\neg(N \vee K)$
2. $\neg K \rightarrow (M \vee N)$
3. $M \rightarrow N$
4. $\neg N \wedge \neg K$
5. $M \vee N$
6. M
7. N
8. $N \wedge \neg N$

م
م
م
دي مورغان, 1,
الوضع 2,4
قياس الفصل, 4,5,
الوضع 3,6
العطف 4,7

الفصل الثالث - 8.3

(i)

البرهان

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$
2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$
4. $\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$
5. $\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$

م
شكل البديهية A_2
الوضع 1,2
شكل البديهية A_1
القياس الشرطي 3.4

(ب)

البرهان

1. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ شكل البديهية A_2
2. $((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma))$ شكل البديهية A_2
 $\rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
3. $((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma))$ الوضع 1,2
 $\rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

(ج)

(1)

البرهان

1. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ شكل البديهية A_1
2. $((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))) \rightarrow (((L \rightarrow \gamma)$
 $\rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \delta)$ 1, $(\alpha \rightarrow \beta / \alpha)$,
 $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
 $/ \beta), (\delta / \gamma)$ استبدال
3. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \delta)$ الوضع 1,2

لقد أوضحنا أعلاه كيفية استخدام الأشكال البديهية، وذلك بتوضيح الاستبدالات وسنستمر على ذلك أدناه.

(2)

البرهان

1. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \delta)$ مبرهنة 1
2. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma))$ 1, $(\beta \rightarrow \gamma / \beta)$, $((\delta \rightarrow$
 $\rightarrow ((\delta \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma)) \rightarrow$ $\gamma) / \gamma)$, $((\delta \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow$
 $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\delta \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma))$ $(\delta \rightarrow \gamma) / \delta)$ استبدال
3. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\delta \rightarrow$ 1, (δ / α) , $(\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow$

$$4. \quad \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma)) \quad \text{استبدال } (\gamma)/\delta$$

$$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\delta \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma)))) \quad \text{الوضع 2,3}$$

(3)

البرهان

1. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow \delta \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \delta)$ مبرهنة 1
2. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta)$ 1, $((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta)/\delta$ استبدال
3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ بديهية 1
4. $((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta))$ 3, $(\beta \rightarrow \gamma)/\alpha$, $(\alpha \rightarrow \gamma)/\beta$, استبدال (δ/γ)
5. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta))$ الوضع 2,4

(4)

البرهان

1. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ بديهية 1
2. $(\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ 1, $(\neg \alpha \rightarrow \beta)/\beta$ استبدال
3. $(\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta))$ بديهية 3
4. $((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$ الوضع 2,3

(5)

البرهان

1. $((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$ مبرهنة 4
2. $((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha))) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha \rightarrow (((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)$ 1, $((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)$

- $((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)$ استبدال α/γ
 3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta))$ مبرهنة 3
 4. $(\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha))$ 3, $(\neg \alpha/\alpha)$, (α/γ) ,
 استبدال (α/δ)
 5. $(\alpha \rightarrow (((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha))$ 2, 4 الوضع

(د)

(1)

البرهان

1. $(\alpha \vee \alpha) \rightarrow \alpha$ شكل البديهية A_1
 2. $(\neg \alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha$ 1, استبدال $(\neg \alpha/\alpha)$
 3. $(\alpha \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha$ تعريف 1, 2

(2)

البرهان

1. $\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$ شكل البديهية A_2
 2. $\beta \rightarrow (\neg \alpha \vee \beta)$ 1, استبدال $(\neg \alpha/\alpha)$
 3. $\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ تعريف 1, 2

(3)

البرهان

1. $(\alpha \vee \beta) \rightarrow (\beta \vee \alpha)$ شكل البديهية A_3
 2. $(\neg \alpha \vee \neg \beta) \rightarrow (\neg \beta \vee \neg \alpha)$ 1, استبدال $(\neg \alpha/\alpha)$ $(\neg \beta/\beta)$
 3. $(\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \neg \alpha)$ تعريف 1, 2

(4)

البرهان

1. $(\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \rightarrow (\beta \vee (\alpha \vee \gamma))$ شكل البديهية A_3
2. $(\neg \alpha \vee (\neg \beta \vee \gamma)) \rightarrow (\neg \beta \vee (\neg \alpha \vee \gamma))$ 1, $(\neg \alpha / \alpha)$
استبدال $(\neg \beta / \beta)$
3. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ تعريف 1, 2

(5)

البرهان

1. $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow (\alpha \vee \gamma))$ شكل البديهية A_3
2. $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\neg \alpha \vee \beta) \rightarrow (\neg \alpha \vee \gamma))$ 1, $(\neg \alpha / \alpha)$ استبدال
3. $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ تعريف 1, 2

(5)

أولاً: برهان استقلال شكل البديهية A_1 عن A_2 و A_3 و A_4

البرهان

لتكن $M = \{0, 1, 2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0.سنعرف الرمزين \vee و \neg حسب الجدولين التاليين :

	\neg
0	1
1	0
2	2

\vee	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	0

سنكتب الآن الأشكال البديهية الأربعة للنسق R باستخدام الرمزين الأوليين \neg

و V وحسب تعريف الرمز \rightarrow التالي :

$$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta$$

(1) شكل البديهية A_1

$$\neg(\alpha \vee \alpha) \vee \alpha \text{ تصبح } (\alpha \vee \alpha) \rightarrow \alpha$$

(2) شكل البديهية A_2

$$\neg \beta \vee (\alpha \vee \beta) \text{ تصبح } \beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$$

(3) شكل البديهية A_3

$$\neg(\alpha \vee \beta) \vee (\beta \vee \alpha) \text{ تصبح } (\alpha \vee \beta) \rightarrow (\beta \vee \alpha)$$

(4) شكل البديهية A_4

$$\text{تصبح } (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow (\alpha \vee \gamma))$$

$$\neg(\neg \beta \vee \gamma) \vee ((\neg(\alpha \vee \beta) \vee (\alpha \vee \gamma)))$$

جداول صدق هذه الأشكال البديهية حسب جدولي \neg و V السابقين تكون كما

يلي أدناه مستخدمين الطريقة الثانية لبناء جداول الصدق المعطاة في الفصل

الثاني. سنستخدم حالات من A_1, A_2, A_3, A_4 .

(1) شكل البديهية A_1

\neg	(K	V	K)	V	K
1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	2	0	2	2	2

(2) شكل البديهية A_2

\uparrow	L	V	(K	V	L)
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
2	2	0	0	0	2
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
2	2	0	1	2	2
1	0	0	2	0	0
0	1	0	2	2	1
2	2	0	2	0	2

(3) شكل البديهية A_3

\uparrow	(K	V	L)	V	(L	V	K)
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	2	0	2	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1
2	1	2	2	0	2	2	1
1	2	0	0	0	0	0	2
2	2	2	1	0	1	2	2
1	2	0	2	0	2	0	2

(4) شكل البديهية A_4

\uparrow	(\uparrow	L	V	M)	V	\uparrow	(K	V	L)	V	(K	V	M)
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	2

1	2	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
2	2	2	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1
1	2	2	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	1	0	2	2	0	1	1	0	0	2	1	2	2
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	1	2	2
1	2	2	0	0	0	2	1	2	2	0	1	0	0
2	2	2	2	1	0	2	1	2	2	2	1	1	1
1	2	2	0	2	0	2	1	2	2	0	1	2	2
1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	2	2	2	1
2	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	2	0	2
1	0	1	0	0	0	2	2	2	1	0	2	0	0
1	0	1	0	2	0	2	2	2	1	0	2	0	2
1	2	2	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	0
2	2	2	2	1	0	1	2	0	2	2	2	2	1
1	2	2	0	2	0	1	2	0	2	0	2	0	2

نلاحظ من جداول الأشكال البديهية الأربعة أن القيمة الممتازة تتوفر في الأشكال البديهية : الثانية والثالثة والرابعة ولا تتوفر في الأولى حيث توجد للقيمة 2 بالإضافة إلى القيمة 0. وأخيرا نبرهن انتقال القيمة الممتازة إلى قواعد اشتقاق النسق. الرمز \rightarrow جدوله كما هو موضح أدناه.

K	L	$K \rightarrow L$
0	0	0
0	1	1
0	2	2

1	0	0
1	1	0
1	2	0
2	0	0
2	1	2
2	2	0

نلاحظ من الجدول انتقال القيمة الممتازة لقاعدة الوضع، حيث أن السطر الوحيد (الأول) الذي تمتلك فيه $K \rightarrow L$ و K القيمة 0 فإن L تمتلك القيمة 0 أيضا. وهكذا فإذا توفر 0 في أية صيغ فإن 0 يتوفر أيضا في الصيغة المشتقة منها بواسطة قاعدة الوضع. أي أن الأشكال البديهية الثانية والثالثة والرابعة لا يمكن أن يشتق منها إلا صيغا يتوفر فيها القيمة الممتازة، أي لا تمتلك إلا القيمة 0 فقط. وهكذا فلا يمكن اشتقاق شكل البديهية الأولى منها لأنها تمتلك القيمة 2 بالإضافة إلى القيمة 0، أي أن شكل البديهية الأولى مستقلة.

ثانيا: برهان استقلال شكل البديهية A_2

لتكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0.

سنعرف الرمزين \lceil و \vee حسب الجدولين التاليين :

	\lceil
0	2
1	1
2	0

\vee	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	2

بعد إنشاء جداول الأشكال البديهية (والذي نعتبره تفصيلا نتركه للقارئ) يتبين أن الأشكال البديهية: الأولى والثالثة والرابعة تمتلك القيمة 0, 1 فقط، أما الثانية فإنها تمتلك للقيمة 2 أيضا وإذن فهي مستقلة.

ثالثا: برهان استقلال شكل البديهية A_3

سنبرهن استقلال البديهية الثالثة وذلك باستخدام مجموعة من أربعة عناصر هي 0, 1, 2, 3 ونعرف الرمزيين الأوليين Γ , V حسب الجدولين التاليين:

	Γ
0	1
1	0
2	0
3	2

V	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	2	0
3	0	3	3	3

بعد إنشاء جداول الأشكال البديهية يتبين أن: الأولى والثانية والرابعة تمتلك للقيمة 0 فقط، أما شكل البديهية الثالثة فتمتلك القيمة 3 بالإضافة إلى القيمة 0 وإذن فهي مستقلة.

رابعا: برهان استقلال شكل البديهية A_4

لتكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي: 0.

سنعرف الرمزيين Γ و V حسب الجدولين التاليين:

	Γ
--	----------

V	0	1	2
-----	---	---	---

0	2
1	1
2	0

0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	2

بعد إنشاء جداول الأشكال البديهية يتبين أن : الأولى والثانية والثالثة تمتلك القيمة 0 فقط، أما الرابعة فتمتلك القيمة 2 بالإضافة إلى القيمة 0 وإذن فهي مستقلة.

لقد برهنا أن كل من الأشكال البديهية الأربعة لنسق رسل تكون مستقلة وبالتالي نكون قد برهنا استقلال مجموعة الأشكال البديهية لنسق رسل.

(و)

(1)

البرهان

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | $\alpha \rightarrow \beta$ | م |
| 2. | $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow \neg(\gamma \wedge \alpha))$ | A ₃ |
| 3. | $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg(\beta \wedge \neg \gamma) \rightarrow \neg(\neg \gamma \wedge \alpha))$ | 2, $(\neg \gamma / \gamma)$ |
| 4. | $\neg(\beta \wedge \neg \gamma) \rightarrow \neg(\neg \gamma \wedge \alpha)$ | الوضع 1,3 |
| 5. | $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \neg(\neg \gamma \wedge \alpha)$ | تعريف 1, 4 |
| 6. | $\beta \rightarrow \gamma$ | م |
| 7. | $\neg(\neg \gamma \wedge \alpha)$ | الوضع 5,6 |

(2)

البرهان

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | $\alpha \rightarrow (\alpha \wedge \alpha)$ | بديهية 1 |
|----|---|----------|

2. $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$ بديهية₂
 3. $(\alpha \wedge \alpha) \rightarrow \alpha$ استبدال (α/β) , 2
 4. $\neg(\neg\alpha \wedge \alpha)$ ميرهنة_{1,3}
- (3)

البرهان

1. $\neg(\neg\alpha \wedge \alpha)$ ميرهنة₂
 2. $\neg(\neg\neg\alpha \wedge \neg\alpha)$ استبدال $(\neg\alpha/\alpha)$, 1
 3. $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$ تعريف₃
- الميرهنة₃ هي إحدى صيغ النفي المضاعف.
- (4)

البرهان

1. $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$ ميرهنة₃
 2. $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$ استبدال (β/α) , 1
 3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow \neg(\gamma \wedge \alpha))$ بديهية₃
 4. $(\neg\neg\beta \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow \neg(\gamma \wedge \neg\neg\beta))$ استبدال $(\neg\neg\beta/\beta)$, 3
 5. $\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow \neg(\gamma \wedge \neg\neg\beta)$ الوضع_{2,4}
 6. $\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \neg\neg\beta)$ تعريف_{1,5}
- (5)

البرهان

1. $\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \neg\neg\beta)$ ميرهنة₄
 2. $\neg(\neg\alpha \wedge \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \neg\neg\alpha)$ استبدال $(\neg\alpha/\beta)$, (α/γ) , 1
 3. $\neg(\neg\alpha \wedge \alpha)$ ميرهنة₂
 4. $(\alpha \rightarrow \neg\neg\alpha)$ الوضع_{2,3}
- الميرهنة₂ هي الصيغة الثانية للنفي المضاعف.

(6)

البرهان

1. $\neg(\beta \wedge \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \neg\beta)$ مبرهنة
2. $\neg(\beta \wedge \neg\alpha) \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \neg\beta)$ 1, استبدال $(\neg\alpha/\gamma)$
3. $(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \neg\beta)$ تعريف 2,

(ز)

1) برهان استقلال شكل البديهية A_1 لتكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0. ولتأخذ الصيغ قيم

صدقها حسب الجدولين التاليين :

K	$\neg K$
0	2
1	1
2	0

K	L	$K \vee L$	$K \rightarrow L$
0	0	0	0
0	1	0	1
0	2	0	2
1	0	0	0
1	1	0	0
1	2	1	1
2	0	0	0
2	1	1	0
2	2	2	0

2) برهان استقلال شكل البديهية A_2 لتكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0. ولتأخذ الصيغ قيم

صدقها حسب الجدولين التاليين :

K	$\neg K$
0	1
1	0
2	2

K	L	$K \vee L$	$K \rightarrow L$
0	0	0	0
0	1	0	1

0	2	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0
1	2	1	0
2	0	0	0
2	1	1	1
2	2	1	1

(3) برهان استقلال شكل البديهية A_3
 لنكن $M = \{0,1,2\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0. ولتأخذ الصيغ قيم

صدقها حسب الجدولين التاليين :

K	$\neg K$
0	2
1	0
2	1

K	L	$K \vee L$	$K \rightarrow L$
0	0	0	0
0	1	0	2
0	2	0	2
1	0	0	0
1	1	1	0
1	2	0	0
2	0	0	0
2	1	2	1
2	2	2	0

(4) برهان استقلال شكل البديهية A_4

لنكن $M = \{0,1,2,3\}$ ، ولتكن القيمة الممتازة هي : 0. ولتأخذ الصيغ

قيم صدقها حسب الجدولين التاليين :

K	$\neg K$
0	1
1	0
2	3
3	0

K	L	$K \vee L$	$K \rightarrow L$
0	0	0	0
0	1	0	1
0	2	0	2
0	3	0	3

1	0	0	0
1	1	1	0
1	2	2	0
1	3	3	0
2	0	0	0
2	1	2	3
2	2	2	0
2	3	0	3
3	0	0	0
3	1	3	0
3	2	0	0
3	3	3	0

الفصل الرابع - 10.4

(1) (i)

المحمولات

L_x : x يتقدم إلى الامتحان ، K_x : x طالب ،
جميع x ، إذا كان x طالب فإن x يتقدم إلى الامتحان
الترجمة

$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$

(2)المحمولات،

M_x : x مفيد ، L_x : نبات ، K_x : حي

الترجمة $(\exists x) (K_x \wedge L_x) \wedge (\exists x) (L_x \wedge M_x)$

(3)المحمولات،

Lx : x ثمين ، Kx : x معدن

ليس جميع x ، إذا كان x معدن فإن x ثمين

الترجمة

$\neg (\forall x) (Kx \rightarrow Lx)$

(4)المحمولات،

L_{xy} : x أكبر سنا من y ، K_x : x طالب

الحدود أحمد : a ، سالم : b

إذا كان بعض x ، x طالب و x أكبر سنا من أحمد فإن أحمد أكبر سنا من

سالم

الترجمة

$$(\exists x) (K_x \wedge L_{xa}) \rightarrow L_{ab}$$

(5)المحمولات،

x طفل : K_x ، x يذهب إلى مدرسته : L_x ، x يرافق y : M_{xy} ، x

والد y : N_{xy}

كل x ، إذا كان x طفل و x يذهب إلى المدرسة فإنه يوجد y ،

x يرافق y و y أحد والدي x

الترجمة،

$$(\forall x) ((K_x \wedge L_x) \rightarrow (\exists y) (M_{xy} \wedge N_{yx}))$$

(6)المحمولات،

x طبييب : K_x ، x أكبر سنا من y : L_{xy} ، x مريض : M_x

كل x ، إذا كان x طبييب و x أكبر سنا من y فإنه يوجد y ،

y مريض و x أكبر سنا من y

الترجمة،

$$(\forall x) ((K_x \wedge L_{xa}) \rightarrow (\exists y) (M_y \wedge L_{xy}))$$

(7)المحمولات،

K_x : بقرة x ، L_x : ثديي

جميع x ، إذا كان x بقرة فإن x ثديي
الترجمة،

$$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$$

(8)المحمولات، K_x : طالب x ، L_x : يحتاج إلى الراحة

ليس جميع x ، إذا كان x طالب فإن x يحتاج إلى الراحة
الترجمة،

$$\neg (\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$$

(9)المحمولات، K_x : نبات x ، L_x : سام

بعض x ، x نبات و x ليس سام
الترجمة،

$$(\exists x) (K_x \wedge \neg L_x)$$

(10)المحمولات،

K_x : طالب x ، L_{xy} : x يفضل y

الحدود، المنطق : a ، التاريخ : b
الترجمة،

$$(\exists x) ((K_x \wedge L_{xa}) \wedge (\exists y) (K_y \wedge L_{yb}))$$

(11)المحمولات،

x طالب : K_x ، x أكبر سن من y : L_{xy}

الحدود، كريم : a ، فائزة : b

كل x ، إذا كان x طالب و x أكبر سنا من كريم فإن x أكبر سنا من فائزة الترجمة،

$$(\forall_x) ((K_x \wedge L_{xa}) \rightarrow L_{ab})$$

(12)المحمولات،

x أطول من y : K_{xy} ، x شخص : L_x

جميع x ، إذا كان x شخص فإن x ليس أطول من x الترجمة،

$$(\forall_x) (K_x \rightarrow \neg K_{xx})$$

(13)المحمولات،

x طالب : K_x ، x يحترم y : L_{xy} ، x أستاذ : M_x

كل x ، إذا كان x طالب وكل y ، إذا كان y أستاذ فإن x يحترم y ، فإن x يحترم x .

الترجمة،

$$(\forall_x) ((K_x \wedge \forall_y) (M_y \rightarrow L_{xy})) \rightarrow L_{xx}$$

(14)المحمولات،

x صديق y : K_{xy} ، x فوضوي : L_x

الحدود، حامد : a

بعض x ، x صديق a و x فوضوي
الترجمة،

$$(\exists x) (K_{xa} \wedge L_x)$$

(15)المحمولات،

x طالب : K_x ، x أكبر سنا من y : L_{xy}

الحدود، أحمد : a ، علي : b

إذا كان بعض x أكبر سنا من أحمد فإن جميع y ، إذا كان y طالب فإن y
أكبر سنا من علي.

الترجمة،

$$(\exists x) L_{xa} \rightarrow (\forall y) (K_y \rightarrow L_{by})$$

(16)المحمولات،

x يحب y : K_{xy} . الحدود، سالم : a

الترجمة،

$$(\forall x) K_{ax}$$

(17)المحمولات،

x يحب y : K_x

الترجمة،

$$(\forall x) K_{xx}$$

(18)المحمولات،

x يحب y : K_{xy}

الترجمة،

$$(\exists_x) K_{xx}$$

(19)المحمولات،

x يحب y : K_{xy} . الحدود، سالم : a

الترجمة،

$$K_{aa} \rightarrow (\exists_x) K_{ax}$$

(20)المحمولات،

x يحب y : K_{xy}

الترجمة، $\lceil K_{aa} \rightarrow (\forall_x) \lceil K_{ax}$

(21)الترجمة، $(\exists_x) (\exists_y) (x = 5 \times y)$

(22)الترجمة، $(\forall_x) (\exists_y) (x + y = 0)$

(ب)

(1) إذا كان باسم يحل مسألة في امتحان فإن أحمد يحل أيضا مسألة في امتحان.


(2) يوجد رجل يحل نفس المسألة في كل امتحان.

(ج)

(5) $(\forall y) ((\exists y) ((M_{xy} \wedge K_{xyx}) \rightarrow (M_{nx} \wedge S_{nbx})))$ (2)

(4) $(\exists y) ((M_{xy} \wedge K_{xyx}) \rightarrow (M_{nx} \wedge S_{nbx}))$

(3) $(M_{xy} \wedge K_{xyx}) \rightarrow (M_{nx} \wedge S_{nbx})$



$(\forall x) R_{xx} \wedge (M_x \vee L_{xy})$ (1)

$(\exists x) (M_{xy} \wedge R_{ax} \wedge L_{ay})$ (2)

$(\forall y) ((\exists x) M_{xy} \rightarrow L_{xy})$ (3)

$O_1 = (M_1, K_1, L_1, N_1)$ (1) (→)

(أ) صادقة

$M_1 = \{ a_1 \}$

	K_1	L_1	N_1
a	T	T	T

(ب) كاذبة

$M_1 = \{ a_1 \}$

	K_1	L_1	N_1
a_1	T	T	F

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, a_1, b_1) \quad (2)$$

(أ) صادقة

$M_1 = \{ a_1, b_1 \}$	
a_1	K_1 — T
$M_1 = \{ a_1, b_1 \}$	

a_1	L_1 — F	(ب) كاذبة
-------	-----------------	-----------

a_1	K_1 — F
-------	-----------------

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, N_1, O_1) \quad (3)$$

$$M_1 = \{ a \}$$

(أ) صادقة

a_1	K_1 — T	L_1 — F
-------	-----------------	-----------------

a_1	N_1 — F
-------	-----------------

(ب) كاذبة

$$M_1 = \{ a_1 \}$$

a_1	K_1 — F
-------	-----------------

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, N_1, a_1) \quad (4)$$

(أ) صادقة

$$M_1 = \{ a \}$$

	K_1
a_1	T

L_1	a_1
a_1	F

(ب) كاذبة

$$M_1 = \{ a_1 \}$$

	K_1
a_1	F

$$O_1 = (M_1, R_1) \quad (5)$$

(أ) صادقة

(ب) كاذبة $M_1 = R$ ، $R_1 \text{ } x y : x \leq y$ حيث R هي مجموعة الأعداد الحقيقية).

$$M_1 = \{ a \}$$

R_1	a_1
a_1	F

(و)

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, a_1) \quad (1)$$

$$M_1 = \{ a_1 \}$$

	K_1
a_1	F

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, a_1) \quad (2)$$

$$M_1 = \{ a_1 \}$$

	K_1	L_1
a_1	F	T

$$O_1 = (M_1, L_1, a_1, b_1) \quad (3)$$

$$M_1 = \{ a_1, b_1 \}$$

L_1	a_1	b_1
a_1	F	T
b_1	F	T

$$O_1 = (M_1, K_1, L_1, f_1) \quad (4)$$

$$M_1 = \{ a_1, b_1 \}$$

	K_1	L_1
a_1	T	T
b_1	T	F

الفصل الخامس - 5.5

(i)

(1) المحمولات، x منطقي: K_x ، x فيلسوف: L_x . الحدود، أحمد: a

الترجمة،

(\forall_x) ($K_x \rightarrow L_x$), $\neg L_a$ المقدمات

$\neg K_a$ النتيجة

البرهان

- | | |
|--|-------------------|
| 1. (\forall_x) ($K_x \rightarrow L_x$) | م |
| 2. $\neg L_a$ | م |
| 3. $K_x \rightarrow L_x$ | تخ ك (a/x)، 1 |
| 4. $\neg K_a$ | نفي التالي 2,3 |

(3)المحمولات،

x حيوان ذو ريش : K_x ، x ينمو في الماء : L_x ، x يعيش في البحر: M_x

الترجمة،

المقدمات $(\forall_x) (K_x \rightarrow \neg L_x), (\exists_x) (L_x \wedge M_x)$

النتيجة $(\exists_x) (M_x \wedge \neg K_x)$

البرهان

1. $(\forall_x) (K_x \rightarrow \neg L_x)$ م
2. $(\exists_x) (L_x \wedge M_x)$ م
3. $K_a \rightarrow \neg L_a$ 1, فتح ك (a/x)
4. $L_a \wedge M_a$ 3, ثم و (a/x)
5. $\neg K_a$ 3,4 نفي التالي
6. $M_a \wedge \neg K_a$ 4,5 العطف
7. $(\exists_x) (M_x \wedge \neg K_x)$ 6, ثم و.

(4)المحمولات، x فيزيائي : K_x ، x كيميائي : L_x ، x فيلسوف : M_x ،

x يفضل y : M_{xy} ، الحدود احمد : a

الترجمة،

المقدمات

$(\forall_x) ((K_x \rightarrow (\forall_y) (L_y \rightarrow N_{xy})), (\forall_x) ((K_x \rightarrow (\forall_x) (M_y \rightarrow \neg N_{xy})), K_a$

النتيجة، $(\forall x) (M_x \rightarrow \neg K_x)$

البرهان

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1. | $(\forall x) (K_x \rightarrow (\forall x) (L_y \rightarrow N_{xy}))$ | م |
| 2. | $(\forall x) (K_x \rightarrow (\forall x) (M_y \rightarrow \neg N_{xy}))$ | م |
| 3. | K_a | م |
| 4. | $K_a \rightarrow (\forall x) (L_y \rightarrow N_{ay})$ | تخ ك (a/x) 1, |
| 5. | $K_a \rightarrow (\forall x) (M_y \rightarrow \neg N_{ay})$ | تخ ك (a/x) 2, |
| 6. | $(\forall x) (L_y \rightarrow N_{ay})$ | الوضع 3,4 |
| 7. | $L_y \rightarrow N_{ay}$ | تخ ك (y/y) 6, |
| 8. | $(\forall x) (M_y \rightarrow \neg N_{ay})$ | الوضع 3,5 |
| 9. | $M_y \rightarrow \neg N_{ay}$ | تخ ك (y/y) 8, |
| 10. | $N_{ay} \rightarrow \neg M_y$ | عكس النقيض 9, |
| 11. | $L_y \rightarrow \neg M_y$ | القياس الشرطي 7,10 |
| 12. | $M_y \rightarrow \neg L_y$ | عكس النقيض 11, |
| 13. | $(\forall x) (M_x \rightarrow \neg L_x)$ | ت.ك 12, |

(5)المحمولات،

x رواية : K_x ، x حديثة : L_x ، x ممتنع : M_x ، x سخيف : N_x ،

x رائع : O_x

الترجمة

المقدمات $(\forall x) (M_x \rightarrow \neg N_x), (\exists x) (K_x \wedge L_x \wedge O_x), (\forall x) (O_x \rightarrow M_x)$

النتيجة $(\exists x) (K_x \wedge L_x \wedge \neg N_x)$

البرهان

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | $(\exists x) (K_x \wedge L_x \wedge O_x)$ | م |
| 2. | $(\forall x) (O_x \rightarrow M_x)$ | م |
| 3. | $(\forall x) (M_x \rightarrow \neg N_x)$ | م |
| 4. | $K_a \wedge L_a \wedge O_a$ | 1, (a/x) تخ ك |
| 5. | $O_a \rightarrow M_a$ | 2, (a/x) تخ ك |
| 6. | $M_a \rightarrow \neg N_a$ | 3, (a/x) تخ ك |
| 7. | O_a | 4, التبسيط |
| 8. | M_a | 5,7 الوضع |
| 9. | $\neg N_a$ | 6,8 الوضع |
| 10. | $K_a \wedge L_a \wedge \neg N_a$ | 4,9 العطف |
| 11. | $(\exists x) (K_x \wedge L_x \wedge \neg N_x)$ | 10, تك. و. |

(6)

البرهان

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | $(\forall x) R_{xx}$ | م |
| 2. | $(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{yx})$ | م |
| 3. | $(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$ | م |
| 4. | $R_{xy} \wedge R_{xz}$ | مقدمة ب.ش. م |
| 5. | $R_{xy} \rightarrow R_{yx}$ | 2, (y/y) (x/x) تخ ك |
| 6. | R_{yx} | 4,5 الوضع |
| 7. | $(\forall z) ((R_{uv} \wedge R_{vz}) \rightarrow R_{uz})$ | 3, (v/y) (u/x) تخ ك |
| 8. | $(\forall u) (\forall v) (\forall z) ((R_{uv} \wedge R_{vz}) \rightarrow R_{uz})$ | 7, تك. ك. |
| 9. | $(R_{yx} \wedge R_{xz}) \rightarrow (R_{yz})$ | 8, (y/u) (x/v) (z/z) تخ ك |
| 10. | R_{yz} | 4, 6, 9 الوضع |
| 11. | $(R_{xy} \wedge R_{xz}) \rightarrow (R_{yz})$ | ب.ش. 4,10 |
| 12. | $(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{xz}) \rightarrow R_{yz})$ | 11 (3) تك. ك. |

(ب) (1)

المحمولات، x طبيب : K_x ، x كفاء : L_x . الحدود أحمد : t
الترجمة،

المقدمات $L_1, (\forall x)(K_x \rightarrow L_x)$.

النتيجة K_1

سنحاول البرهان على خطأ الحجة باستخدام المثال المضاد.

ليكن t هو قيمة المتغير الذي نحاول برهان خطأ الحجة من أجله، وهكذا

تكون : المقدمات $L_1, K_1 \rightarrow L_1$. النتيجة K_1

الآن يمكننا أن نستعويض عن القضية K_1 بالرمز M وعن القضية L_1 بالرمز N

وهكذا نستطيع إعادة كتابة صورة الحجة كما يلي :

المقدمات $N, M \rightarrow N$. النتيجة M

لإعطاء مثال مضاد، نأخذ النتيجة كاذبة، إذن يجب أن تكون M كاذبة. حتى

تكون المقدمة الأولى صادقة. وبما أن M كاذبة، فيمكن أن تكون N صادقة

أو كاذبة. حتى تكون المقدمة الثانية صادقة يجب أن تكون N صادقة. إذن،

ينجح المثال المضاد والحجة خاطئة.

السطر المطلوب

K_1	L_1	$K_1 \rightarrow L_1$
F	F	T

(2)المحمولات، x هرة : K_x ، x كبيرة : L_x ، x ثدي : M_x

الترجمة،

المقدمات $(\forall_x) (K_x \rightarrow L_x)$ ، $(\exists_x) (M_x \wedge L_x)$

النتيجة $(\forall_x) (K_x \rightarrow \neg M_x)$

ليكن x : t_1 . إذن تكون صور الحجة كما يلي :

المقدمات $K_{t_1} \rightarrow L_{t_1}$ ، $M_{t_1} \wedge L_{t_1}$

النتيجة $K_{t_1} \rightarrow \neg M_{t_1}$

المثال المضاد : نأخذ النتيجة كاذبة، إذن يجب أن تكون صادقة K_{t_1} و $\neg M_{t_1}$

كاذبة أو M_{t_1} صادقة. حتى تكون المقدمة الثانية صادقة فيجب أن تكون M_{t_1}

صادقة و L_{t_1} صادقة. حتى تكون المقدمة الأولى صادقة وبما أن K_{t_1} صادقة

فيجب أن تكون L_{t_1} صادقة. إذن ينجح المثال المضاد والحجة خاطئة.

السطر المطلوب

K_{t_1}	L_{t_1}	M_{t_1}	$K_{t_1} \rightarrow L_{t_1}$	$M_{t_1} \wedge L_{t_1}$	$K_{t_1} \rightarrow \neg M_{t_1}$
T	T	T	T	T	F

(ج)

(1)

البرهان

1. $(\forall x)(R_x \rightarrow S_x)$ م
2. $(\forall x)((R_x \wedge S_x) \rightarrow T_x)$ م
3. R_a (مقدمة ب.ش) م
4. $K_a \rightarrow S_a$ تخ ك (a/x) 1,
5. S_a الوضع 3,4
6. $(R_a \wedge S_a) \rightarrow T_a$ تخ ك (a/x) 2,
7. $R_a \wedge S_a$ العطف 3,5
8. T_a الوضع 6,7
9. $R_a \rightarrow T_a$ العطف 3,8
10. $(\forall x)(R_x \rightarrow T_x)$ تك.ك 9,

(2) استخدام طريقة البرهان الشرطي والحل مماثل إلى (1).

(3)

البرهان

1. $(\forall x)(L_x \rightarrow \neg M_x)$ م
2. $(\exists x)(N_x \wedge M_x)$ م
3. $L_a \rightarrow \neg M_a$ تخ ك (a/x) 1,
4. $N_a \wedge M_a$ تخ ك (a/x) 2,
5. $\neg L_a$ نفي التالي 3,4
6. $N_a \wedge \neg L_a$ العطف 4,5
7. $(\exists x)(N_x \wedge \neg L_x)$ تك.و 6,

(4)

البرهان

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | $(\forall x) ((K_x \wedge \neg M_x) \rightarrow \neg O_x)$ | م |
| 2. | $(\forall x) ((K_x \wedge L_x) \rightarrow N_x)$ | م |
| 3. | $(\forall x) (K_x \rightarrow (L_x \vee \neg M_x))$ | م |
| 4. | $K_a \wedge O_a$ | م (مقدمة ب.ش) |
| 5. | $(K_a \wedge \neg M_a) \rightarrow \neg O_a$ | تخ ك (a/x) 1, |
| 6. | $\neg(K_a \wedge \neg M_a)$ | نفي التالي 4,5 |
| 7. | $\neg K_a \vee M_a$ | دي مورغان 6, |
| 8. | $(K_a \wedge L_a) \rightarrow N_a$ | تخ ك (a/x) 2, |
| 9. | $K_a \rightarrow (L_a \vee \neg M_a)$ | تخ ك (a/x) 3, |
| 10. | M_a | قياس الفصل 4,7 |
| 11. | $L_a \vee \neg M_a$ | الوضع 4,9 |
| 12. | L_a | قياس الفصل 10,11 |
| 13. | $K_a \wedge L_a$ | العطف 4,12 |
| 14. | N_a | الوضع 8,13 |
| 15. | $(K_a \wedge O_a) \rightarrow N_a$ | ب.ش 4,14 |
| 16. | $(\forall x) ((K_x \wedge O_x) \rightarrow N_x)$ | ت.ك 15, |

(5)

البرهان

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | $(\forall x) (\forall y) (R_{xy} \rightarrow R_{yx})$ | م |
| 2. | $(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$ | م |
| 3. | R_{xy} | م (مقدمة ب.ش) |
| 4. | $R_{xy} \rightarrow R_{yx}$ | تخ ك (y/y) (x/x) 2, |

5.	R_{yx}	الوضع 3,4
6.	$(R_{xy} \wedge R_{yx}) \rightarrow R_{xx}$	1, تخ ك $(x/x)(y/y)(x/z)$
7.	$R_{xy} \wedge R_{yx}$	العطف 3,5
8.	R_{xx}	الوضع 6,7
9.	$R_{xy} \rightarrow R_{xx}$	ب.ش 3,8
10.	$(\forall x)(\forall y)(R_{xy} \rightarrow R_{xx})$	(2) تك.ك 9,

(6)

البرهان

1.	$(\forall x)(K_x \rightarrow (\forall y)((L_y \wedge M_y) \rightarrow R_{xy}))$	م
2.	$(\forall x)(M_x \rightarrow L_x)$	م
3.	$K_n \wedge L_m$	م
4.	$(\forall x)(K_x \rightarrow \neg R_{xnn})$	م
5.	$K_n \rightarrow (\forall y)((L_y \wedge M_y) \rightarrow R_{ny})$	1, تخ ك (n/x)
6.	$(\forall y)((L_y \wedge M_y) \rightarrow R_{ny})$	الوضع 3,5
7.	$(L_m \wedge M_m) \rightarrow R_{nm}$	6, تخ ك (m/y)
8.	$M_m \rightarrow L_m$	2, تخ ك (m/x)
9.	$K_n \rightarrow \neg R_{nm}$	4, تخ ك (n/x)
10.	$\neg R_{nm}$	الوضع 3,9
11.	$\neg(L_m \wedge M_m)$	نفي التالي 7,10
12.	$\neg L_m \vee \neg M_m$	دي مورغان 11,
13.	$\neg M_m$	قياس الفصل 3,12

(7) تطبيق تخ ك (a/x) على المقدمتين ثم تستخدم قاعدة الوضع مرتين.

(د)

(1)

ليكن $x : t_1$. إذن تكون صورة الحجة كما يلي :
المقدمات،

$$\alpha_1 : K_{t1} \rightarrow L_{t1} , \alpha_2 : M_{t1} \rightarrow N_{t1} , \alpha_3 : \neg L_{t1} \rightarrow \neg N_{t1}$$

النتيجة

$$\beta : M_{t1} \rightarrow K_{t1}$$

صورة الحجة خاطئة.

السطر المطلوب

K_{t1}	L_{t1}	M_{t1}	N_{t1}	α_1	α_2	α_3	β
F	T	T	T	T	T	T	F

(2)

ليكن $x : t_1$. إذن تكون صورة الحجة خاطئة والسطر المطلوب.

M_{t1}	K_{t1}	L_{t1}	N_{t1}	α_1	α_2	α_3	β
T	T	F	F	T	T	T	F

α_1 ، α_2 ، α_3 ، β هي المقدمات الأولى، الثانية، الثالثة والنتيجة على

الترتيب.

(3)

ليكن $x : t_1$. إذن تكون صورة الحجة خاطئة والسطر المطلوب.

M_{t1}	K_{t1}	L_{t1}	α_1	α_2	β
T	T	F	T	T	F

(4)

ليكن $x : t_1$. صورة الحجة خاطئة والسطر المطلوب.

M_{t_1}	K_{t_1}	L_{t_1}	α_1	α_2	β
F	T	F	T	T	F

(5)

ليكن $x : t_1$. صورة الحجة خاطئة والسطر المطلوب.

K_{t_1}	M_{t_1}	L_{t_1}	α_1	α_2	β
F	T	T	T	T	F

(6) ليكن $x : t_1$. صورة الحجة خاطئة والسطر المطلوب.

K_{t_1}	L_{t_1}	M_{t_1}	α_1	α_2	β
T	T	F	T	T	F

(هـ) (1)

البرهان

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | $(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$ | م |
| 2. | K_a | م |
| 3. | $a = n$ | م |
| 4. | $K_n \rightarrow L_n$ | تخ ك (n/x) 1, |
| 5. | K_n | الهوية 2,3 |
| 6. | L_n | الوضع 4,5 |

(2)

البرهان

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | K_a | م |
| 2. | L_b | م |
| 3. | $a = b$ | م |
| 4. | $(\forall x) (L_x \rightarrow M_x)$ | م |
| 5. | L_n | الهوية 2,3 |
| 6. | $L_n \rightarrow M_n$ | تنخك (a/x) 4, |
| 7. | M_n | الوضع 5,6 |
| 8. | $K_n \wedge M_n$ | العطف 1,7 |
| 9. | $(\exists x) (K_x \wedge M_x)$ | تك. و. 8, |

(3)

البرهان

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | $(\forall x) (L_x \rightarrow \neg M_x)$ | م |
| 2. | M_m | م |
| 3. | $m=n$ | م |
| 4. | M_n | الهوية 2,3 |
| 5. | $L_n \rightarrow \neg M_n$ | تنخك (n/x) 1, |
| 6. | $\neg L_n$ | نفي التالي 4,5 |

(4)

البرهان

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | $(\forall x) ((K_x \wedge L_x) \rightarrow M_x)$ | م |
| 2. | K_m | م |
| 3. | L_n | م |

4.	$n = m$	م
5.	$\neg M_0$	م
6.	$(K_n \wedge L_n) \rightarrow M_n$	1, (n/x) تخ ك
7.	K_n	2,4 الهوية
8.	$K_n \wedge L_n$	3,7 العطف
9.	M_n	6,8 الوضع
10.	$0 \neq n$	5,9 نفى الهوية

(و)

(1)

البرهان

1.	$(\forall x) (K_x \rightarrow L_x)$	م
2.	$(\forall x) (K_x \rightarrow \neg L_x)$	م
3.	K_a	م
4.	$K_a \rightarrow L_a$	1, (a/x) تخ ك
5.	$K_a \rightarrow \neg L_a$	2, (a/x) تخ ك
6.	L_a	3,4 الوضع
7.	$\neg L_a$	3,5 الوضع
8.	$L_a \wedge \neg L_a$	6,7 العطف

(2)

البرهان

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 1. | $(\forall x) (K_x \rightarrow (L_x \wedge M_x))$ | م |
| 2. | $(\forall x) (N_x \rightarrow \neg M_x)$ | م |
| 3. | $\neg(\forall x) (K_x \rightarrow \neg N_x)$ | م |
| 4. | $K_x \rightarrow (L_x \wedge M_x)$ | 1. تخ ك (x/x) |
| 5. | $N_x \rightarrow \neg M_x$ | 2. تخ ك (x/x) |
| 6. | $M_x \rightarrow \neg N_x$ | عكس النقيض 5. |
| 7. | $(L_x \wedge M_x) \rightarrow M_x$ | صيغة صحيحة |
| 8. | $K_x \rightarrow \neg N_x$ | القياس الشرطي 4,6,7 |
| 9. | $(\forall x) (K_x \rightarrow \neg N_x)$ | 8. تك. ك. |
| 10. | $(\forall x) (K_x \rightarrow \neg N_x) \wedge \neg(\forall x) (K_x \rightarrow \neg N_x)$ | العطف 3,9 |

(3)

البرهان

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | $(\forall x) (\forall y) (\forall z) ((R_{xy} \wedge R_{yz}) \rightarrow R_{xz})$ | م |
| 2. | $(\forall x) (\forall y) ((R_{xy} \rightarrow R_{yz}))$ | م |
| 3. | R_{ab} | م |
| 4. | $\neg R_{bb}$ | م |
| 5. | $R_{ab} \rightarrow R_{ba}$ | 2. تخ ك (b/y)(a/x) |
| 6. | R_{ba} | الوضع 3,5 |
| 7. | $(R_{ba} \wedge R_{ab}) \rightarrow R_{bb}$ | 1. تخ ك (b/x)(a/y)(b/z) |
| 8. | R_{bb} | الوضع 3,6,7 |
| 9. | $R_{bb} \wedge \neg R_{bb}$ | العطف 4,8 |

(4)

البرهان

1. K_a	م
2. L_b	م
3. $(\forall x) (K_x \rightarrow M_x)$	م
4. $(\forall x) (L_x \rightarrow \neg M_x)$	م
5. $a = b$	م
6. $K_a \rightarrow M_a$	3, (a/x) تخك
7. M_a	الوضع 1,6
8. $L_b \rightarrow \neg M_b$	4, (b/x) تخك
9. $\neg M_b$	الوضع 2,8
10. $\neg M_a$	الهوية 5,9
11. $M_a \wedge \neg M_a$	العطف 7,10

الفصل السادس - 3.6

البرهان

(1)

1. α	م
2. $(\forall x) \alpha$	تعميم 1,
3. $\alpha \rightarrow (\forall x) \alpha$	نظرية الاستنتاج 1,2
4. $(\forall x) \alpha \rightarrow \alpha$	A_5
5. $(\forall x) \alpha \leftrightarrow \alpha$	حق 3,4

البرهان	(2)
1. $(\forall x) \neg \alpha \leftrightarrow \neg \alpha$	المبرهنة السابقة
2. $\neg(\forall x) \neg \alpha \leftrightarrow \neg \neg \alpha$	حق 1,
3. $(\exists x) \alpha \leftrightarrow \neg \neg \alpha$	تعريف 2,4
4. $(\exists x) \alpha \leftrightarrow \alpha$	حق 3,

البرهان		(3)
1.	$(\forall x) \alpha (x)$	م
2.	$\alpha (x)$	تخ. ك 1,
3.	$(\exists x) \alpha (x)$	تك. و 2,
4.	$(\forall x) \alpha (x) \rightarrow (\exists x) \alpha (x)$	نظرية الاستنتاج 1,3

الفصل السابع - 6.7

(1)

(1)

نشئ شجرة نفي الصيغة وشجرة الصيغة المعطاة

شجرة الصيغة $\neg \neg (L \rightarrow (K \wedge \neg K))$

$$1) \quad \checkmark \quad \neg\neg(L \rightarrow (K \wedge \neg K))$$

$$2) \quad \checkmark \quad L \rightarrow (K \wedge \neg K)$$

$$3) \quad \neg L \qquad K \wedge \neg K$$

$$4) \qquad K$$

$$5) \qquad \neg K$$

$$6) \qquad x$$

شجرة نفي الصيغة المعطاة مفتوحة. الفرع الأيسر مفتوح وهذا يبين أن $\neg\neg(L \rightarrow (K \wedge \neg K))$ تكون صادقة إذا كان L كاذبا وإذن فالصيغة $\neg(L \rightarrow (K \wedge \neg K))$ ليست تكرارية. لقد طبقنا القاعدة $\neg\neg$ عن الخط الأول فحصلنا على الخط الثاني. وطبقنا القاعدة \rightarrow على الثاني فحصلنا على الثالث. وطبقنا القاعدة \wedge على الخط الثالث فحصلنا على الرابع والخامس.

شجرة الصيغة $\neg(L \rightarrow (K \wedge \neg K))$

$$\neg(L \rightarrow (K \wedge \neg K))$$

L


$$\neg(K \wedge \neg K)$$



شجرة الصيغة مفتوحة أيضا،


وإذن فالصيغة عارضة.

(3)




الصيغة متناقضة.

(2)



الصيغة تكرارية.

(4)



لقد طبقنا القاعدة \rightarrow على الخط الأول فحصلنا على الخطين الثاني والثالث. وطبقنا القاعدة \rightarrow على الخط الثاني (الفرع الأيمن) فحصلنا على الخطين الخامس والسادس (الفرع الأيمن). وطبقنا القاعدة \rightarrow على الخط الثالث (الفرع الأيسر) فحصلنا على الخط الرابع. طبقنا القاعدة \wedge على الخط الثالث (الفرع الأيمن) فحصلنا على الخط السابع (الفرع الأيمن) وأخيرا طبقنا القاعدة \rightarrow على الخط الثاني (الفرع الأيسر) فحصلنا على الخط السابع (الفرع الأيسر). الشجرة مغلقة، وإذن الصيغة المعطاة تكرارية.

$$\neg(((K \rightarrow (L \rightarrow M)) \rightarrow ((K \rightarrow L) \rightarrow (K \rightarrow M))))(5)$$

1) $\checkmark K \rightarrow (L \rightarrow M)$

2) $\checkmark \neg((K \rightarrow L) \rightarrow (K \rightarrow M))$

3) $\checkmark K \rightarrow L$

4) $\checkmark \neg(K \rightarrow M)$

5) K

6) $\neg M$

7) $\neg K$ الصيغة تكرارية.

8) x

9) $\neg K$ $L \rightarrow M$

10) x

11) $\neg L$ M

12) x x

(ب)

- 1) $\checkmark \quad \neg K \vee L$ (1)
2) $\checkmark \quad \neg((\neg L \wedge M) \rightarrow \neg K)$
3) $\checkmark \quad \neg L \wedge M$
4) $\neg \neg K$
5) K
6) $\neg L$
7) M
8) $\neg K$ L
 x x


الصيغتان غير متسقيتين إذ أن الشجرة المنتهية مغلقة، أي أنه لا توجد إمكانية لجعل الصيغتين صادقتين في نفس الوقت.

(2)

- 1) $(\neg L \wedge M) \rightarrow \neg K$
2) $\neg(\neg K \vee L)$
3) $\neg \neg K$
4) $\neg L$
5) K
6) $\neg(\neg L \wedge M)$ $\neg K$
7) $\neg \neg L$ $\neg M$ x
8) x


والصيغتان متسقتان وذلك أن الشجرة المنتهية مفتوحة لوجود فرع مفتوح وهذا يعني وجود إمكانية جعل الصيغتين صادقتين في نفس الوقت.

(3)



الشجرة مفتوحة، وإذن الصيغ متسقة.

(5)



لقد أغلق فرع واحد من الشجرة لوجود K و $\neg K$ عليه وبقيت الفروع الأخرى مفتوحة. هكذا فالشجرة مفتوحة وتوجد على الأقل إمكانية واحدة لجعل الصيغتين صادقتين في نفس الوقت وإذن فهما متسقتين.

(ج)

$$1) \quad K \rightarrow (L \wedge (M \vee N)) \quad (1)$$

$$2) \quad \neg(K \rightarrow L)$$

$$3) \quad K$$


$$4) \quad \neg L$$

$$5) \quad \neg K$$

$$6) \quad x$$

$$7) \quad L$$

$$8) \quad M \vee N$$



الفرع الأيسر مغلق لوجود K و $\neg K$ عليه والفرع الأيمن مغلق لوجود L و $\neg L$ عليه وهكذا فالشجرة مغلقة وصورة الحجة صحيحة.

$$1) \quad \checkmark K \rightarrow (L \vee M) \quad (2)$$

$$2) \quad \checkmark \neg L \wedge K$$

$$3) \quad \neg M$$


$$4) \quad \neg L$$

$$5) \quad K$$


$$6) \quad \neg K$$

$$7) \quad L$$


$$8) \quad M$$




صورة الحجة صحيحة.



الشجرة مفتوحة وبالتالي فصورة الحجة خاطئة.




صورة الحجة صحيحة.




الصيغتان ليستا متكافئتين وذلك لوجود فرع مفتوح واحد على أقل، وهكذا فإنه توجد على الأقل إمكانية واحدة، لجعل $\neg K \rightarrow L$ صادقة بينما تكون $\neg(K \rightarrow L)$ كاذبة.

الشجرة الثانية




(2) الشجرة الأولى




الشجرتان مغلقتان، وإذن الصيغتان متكافئتان.

(3)

الشجرة الثانية





الشجرة الأولى



للشجرة الأولى مغلقة، بينما الشجرة الثانية مفتوحة وبالتالي فالصيغتان غير

متكافئتين.

(هـ)




الصيغ غير متسقة

الصيغ متسقة

(3) غير متسقة.


(4) غير متسقة.



لقد طبقنا القاعدة \exists على الخط الثاني فحصلنا على الخط الرابع، وطبقنا القاعدة \rightarrow على الخط الأول فحصلنا على الخامس. الفرع الأيسر مغلق لوجود $(\exists x) \neg K_x$ و $(\exists x) \neg K_x$ عليه. الأيمن مغلق لوجود L_x و L_x عليه. الشجرة مغلقة وصورة الحجة صحيحة.

(2)

- 1) $\checkmark (\exists x) K_x$
- 2) $\checkmark (\exists x) L_x$
- 3) $\checkmark \lceil (\exists x) (K_x \wedge L_x)$
- 4) K_a
- 5) L_b
- 6) $(\forall x) \lceil (K_x \wedge L_x)$
- 7) $\checkmark \lceil (K_a \wedge L_a)$
- 8) $\checkmark \lceil (K_b \wedge L_b)$



صورة الحجة خاطئة، ذلك أن الشجرة المنتهية مفتوحة لوجود فرع مفتوح، وعندما طبقنا القاعدة \exists أدخلنا الحد a على الخط الرابع وحد آخر b على الخط الخامس في التطبيق الثاني لهذه القاعدة.

(3)

- 1) $\checkmark (\exists x) (\forall y) K_{xy}$
- 2) $\checkmark \lceil (\forall x) (\exists y) K_{yx}$
- 3) $(\forall y) K_{ay}$
- 4) $\checkmark (\exists x) \lceil (\exists y) K_{yx}$
- 5) $\checkmark \lceil (\exists y) K_{yb}$
- 6) $(\forall y) \lceil K_{yb}$
- 7) $\lceil K_{ab}$
- 8) K_{ab}
- 9) x

صورة الحجة صحيحة، لقد طبقنا القاعدة \exists على الخط الأول فحصلنا على الخط الثالث. وطبقنا \forall على الخط الثاني فحصلنا على الرابع. وطبقنا القاعدة \exists على الرابع فحصلنا على الخامس. وطبقنا \exists على الخامس فحصلنا على السادس. طبقنا \forall على السادس فحصلنا على السابع. ثم طبقنا \forall على الثالث فحصلنا على الثامن. أخذنا السابع والثامن فغلقنا الشجرة على الخط التاسع.

(4) صورة الحجة صحيحة.

- 1) $a = b$ (5)
- 2) $\neg(Kab \rightarrow Kba)$
- 3) $\checkmark \neg(Kaa \rightarrow Kaa)$
- 4) Kaa
- 5) $\neg Kaa$
- 6) x

لقد استبدلنا على الخط 3 ظهور b على الخط 2 مرتين بواسطة a ، وذلك باستخدام قاعدة الهوية. والحجة صحيحة.

(6)

- 1) $a = b$
- 2) $\neg(b = a)$
- 3) $\neg(a = a)$
- x

صورة الحجة صحيحة.

المراجع

أولاً: المراجع العربية


1. د. أسعد الجنابي- المنطق الرياضي والرياضيات، أطروحة للدكتوراه، صوفيا، 1975.
2. د. أسعد الجنابي- المنطق الرياضي: دوره ومكانه في الرياضيات الحديثة، مركز البحوث، عدن، 1976.
3. د. أسعد الجنابي- البرهان غير المباشر، مركز البحوث، عدن، 1976.
4. د. أسعد الجنابي- الطريقة البديهية، مركز البحوث، عدن، 1976.
5. د. حسان الباهي- اللغة والمنطق (بحث في المفارقات)، دار الأمان للنشر، الرباط، 2000.
6. د. كريم متى- المنطق الرياضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979.
7. محمد مرسللي- دروس في المنطق الاستدلالي الرمزي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1989.
8. د. صلاح عثمان - المنطق المتعدد القيم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
9. د. عادل فاخوري - المنطق الرياضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1988.
10. د. نجيب الحصادي - أسس المنطق الرمزي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت 1993.

ثانيا: المراجع الأجنبية

11. Cori,R. and Lascar, D.- Mathematical logic, Oxford University Press, Inc. New York, 2000.
12. Copi, J.- Symbolic logic, Macmillan publishing Co., Inc., New York, 5 ed., 1979.
13. Crossley, J.N.-Wath is mathematical logic?, Dover publications, Inc., New York, 1990.
14. Curry, H.B.- Foundations of Mathematical Logic, Dover Publications, Inc. New York, 1977.
15. Dale, J. – Philosophy of mathematics, an Anthology, Blackwell publishers, Massachusetts, USA 2001.
16. Daniel, B. – Deduction, Blackwell, publishers, MA, USA,2003.
- 17.Gamut, L.T.F. – Logic language and meaning, vol.1, the university of Chicago press, Chicago, 1991.
- 18.Gamut, L.T.F. – Logic language and meaning, vol.2, the university of Chicago press, Chicago, 1991.
- 19.Ganchev, I. – Mathematical logic, Sofia, 1968.
- 20.Geoffrey, H. – Metalogic, university of California press, USA, 1996.
- 21.Grayling, A. C. – Philosophical logic, Blackwell publishers, Oxford, UK, 2001.
22. Hamilton, A.G.- Logic for mathematicians, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

23. Hao, W.-Mathematical Logic, Litton Educational Publishing Inc., 1981.
24. Hackstaff, L.H.-Systems of formal logic, D. Reidel publishing, Co., Dordrecht-Holland, 1966.
25. Haack, S.-Philosophy of logics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
26. Halmos, P. and Givant, S.-Logic as Algebra, the mathematical association of America, 1998.
27. John, N. – Logics, wadsworth, London, 1997.
28. Langer, S.K.-An Introduction to symbolic logic, Dover publications, Inc., New York, 1967.
29. Lou, B. – Philosophical logic, Blackwell publishers, MA, USA, 2001.
30. Machover, M. – Set theory, logic and their limitations, Cambridge university press, Cambridge, UK, 2003.
31. Mark, S. – Logical forms, Blackwell publishers, Massachusetts, USA, 2001.
32. Martin, N.M.- Systems of logic, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
33. Mendelson, E.-Introduction to mathematical logic, Chapman & Hall, London, 4 ed.; 1997.
34. Magaris, A.-First Order mathematical logic, Dover publications, Inc., New York, 1990.

35. Nolt, J. and Rohatyn, D.-Logic, McGraw-Hill Book Company, New York, 1988.
36. Purtil, R,L, Logic for philosophers, Harper a Row, publishers, New York , 1971.
37. Rubin, J.E.- Mathematical logic, Saunders college publishing, 1990.
38. Samuel, G. – The languages of logic, Blackwell, London, 1997.
39. Stolyar, A.A.-Introduction to Elementary mathematical logic, Dover publications, Inc., New York, 1970.



المنطق الرمزي المعاصر

يمثل هذا الكتاب مدخلاً إلى المنطق الرمزي المعاصر ويعرض بأسلوب مبسط ودقيق حساب القضايا، حيث تدرس دلالاته وتركيبه. الاستنتاج الطبيعي. هنا. يتناول قواعد الاشتقاق وأنواع البراهين الصورية ثم يتم بناء نسق لحساب القضايا مع براهين صفات هذا النسق.

حساب المحمولات يتم إدخاله كتوسيع لحساب القضايا، حيث تدرس دلالاته من خلال البناءات التفسيرية وتركيبه. الاستنتاج الطبيعي لحساب المحمولات يقوم على إضافة قواعد اشتقاق جديدة. ثم يتم توسيعه بدراسة مفهوم الهوية وأخيراً يبنى النسق الصوري لحساب المحمولات. تدرس أشجار الصدق كطريقة أخرى فعالة وسلسلة في حساب القضايا لتحديد: أنواع الصيغ. تكافئها. اتساقها وعدم اتساقها. كما يتم تعميمها على حساب المحمولات.

إنه أول كتاب باللغة العربية يحوي حلولاً مفصلة لمئات التمارين. التي تمثل مساعدة حقيقية للقارئ لتثبيت المعالجات النظرية المعاصرة في هذا الكتاب.

المؤلف:

أستاذ جامعي للمنطق وقام بتدريسه في عدة جامعات عربية. كما وعمل في مراكز أبحاث عربية وأوروبية. ونشر أكثر من ١٦ مقال وكتاب في المنطق.



المركز الرئيسي
فاكس

E-mail: shorokjo@nol.com.jo

www.shorok.com

ISBN 9957-00-306-2



9 789957 003067